HEMOCHRON® Jr.

Whole Blood Microcoagulation Systems

Aktivovaný koagulační nízko rozmezní čas (ACT-LR)

Příbalová informace

Česky

Pro diagnostické použití *in vitro*

ÚČEL POUŽITÍ

HEMOCHRON® Jr. ACT–LR je kvantitativní test na sledování heparinové antikoagulace během různých lékařských zákroků. ACT–LR prokazuje lineární korelaci antikoagulačního vlivu heparinu až do 2,5 jednotek/ml krve. Účelem jeho použití je sledování nízkých až středních heparinových dávek, často spojených se zákroky jako je srdeční katetrizace, mimotělní blánové okysličení (ECMO), hemolýza a perkutánní transluminální koronární angioplastika (PTCA). Testy HEMOCHRON Jr. ACT+ [JACT+] jsou k dispozici pro sledování středních až vysokých hladin [1-6 jednotek/ml] heparinu.)

Test ACT–LR se provádí na kterémkoliv modelu HEMOCHRON Jr. při použití vzorku čerstvé periferní krve. Přístroje jsou přenosné a jsou určené k použití u lůžka pacienta. Přístroje nejsou určeny k domácímu použití.

SOUHRN A POPIS

Pečlivé sledování a kontrola antikoagulace je nezbytná, aby došlo k zabezpečení volného toku krve bez koagula a zároveň ke snížení komplikace krvácení, které může následovat po zákroku.[2,3,4]

Test aktivovaného koagulačního času (ACT), poprvé popsán Hattersleyem v roce 1966,[5] je nejobvyklejší metodou kontroly heparinové léčby během intervenčních zákroků, jako je PTCA. Zatímco heparinová léčba je nezbytná k udržování hemostázy během zákroku, její podávání může značně ohrozit stav pacienta. Různí pacienti se mohou od sebe lišit v citlivosti na heparin až dvanáctinásobně.[1] Předávkování heparinem může způsobit nebezpečné krvácení a poddávkování heparinem může zapříčinit trombózu. Z těchto důvodů je kontrola heparinové léčby životně důležitá k ochraně proti těmto nežádoucím vedlejším účinkům.

Výsledek ACT–LR testu je automaticky převeden na referenční hodnotu Celite® ACT. Po dokončení testu, digitální časová zobrazí v sekundách pouze ekvivalentní hodnotu Celite ACT. Zobrazení této ekvivalentní Celite ACT hodnoty zjednodušil výklad výsledku testu.

PRINCIP METODY

Přístroje HEMOCHRON Jr. využívají koagulačního mechanismu s mechanickým koncovým bodem, při němž se koagulum vytvoří v jednorázové ACT–LR kyvetě. Po zavedení vzorku periferní krve přístroj přesně naměří 15 mikrolitrů krve a automaticky je převede do pokusného kanálku uvnitř ACT–LR kyvety. Zbytek krevního vzorku, který není potřebný k výzkumu, je automaticky odsán do odpadového kanálku kyvety. Smíchání vzorku a činidla a spuštění testu je také provedeno automaticky, bez jakéhokoliv zásahu operátora. Po smíchání s činidlem se vzorek pohybuje ze strany na stranu v testovacím kanálku a sleduje se tvoření koagula.

Mechanismus na detekci koagula se skládá z řady optických detektorů LED zarovnaných s testovacím kanálkem kyvety. Rychlost, kterou se krevní vzorek pohybuje mezi detektory, se mění. Jakmile krev začne koagulovat, zabraňuje toku krve a pohyb se zpomalí. Přístroj pozná, kdy byl dosažen koncový bod koagulace, když se pohyb zpomalí pod předem určenou hodnotu. Přístroj ohlásí ekvivalentní Celite ACT hodnotu v sekundách.

ČINIDLA

Každý kartón testu ACT–LR testovacích kyvet obsahuje:

- 45 sáčků, obsahujících jednu HEMOCHRON Jr. ACT–LR testovací kyvetu a jedno vysoušedlo

Testovací kyveta ACT–LR je samostatná jednorázová pokusná komora naplněná suchým přípravkem Celite, bramborovým dextrinem, stabilizátory a pufrem. Každá kyveta je balená v individuálním sáčku. Na sáčku kyvety je vytištěné datum použitelnosti pro specifickou šarži.

VAROVÁNÍ: *Všechny použité kyvety považujte za potenciálně infekční, zacházejte s nimi opatrně a odstraňte je v souladu se směrnicemi zásad odstraňování lékařského odpadu.*

SKLADOVÁNÍ A STÁLOST

Pokud jsou uchovávány v chladícím prostoru (2–8 °C), ACT–LR kyvety balené ve fólii jsou stálé až do vyznačené doby použitelnosti. Skladování při pokojové teplotě (15–30 °C) je možné pro neotevřené kyvetové sáčky. ACT–LR kyvety nevystavujte teplotám nad 37 °C.

POZNÁMKA: *Znovu datování je možné pro udržování při pokojové teplotě na maximálně 12 týdny, ale nesmí přesáhnout vyznačený den použitelnosti. Znovu datování je nutné v případě udržování při pokojových teplotách a musí být označeno vyplněním části tabulky s informacemi o skladování označené „Ověření funkce“na boční straně každého kyvetového kartónu. Otevřený sáček se správně přeloženým otevřeným koncem, uchovaný v chladícím prostoru, si udrží stálost sedm dní. Pro optimální trvanlivost doporučujeme, abyste kyvetní sáček otevřeli těsně před použitím.*

POKYNY K POSTUPU

Před výkonem každého testu se obraťte na patřičnou Příručku pro operátora HEMOCHRON Jr., která obsahuje detailní pokyny k postupu.

Přístroj se ovládá vsunutím kyvety do přístroje, jejím zahřátím, zavedením vzorku periferní krve a stisknutím tlačítka **START.** Odměření vzorku, smíchání vzorku a činidla, spuštění testu a detekce koagula je provedeno automaticky.

Dodané látky

- Předem naplněné HEMOCHRON Jr. ACT–LR testovací kyvety.

Nedodané, ale nezbytné látky

- HEMOCHRON Jr., HEMOCHRON Jr. II nebo HEMOCHRON Jr. Signature
- 1 ml nebo 3 ml stříkačka z plastické hmoty, jehla na odběr vzorků kalibrovaná 23 nebo 21 (libovolná)

ODBĚR A ZACHÁZENÍ SE VZORKY

Při získání krevních vzorků postupujte podle pokynů ústavních a pokynů CLSI (Institut pro klinické laboratorní standardy) (H21-A) k odběru vzorků pro koagulační testy.

Neodebírejte čerstvé vzorky periferní krve pomocí skleněných odebíracích zkumavek.

Neodebírejte krev z heparinizované přístupové linky, uzávěru nebo z dlouhodobě zavedeného heparinového uzávěru.

Při odebírání vzorků přes zavedené krevní linky důkladně vypláchněte přístupový otvor podle ústavních pokynů.

1. Injekční stříkačkou odeberte 0,2 ml krve.
2. Okamžitě odkápněte jednu kapku krve do vzorkové jamky testovací kyvety; naplňte již od spodní části až po horní. Toto můžete učinit za/anebo bez pomoci přepouštěcí jehly. Přiměřené množství krve musí být přidáno přímo do střed vzorkové jamky, aby byla zaplněná až po okraj. Pokud velká kapka přesáhne nad střed vzorkové jamky, postrčte ji do strany vzorkové jamky.
3. ZMÁČKNĚTE TLAČÍTKO **START**.

FUNKČNÍ CHARAKTERISTIKY

POZNÁMKA: *Následující údaje byly získány pomocí HEMOCHRON Jr. s ACT–LR kyvetami.*

Normální rozmezí

HEMOCHRON Jr. byl zhodnocen při použití čerstvé periferní krve od normálních dobrovolných dárců (N=21) a dospělých kardiálních a ECMO pacientů, kteří nedostávali heparinovou terapii (N=20). Výsledky jsou udány v ekvivalentních Celite HEMOCHRON ACT hodnotách.

	N	Průměr (s)	SD (s)	Rozmezí (průměr ±2SD)
Normální dárci	21	131	9	11–149
Pacienti bez heparinu	20	129	20	89–169

POZNÁMKA: *Každá instituce by si měla zavést své vlastní normální rozmezí a cílové rozmezí terapeutické antikoagulace podle svých pacientů.*

Rozmezí pro odstranění zavedené cévní pochvy

HEMOCHRON Jr. byl zhodnocen na 20 pacientech po zakončení perkutánní transluminální koronární angioplastiky nebo po 5 až 24 hodinách po heparinovém bolusu v CCU (kardiologická klinika), když mělo přijít k odstranění zavedené cévní pochvy. Referenční Celite ACT (HEMOCHRON) byl srovnán za použití rozdíleného vzorku krve.

Koagulační čas v době odstranění pochvy

ACT–LR

	N	Průměr (s)	SD (s)	Rozmezí (průměr ±2SD)
	20	145	31	83–207

HEMOCHRON Celite ACT

	N	Průměr (s)	SD (s)	Rozmezí (průměr ±2SD)
	20	142	37	68–216

POZNÁMKA: *Každá instituce by si měla zavést své vlastní cílové rozmezí pro odstranění zavedené pochvy podle svých pacientů.*

Heparinová citlivost (Fig. 1)

Křivka heparinové citlivosti in vitro byla vytvořena při přidávání zvyšující dávky heparinu (0 až 2,5 jednotek/ml) k poměrnému množství krve 9 normálních dárců. Testy HEMOCHRON Jr. ACT-LR a HEMOCHRON Celite aktivovaný ACT byly provedeny na rozdělených krevních vzorcích. Průměr koagulačního času byl vypočítán ze vzorků 9 dárců na každé hladině heparinu.

POZNÁMKA: *Tato křivka slouží pouze jako příklad. Jednotliví pacienti vykazují unikátní křivku reakční dávky.*

Korelace mezi HEMOCHRON Jr. ACT-LR a referenčním HEMOCHRON ACT

HEMOCHRON Jr. ACT-LR je optimalizovaný na citlivost reakce v heparinovém rozmezí od 0 po 2,5 jednotek/ml. V současné době je nejobvyklejší metodou pro kontrolu v tomto heparinovém rozmezí Celitem aktivovaný HEMOCHRON ACT test a HEMOCHRON aktivovaný částicemi skla ACT(P214). Korelace mezi HEMOCHRON Jr. ACT-LR a těmito referenčními ACT testy byly určeny.

I. Korelace mezi HEMOCHRON Jr. ACT-LR a mezi HEMOCHRON Celitem aktivovaným ACT testem.

A. Laboratorní studie in vitro (Fig. 2)

Čerstvá krev byly odebrána od 9 normálních dárců. Poměrné množství každého krevního vzorku bylo heparizováno in vitro do 6 hladin heparinové koncentrace, do 2,5 jednotek/ml. Každý vzorek prošel testem HEMOCHRON Jr. ACT-LR a referenčním Celite ACT testem.

Celkem 40 párů údajových bodů bylo shromážděno a analyzováno. (r=0,96).

HEMOCHRON Jr. ACT-LR byl převeden na ekvivalentní hodnoty Celite HEMOCHRON ACT založené na regresní rovnici sestavené na základě klinických studií, jak je zobrazeno na Fig. 3.

B. Klinické studie (in vivo) (Fig. 3)

Krevní vzorky byly odebrány od 17 kardiovaskulárních pacientů před heparinizací a po heparinizaci během srdeční katetrizace a angioplastiky. Celkově bylo odebráno 71 vzorků. Vzorky byly simultánně vyhodnoceny testem HEMOCHRON Jr. ACT-LR a referenčním Celite ACT testem. Rovnice lineární regrese byla sestavena z této korelace (r=0,95) a byla určena Celite ekvivalentní hodnota ACT odpovídající koagulačnímu času ACT-LR. Následovně byl tento převod naprogramován do všech modelů HEMOCHRON Jr. takovým způsobem, že po ukončení ACT-LR testu je zobrazena ekvivalentní Celite hodnota ACT.

II. Korelace mezi HEMOCHRON Jr. ACT-LR a HEMOCHRON ACT aktivovaným skelnými částicemi

HEMOCHRON aktivovaný skelnými částicemi ACT (P214) je nejobvyklejší metodou určení ACT koagulačního času při ECMO a dialýze. Jiné metody zahrnují ACT aktivované kaolinem a Celitem.

A. Laboratorní studie (in vitro) (Fig. 4)

Korelace mezi HEMOCHRON Jr. ACT-LR a HEMOCHRON ACT aktivovaným skelnými částicemi byla znázorněna v laboratorní studii in vitro. Čerstvá krev byla odebrána od 5 normálních dárců. Poměrné množství každého krevního vzorku bylo heparizováno in vitro do hladin heparinové koncentrace do 2,5 jednotek/ml. Každý vzorek byl testován na HEMOCHRON Jr. ACT-LR a na ACT (P214) aktivovaným skelnými částicemi. Celkem 27 párů údajových bodů bylo shromážděno a analyzováno (r=0,95).

B. Klinická studie (in vivo) u ECMO pacientů (Fig. 5)

Heparinová antikoagulace se sledovala každou hodinu do 2 a až do 48 hodin u 13 ECMO pacientů při použití ACT (P214) aktivovaným skelnými částicemi. Skupina pacientů zahrnovala 5 dětí (ve věku od 2 měsíců až po 15 let) a 8 dospělých (od 22 až do 63 let). Rozdělené vzorky byly simultánně vyhodnoceny pomocí HEMOCHRON Jr. ACT-LR. Celkem 99 párů údajových bodů bylo shromážděno a korelace mezi těmito dvěma testy byla analyzována (r=0,81 u dospělých, r=0,61 u dětí, r=0,72 spojená).

C. Klinická studie (in vivo) u pacientů s dialýzou (Fig. 6)

Heparinová antikoagulace se sledovala každých 30 minut do 1 až do 2 hodin u 21 dospělých pacientů s dialýzou (od 30 do 85 let) při použití komerčně dostupného kaolinem aktivovaného ACT. Rozdělené vzorky byly simultánně vyhodnoceny pomocí HEMOCHRON Jr. ACT-LR. Celkem 51 párů údajových bodů bylo shromážděno a korelace mezi těmito dvěma testy byla analyzována (r=0,92).

PŘESNOST

A. Přesnost během dne a den ode dne

Přesnost HEMOCHRON Jr. byla vyhodnocena výkonem mnohanásobných HEMOCHRON Jr. ACT-LR testů při použití neheparizovaných (normálních) a heparizovaných (abnormálních) kontrolních materiálů peřiferní krve. Testy probíhly během tří následných dnů, byly použity tři různé přístroje s následujícími výsledky.

	N	Průměr (s)	SD (s)	CV (%)
Normální	27	208	14	6.7
Abnormální	27	299	11	3.8

Opakované testy byly provedeny na jednom přístroji HEMOCHRON Jr. během tří následných dnů, což poskytlo následující výsledky přesnosti pro každý den:

	Normální				Abnormální			
	N	Průměr (s)	SD (s)	CV (%)	Průměr (s)	SD (s)	CV (%)
Den 1	3	202	7,9	3,9	292	17,6	6,0
Den 2	3	217	18,7	8,6	300	1,5	0,5
Den 3	3	214	11,7	5,5	303	7,2	2,4
Celkem	9	211	13,4	6,4	298	10,8	3,6

B. Korelace dvojibo testování

HEMOCHRON Jr. ACT-LR byl proveden dvojité v obou studiích, in vitro a in vivo.

1. Dvojité testování in vitro bylo provedeno při použití krevních vzorků od 15 normálních dárců. Heparin byl přidán k poměrnému množství vzorků, aby se dosáhlo koncentrace v rozmezí od 0 do 2,5 jednotek/ml krve. Celkem 93 párů údajových bodů bylo shromážděno. Korelace r=0,97 se sklonem 0,99 byla získána při provedení dvojitých testů. (Fig. 7)
2. Dvojité testování in vivo bylo provedeno na vzorcích krve 25 kardiovaskulárních pacientů s výsledky ACT pohybujícími se v rozmezí od 87 do 400 sekund. Celkem 76 párů údajových bodů bylo shromážděno. Korelace r=0,93 se sklonem 0,81 byla získána při provedení dvojitých testů (Fig. 8)

OMEZENÍ

Ekvivalentní Celite hodnoty přes 400 sekund nejsou přístrojem zaznamenány. Místo toho se zobrazí zpráva „Mimo rozmezí- nad.“

POZNÁMKA: *Ekvivalentní Celite ACT hodnoty, které překročí 400 sekund následkem nadměrně vysoké citlivosti pacientů na heparin, neznamenají chybu v testu.*

Test HEMOCHRON Jr. ACT-LR používá Celite jako aktivátor, o kterém je známo, že je uměle prodloužen proteázním inhibitorem aprotinin.[7] Test ACT-LR se u těchto pacientů nepoužívá.

Hodnoty zobrazené po ukončení testu jsou ekvivalentní Celite HEMOCHRON ACT (CA510) hodnoty. Ekvivalentní hodnota je založena na korelaci získané od klinických pacientů, a je zobrazena na Fig. 3. I při vysokém stupni korelace (r=0,95), jsou skutečné hodnoty jenom statisticky podobné, ale ne stejné. Klinik si musí vyložit koagulační čas jednotlivého pacienta s ohledem na pacientův klinický stav.

Vzorky s poměrem plazmy ke krvinkám menším než 20% nebo větším než 55% se nedoporučují, protože jejich optická hustota se pohybuje ve vnější části přístrojem zaznamenatelného rozmezí.

HEMOCHRON Jr. ACT-LR je ovlivněn špatným pracovním postupem, což zahrnuje odběr krve a převod krve do vzorkové jamky. Kvalita krevního vzorku může být ovlivněná:

- Pěněním nebo hemolýzou vzorku
- Koagulovanou nebo částečně koagulovanou krví
- Nečekanou antikoagulací
- Antikoagulačním lupusem

Stejně jako při jiných diagnostických zkouškách, výsledky testu HEMOCHRON Jr.by měly být zvářeny s ohledem na stav každého pacienta a na antikoagulační léčbu. Výsledky, které neodpovídají klinickému stavu pacienta, by se měly zopakovat nebo by měly být doplněny dodatečnými údaji testů.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

NEpoužívejte kyvety s prošlou dobou použitelnosti, nebo které nebyly správně skladovány.

NEvsunujte kyvetu do přístroje násilím. Pokud se při vsunutí setkáte s odporovou silou, zvolna kyvetu vyjměte a prohlédněte si kyvetní drážku. Odstraňte všechny překážky před tím než se znovu pokuste přístroj použít (viz Služba a údržba v Příručce k použití HEMOCHRON Jr.).

KONTROLA KVALITY

Pravidelné zkoušky kvality a sledování by mělo být součástí celkového programu zabezpečení kvality. Výrobky HEMOCHRON Jr. pro kontrolu kvality jsou k dispozici k výhodnému a cenově přijatelnému výkonu běžné kontroly kvality.

Každodenní kontrola kvality přístroje

Kontrola kvality by měla být u HEMOCHRON Jr. prováděna ve dvou stupních, jednou za každých 8 hodin provozu. Aby bylo možné uskutečnit každodenní kontrolu kvality, je k dispozici systém elektronické kontroly kvality a umožňuje dvoustupňovou kontrolu přístroje. Detailní pokyny naleznete v provozní příručce k danému přístroji HEMOCHRON, který je používán.

Kontrola kvality testovacích hyvet HEMOCHRONJr.

Parametry každé **šarže** kyvet HEMOCHRON Jr. ACT-LR by měly být ověřeny ve dvou úrovních kontroly kvality tekutiny:

- Při doručení nové zásilky a
- pak po každých 30-ti kalendářních dnech

Po úspěšném ověření parametrů popsaném výše nebude nutné kyvety podrobovat žádné další kontrole kvality tekutiny, pokud není podezření na posun klinických výsledků.

Ověření parametrů je možné provést pomocí příslušných HEMOCHRON Jr. mikrokoagulačních výrobků pro kontrolu kvality plné krve. Přijatelné meze parametrů a způsob jejich aplikace pro ACT-LR zkušební kyvety jsou přiloženy ke každé soupravě na kontrolu kvality.

ODKAZY NA LITERATURU

1. Bull BS, Korpman RA, Huse WM, Boggs BD: Heparin therapy during extracorporeal circulation: I. Problems inherent in existing protocols. J Thorac Cardiovasc Surg 69:674–684, 1975.
2. Doty DB, Knott HW, Hoyt JL, Koepke JA: Heparin dose for accurate anticoagulation in cardiac surgery. J Cardiovasc Surg 20:597–604, 1979.
3. Esposito RA, Culliford AT, Colvin SB, Thomas SJ, Lackner II, Spencer FE: The role of the activated clotting time in heparin administration and neutralization for cardiopulmonary bypass. J Thorac Cardiovasc Surg 85: 174-185, 1983.
4. Gambino R: Monitoring heparin therapy. Lab Report for Physicians 4: 17–20, 1982.
5. Hattersley P: Activated coagulation time of whole blood. JAMA 136:436, 1966.
6. Wang J–S, Lin C–Y, Hung W–T, Thisted RA, Karp RB: In Vitro effects of aprotinin on activated clotting time measured with different activators. J Thorac Cardiovasc Surg 104, 4: 1135–1140, 1992.
7. National Committee for Clinical Laboratory Standards. Collection, Transport, and Preparation of Blood Specimens for Coagulation Testing and Performance of Coagulation Assays; Approved Guideline. CLSI document H21-A.

HEMOCHRON® Jr.

Whole Blood Microcoagulation Systems

Aktiveret Koagulationstid i Lavområde (ACT-LR)

Indlægsseddel

Dansk

Til *in vitro* diagnostisk brug

TILSIGTET BRUG

HEMOCHRON® Jr. ACT–LR er en kvantitativ analyse til overvågning af heparin antikoagulation under forskellige medicinske procedurer. ACT–LR demonstrerer linear korrelation med heparins antikoagulerende virkninger op til 2,5 enheder/ml blod. Den er beregnet til brug ved overvågning af lave til moderate heparin doser, som ofte er forbundet med visse procedurer, f.eks. hjertekateterisation, ekstrakorporal membranoxygenering (ECMO), hæmodialyse og perkutan transluminal koronar angioplastik (PTCA). (HEMOCHRON Jr. ACT+ [JACT+] testen er tilgængelig til overvågning af moderate til høje heparinniveauer [1-6 enheder/ml].)

ACT–LR testen kan udføres på enhver HEMOCHRON Jr. model vha.en frisk fuldblodsprøve. Instrumenterne er bærbare og beregnet til brug ved sengelejе. Instrumenterne er ikke beregnet til hjemmebrug.

OVERSIGT OG FORKLARING

Nøje overvågning og kontrol med antikoagulation er hensigtsmæssigt for at sikre koagelfri blodstrømning samtidig med, at blodningskomplikationer mindskes efter proceduren.[2,3,4]

Testen for aktiveret koagulationstid (ACT), som først blev beskrevet af Hattersley i 1966,[5] er den foretrukne metode til at overvåge heparinbehandling under interventionelle procedurer som f.eks. PTCA. Skønt heparinbehandling er afgørende for at vedligeholde hemostase under proceduren, kan indgivningen udgøre en væsentlig risiko for patienten. Patienters sensitivitet over for heparin kan variere kraftigt (op til tolv gange).[1] For store doser heparin kan medføre farlig blødning, mens for små doser heparin kan medføre trombose. Derfor er det livsvigtigt at overvåge heparinbehandling til sikring mod disse uønskede bivirkninger.

ACT–LR testresultatet omregnes automatisk til en Celite® ACT referenceværdi. Når testen er færdig, viser instrumentets digitale timer kun denne Celite-ækvivalente ACT-værdi, som opgives i sekunder. Visning af den Celite-ækvivalente ACT-værdi gør det lettere at fortolke testresultatet.

FUNKTIONSPRINCIP

HEMOCHRON Jr. instrumenter benytter en mekanisk slutpunkts koagulationsmekanisme, hvor der opstår en koageldannelse inden i ACT–LR-kuvetten til engangsbrug. Efter indførsel af fuldblodsprøven, afmåler instrumentet nøjagtigt 15 mikroliter blod, og fører det automatisk ind i testrillen inden i ACT-LR-kuvetten. Resten af blodprøven, som ikke er nødvendig til testning, bliver automatisk suget ind i kuvettens affaldskanal. Blanding af prøve/reagens samt påbegyndelse af testen udføres automatisk, og kræver ingen handling fra brugerens side. Efter prøven er blandet med reagenset, flyttes den frem og tilbage inden i testrillen, hvor den overvåges for koageldannelse.

Koageldetektionsmekanismen består af række optiske LED-detektorer, som flugter med kuvettens testrille. Hastigheden, som blodprøven bevæger sig med mellem detektorerne, måles. Efterhånden som koageldannelsen begynder, hæmmes blodstrømmen og bevægelsen bliver langsommere. Instrumentet registrerer, at koagelslutpunkt er opnået , når bevægelsen falder til under en fastlagt hastighed. Instrumentet registrerer den Celite-ækvivalente ACT-værdi i sekunder.

REAGENSER

Hver enkelt kasse med ACT–LR-test-kuvetter indeholder:

- 45 poser, som hver indeholder en HEMOCHRON Jr. ACT-LR-testkuvette og et tørremiddel.

ACT–LR-test-kuvetten er et lukket testkammer til engangsbrug, hvor der på forhånd er tilsat et tørret præparat af kaolin, fosfolipid, calciumsalte, stabiliseringsmidler og puffere. Hver kuvette er individuelt indpakket i en pose. Kuvetteposerne er påtrykt en partispecifik udløbsdato.

FORSIGTIG: *Alle brugte testkuvetter skal anses for at være potentielt smitteførlige og skal håndteres forsigtigt, samt bortskaffes i henhold til standard bortskaffelsesregler for medicinsk affald.*

OPBEVARING OG STABILITET

Når de er anbragt i koleskab (2 – 8 °C), er folieposerne med ACT-LR-kuvetterne stabile indtil den påtrykte udløbsdato. Opbevaring ved stuetemperatur (15 – 30 °C) er valgfri for udbrede poser med kuvetter. ACT-LR kuvetter må ikke udsættes for temperaturer over 37 °C.

BEMÆRK: *Stuetemperatur omdatering gælder i maksimalt 12 uger, men må aldrig overstige den påtrykte udløbsdato. Det er nødvendigt at omdatere, hvis produktet opbevares ved stuetemperatur, og dette skal angives ved at udfylde afsnittet med opbevaringsinformation i skemaet "Prestation bekræftet" på kuvettekassernes sidepanel. Når en æske åbnes er korrekt foldet i den åbne ende og sat i koleskab, er den stabil i syv dage. For optimal holdbarhed anbefales det at åbne kuvetteposen lige for brug.*

BRUGSANVISNING

Brugeren skal, inden der udføres nogen analyse, læse brugervejledningen for HEMOCHRON Jr. for en detaljeret brugsanvisning.

Instrumentet betjenes ved at indsætte en kuvette i instrumentet, lade kuvetten varme op, tilsætte en fuldblodsprøve og trykke på START-tasten. Afmåling af prøve, blanding af prøve og reagens, påbegyndelse af testen samt koageldetektion foregår herefter automatisk.

Vedlagt Materiale

- HEMOCHRON Jr. ACT-LR-testkuvetter med tilsat præparat

Nødvendigt materiale, som ikke er vedlagt

- HEMOCHRON Jr., HEMOCHRON Jr. II eller HEMOCHRON Jr. Signature
- 1 ml eller 3 ml plastiksprøjte, 23 eller 21 gauge kanyle (valgfri)

PRØVEINDSAMLING OG HÅNDTERING

Institutions- og CLSI- (H21-A) retningslinier for indsamling af blod til koagulationsstestning skal følges.

Fuldblod må ikke indsamles i blodopsamlingsrør af glas.

Blod må ikke indsamles fra en hepariniseret adgangsslange, lås eller indlagt heparinlås.

Når der indsamles blod gennem indlagte katetre, skal adgangsporten skylles omhyggeligt i henhold til institutionsprocedurer.

1. Indsaml 0,2 ml blod med sprøjten.
2. Tilsæt en dråbe blod i testkuvettens prøvebrønd; idet den fyldes fra bunden af brønden og op. Dette kan gøres enten med eller uden en overførselskanyle. Der skal tilsættes tilstrækkeligt med blod direkte i midterprøvebrønden til at fylde den helt op til randen. Hvis en stor dråbe blod breder sig over midterprøvebrønden, skubbes den over i den udvendige prøvebrønd.
3. Tryk på **START**-tasten.

PRÆSTATIONSKARAKTERISTIKA

BEMÆRK: *De følgende data blev indsamlet vha. en HEMOCHRON Jr.med ACT-LR-kuvetter.*

Normalområde

HEMOCHRON Jr. blev evalueret brug af frisk fuldblod fra raske, frivillige donorer (N=21) og voksne hjerte- og ECMO patienter, som ikke fik heparinbehandling (N=20). Resultaterne vises i Celite-ækvivalente HEMOCHRON ACT-værdier.

	N	Middelværdi (sek.)	SD (sek.)	Område (middelværdi ± 2SD)
Raske donorer	21	131	9	113 – 149
Patienter uden heparin	20	129	20	89 – 169

BEMÆRK: *Institutioner bør hver især etablere deres eget normalområde og målområde for terapeutisk antikoagulation baseret på deres patientgruppe.*

Områder for fjernelse af indlagte karskeder

HEMOCHRON Jr. blev evalueret på 20 patienter ved afslutningen af perkutan transluminal koronar angioplastik eller 5 til 24 timer efter heparinbolusen, der blev indgivet i CCU (Koronarafsnitet), da den anlagte karskede skulle fjernes. Reference Celite ACT (HEMOCHRON) blev sammenlignet vha. en delt blodprøve.

Koagulationstid ved fjernelse af karskede

ACT–LR

	N	Middelværdi (sek.)	SD (sek.)	Område (middelværdi ± 2SD)
	20	145	31	83 – 207

HEMOCHRON Celite ACT

	N	Middelværdi (sek.)	SD (sek.)	Område (middelværdi ± 2SD)
	20	142	37	68 – 216

BEMÆRK: *Hver institution bør etablere deres eget målområde for fjernelse af karskede baseret på patientgruppe.*

Heparin-sensitivitet (fig. 1)

Der blev genereret en in vitro heparin-sensitivitetskurve ved at tilsætte stigende mængder heparin (0 til 2,5 enheder/ml) til afmålinger af blodprøver fra 9 raske donorer. HEMOCHRON Jr. ACT–LR og HEMOCHRON Celite–aktiveret ACT blev udført vha. delte blodprøver. Begge tests blev udført dobbelt. Gennemsnittet af koagulationstiderne fra blodprøver fra de 9 donorer blev udregnet på hvert heparin-niveau.

BEMÆRK: *Denne kurve er kun et eksempel. Hver patient udviser en forskellig dosis-respons kurve.*

Korrelation mellem HEMOCHRON Jr. ACT–LR og reference HEMOCHRON ACT

HEMOCHRON Jr. ACT–LR testen er optimeret for responssensitivitet over et hepariniseringsområde fra 0 to 2,5 enheder/ml. På nuværende tidspunkt er den mest almindelige metode til overvågning af heparin i dette hepariniseringsområde en HEMOCHRON Celite-aktiveret ACT test og en HEMOCHRON glaspartikel aktiveret ACT (P214). Korrelationen mellem HEMOCHRON Jr. ACT–LR og disse reference ACT-tests blev fastlagt.

I. Korrelation mellem HEMOCHRON Jr. ACT–LR og HEMOCHRON Celite–aktiveret ACT

A. Laboratorie (in vitro) undersøgelser (fig. 2)

Der blev indsamlet frisk blod fra 9 raske donorer. Afmålinger af hver blodprøve blev heparin iseret in vitro til 6 niveauer heparinkoncentration, op til 2,5 enheder/ml. Hver prøve blev testet vha. HEMOCHRON Jr. ACT-LR-testen og reference Celite ACT. Der blev i alt indsamlet og analyseret 40 parvise datapunkter (r=0,96).

HEMOCHRON Jr. ACT–LR blev omregnet til den Celite-ækvivalente HEMOCHRON ACT-værdi baseret på en regressionsligning, der blev fastlagt på baggrund af kliniske undersøgelser ifg. fig. 3.

B. Kliniske (in vivo) undersøgelser (fig. 3)

Der blev indsamlet blodprøver fra 17 kardiovaskulære patienter inden heparinisering og efter heparinisering under hjertekateterisation og angioplastik. Der blev i alt indsamlet 71 blodprøver. Blodprøverne blev evalueret samtidigt vha. HEMOCHRON Jr. ACT–LR og reference Celite ACT. Der blev genereret en linecær regressionsligning fra denne korrelation (r=0,95), og den Celite-ækvivalente ACT-værdi, der svarede til ACT–LR-koagulationstiden, blev fastlagt. Denne omregning blev derefter indprogrammeret i alle HEMOCHRON Jr. modeller, således at den Celite-ækvivalente ACT-værdi vises ved færdiggørelsen af ACT-LR-analysen.

II. Korrelation mellem HEMOCHRON Jr. ACT–LR og HEMOCHRON glaspartikelaktiveret ACT

HEMOCHRON glaspartikelaktiveret ACT (P214) er den foretrukne metode til fastlæggelse af ACT-koagulationstid ved ECMO og dialyse. Andre metoder omfatter kaolin eller Celite aktiveret ACT.

A. Laboratorie (in vitro) undersøgelser (fig. 4)

Korrelationen mellem HEMOCHRON Jr. ACT–LR og glaspartikel aktiveret ACT blev påvist i en in vitro laboratorieundersøgelse. Der blev indsamlet frisk blod fra 5 raske donorer. Afmålinger af hver blodprøve blev hepariniseret in vitro til 6 niveauer heparinkoncentration, op til 2,5 enheder/ml. Hver prøve blev testet vha. HEMOCHRON Jr. ACT–LR og glaspartikel ACT (P214). Der blev indsamlet og analyseret i alt 27 parvise datapunkter (r=0,95).

B. Klinisk (in vivo) undersøgelse hos ECMO patienter (fig. 5)

Heparin-antikoagulation blev overvåget hver time i 2 til 48 timer hos 13 ECMO patienter vha. en glaspartikel aktiveret ACT (P214). Patientgruppen omfattede 5 pædiatriske (2 måneder – 15 år gamle) og 8 voksne (22 – 63 år gamle) patienter. Delte prøver blev evalueret samtidigt med HEMOCHRON Jr. ACT–LR. Der blev indsamlet i alt 99 parvise datapunkter, og korrelationen mellem de to tests blev analyseret (r=0,81 hos voksne, r=0,61 hos børn, r=0,72 kombineret).

C. Klinisk (in vivo) undersøgelse hos dialysepatienter (fig.6)

Heparin-antikoagulation blev overvåget hver halve time i 1 til 2 timer hos 21 voksne dialysepatienter (30 til 85 år gamle) vha. en kommerciel tilgængelig kaolinaktiveret ACT. Delte prover blev evalueret samtidigt med HEMOCHRON Jr. ACT-LR. Der blev indsamlet i alt 51 parvise datapunkter, og korrelationen mellem de to tests blev analyseret (r=0,92).

PRÆCISION

A. Præcision indenfor-én-dag og fra dag-til-dag

Præcisionen af HEMOCHRON Jr. blev evalueret ved at udføre flere HEMOCHRON Jr. ACT-LR tests vha. ikke-hepariniserede (normale) og hepariniserede (anormale) fuldblods kontrolmaterialer. Der blev udført analyser på tre forskellige dage vha. tre analysatorer med de følgende resultater:

	N	Middelværdi (sek.)	SD (sek.)	CV (%)
Normal	27	208	14	6,7
Anormal	27	299	11	3,8

Gentagen testning blev udført på en enkelt HEMOCHRON Jr. i tre på hinanden følgende dage, hvilket gav følgende præcisionsresultater for hver dag:

	Normal				Anormal			
	N	Middelværdi (sek.)	SD (sek.)	CV (%)	Middelværdi (sek.)	SD (sek.)	CV (%)
Dag 1	3	202	7,9	3,9	292	17,6	6,0
Dag 2	3	217	18,7	8,6	300	1,5	0,5
Dag 3	3	214	11,7	5,5	303	7,2	2,4
Total	9	211	13,4	6,4	298	10,8	3,6

B. Korrelation af dobbelttestning

HEMOCHRON Jr. ACT–LR blev udført dobbelt i både i in vitro og i in vivo undersøgelser.

1. In vitro dobbelttestning blev udført med blodprøver fra 15 raske donorer. Der blev tilsat heparin til afmålinger af prøverne for at opnå koncentrationer fra 0 til 2,5 enheder/ml blod. Der blev indsamlet i alt 93 parvise datapunkter. Der blev påvist en korrelation på r=0,97 med en hældning på 0,99 mellem dobbelt testene. (Fig. 7)
2. In vivo dobbelttestning blev udført hos 25 kardiovaskulære patienter med ACT resultater fra 87 til 400 sekunder. Der blev indsamlet i alt 76 parvise datapunkter. Der blev påvist en korrelation på r=0,93 med en hældning på 0,81 mellem dobbelttestene. (Fig. 8)

BEGRÆNSNINGER

Celite-ækvivalente ACT værdier over 400 sekunder rapporteres ikke på instrumentet. I stedet vises meddelelsen "Out of range –

HEMOCHRON® Jr.
Whole Blood Microcoagulation Systems

Alacsony tartományú aktivált alvadási idő (ACT-LR)

Tájékoztató
Magyar

In vitro diagnosztikus használatra

RENDELTETÉS
A HEMOCHRON® Jr. ACT-LR a különböző egészségügyi beavatkozások alatt heparinnal végzett alvadásgátlás ellenőrzésére alkalmas kvantitatív vizsgálat. Az ACT-LR lineáris korrelációt demonstrál a heparin antikoaguláns hatásával 2,5 egység/ml vér mennyiségig. Használata alacsony és közepes dózisú heparintérpia ellenőrzése során javallt; ilyen kezelésre számos beavatkozás során szükség van, mint pl. a szívkatéterezés, az extrakorporális membrán oxigenizáció (ECMO), a hemodialízis, valamint a perkután transzluminális koszorúér angioplasztika (PTCA). (Közepes és magas heparinszintek [1-6 egység/ml] ellenőrzésére a HEMOCHRON Jr. ACT+ [JACT+] teszt áll rendelkezésre.)

Az ACT-LR tesztet bármelyik HEMOCHRON Jr. berendezésen el lehet végezni friss teljesvérminta felhasználásával. A berendezések hordozhatók és betegágy melletti vizsgálatra alkalmasak. A berendezések nem alkalmasak otthoni használatra.

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS MAGYARÁZAT
Az alvadásgátlás szoros ellenőrzésére és szabályozására van szükség az alvadékmentes véráramlás biztosításához, és együttal a beavatkozást követő vérzéses szövődmények kockázatának minimalizálásához.[2,3,4]

A PTCA és hasonló intervenciós eljárások során a heparinterápia ellenőrzésére leggyakrabban alkalmazott módszer az aktivált alvadási idő (Activated Clotting Time – ACT) mérése, melyet először Hattersley írt le 1966-ban[3]. Bár a beavatkozás alatt a heparinkezelés elengedhetetlen a hemosztázis fenntartásához, alkalmazása jelentős kockázatot jelenthet a beteg számára. A betegek heparinérzékenysége nagyon eltérő, akár tizenkétszeres különbség is előfordulhat.[1] A heparin túladagolása veszélyes vérzést eredményezhet, míg aluldozírozása trombózishoz vezethet. Ezért a heparinkezelés ellenőrzése életfontosságú e nemkívánatos mellékhatások elkerülésére.

Az ACT-LR vizsgálat eredményét a rendszer automatikusan egy referencia Celite® ACT értékké alakítja. A vizsgálat elvégeztével a berendezés digitális kijelzője kizárólag a másodpercben mutatott, Celite-ekvivalens ACT értéket jeleníti meg. A Celite-ekvivalens ACT érték megjelenítése megkönnyíti a vizsgálati eredmény értelmezését.

A MŰKÖDÉS ALAPELVE
A HEMOCHRON Jr. berendezések mechanikus végponti alvadási mechanizmust alkalmaznak, amely során az alvadékképződés az eldobható ACT-LR küvettában megy végbe. A teljesvérminta behelyezését követően a berendezés pontosan kimér 15 mikroliter vért és automatikusan átteszi azt az ACT-LR küvetta tesztcsatornájába. A vérminta fennmaradó, a vizsgálathoz szükségtelen része automatikusan bekerül a küvetta hulladékcsatornájába. A minta és a reagens összekeverése és a teszt elindítása automatikusan történik, nem igényli a felhasználó közreműködését. A reagenssel való összekeverés után a minta előre-hátra mozog a tesztcsatornában, miközben a rendszer az alvadékképződést figyeli.

Az alvadékérzékelő mechanizmus LED-es optikai detektorok során alkalmazza, amelyek a küvetta tesztcsatornájával egy vonalban helyezkednek el. A rendszer a vérminta detektorok közötti mozgásának sebességét méri. A képződő alvadék gátolja a véráramlást, ezzel a mozgás lelassul. A berendezés akkor érzékeli az alvadás végpontját, amikor a mozgás csökkenő sebessége egy előre meghatározott érték alá esik. A berendezések megjelenítik a másodpercben kifejezett Celite-ekvivalens ACT értéket.

REAGENSEK
Minden ACT-LR tesztküvetta doboz tartalmaz:

- 45 tasakot, melyek mindegyike tartalmaz egy HEMOCHRON Jr. ACT-LR tesztküvettát és egy szárítót

Az ACT-LR tesztküvetta egy olyan önálló, eldobható tesztkamra, amely előre betöltve tartalmaz Celite preparátumot száraz formában, burgonyadextrint, stabilizátorokat és puffereket. Minden egyes küvetta önálló tasakba csomagolva található. A küvettatasakokon tételspecifikus lejárati idő látható.

FIGYELEM! *Minden használt tesztküvettát potenciálisan fertőzőnek kell tekinteni, körültekintéssel kell kezelni, valamint az általános egészségügyi hulladékkezelési szabályokkal összhangban kell kidobni.*

TÁROLÁS ÉS STABILITÁS
Hűtve (2 – 8°C) tárolva a fóliatasakos ACT-LR küvetták a jelzett lejárati időig stabilak. A felbontatlan, tasakban lévő küvetták szobahőmérsékleten (15 – 30°C) is tárolhatók. Tilos kitenni az ACT-LR küvettákat 37°C feletti hőmérsékletnek.

MEGJEGYZÉS: *A szobahőmérsékleten tárolt küvetták újradátumozása maximum 12 hétig lehetséges, de soha nem haladhatja meg a jelzett lejárati időt. Az újradátumozás szobahőmérsékleten történő tárolás esetén szükséges, és megtörténtét jelezni kell az egyes küvettadobozok oldalfalán lévő "Teljesítmény ellenőrizve" ("Performance Verified") táblázat tárolási információ szakaszának kitöltésével. A felbontott tasak, amennyiben megfelelően behajtják a nyitott végén és bűtve tárolják, két napig stabil. Az optimális pultállóság érdekében javasolt a küvettatasak közvetlenül a felhasználás előtti kibontása.*

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
A vizsgálat elvégzése előtt a felhasználónak el kell olvasnia a vonatkozó HEMOCHRON Jr. használati kézikönyvet a részletes működtetési utasítások tekintetében.

A berendezés használatához be kell tenni egy küvettát a rendszerbe, hagyni kell azt felmelegedni, ezután be kell helyezni a teljesvérmintát, majd meg kell nyomni a **START** billentyűt. A minta kimérése, összekeverése a reagenssel, a teszt elindítása, valamint az alvadék detektálása ezután automatikusan megtörténik.

Szolgáltatott anyagok
- Előre betöltött HEMOCHRON Jr. ACT-LR tesztküvetták

Szükséges, de nem szolgáltatott anyagok
- HEMOCHRON Jr., HEMOCHRON Jr. II vagy HEMOCHRON Jr. Signature
- 1 ml-es vagy 3 ml-es műanyag fecskendők, 23 G-s vagy 21 G-s tűvel (a felhasználó határozza szerint)

MINTAVÉTEL ÉS -KEZELÉS
A vérminta levételéhez kövesse az alvadási vizsgálatokhoz szükséges mintavételtel kapcsolatos intézményi és CLSI (H21-A) irányelveket.

Ne vegyen friss teljesvérmintát ívegből készült vérvételi kémcsőbe.

Ne vegyen vérmintát heparinozott branülből/kanülből, annak csapjából, illetve semmilyen bent lévő heparinozott csapból.

Amennyiben bent lévő branülből/kanülből vesz mintát, öblítse át alaposan a hozzáférési nyílást az intézményi előírások szerint.

1. Vegyen 2,0 ml vért a fecskendővel.
2. Tegyen azonnal egy cseppvért a tesztküvetta mintaművedésébe; alulról felfelé töltse fel a művedést. Ezt végezheti átvitő tűvel, vagy anélkül. Tegyen közvetlenül a közepső mintaművedésbe elegendő vért arra, hogy az teljesen megteljen. Amennyiben egy nagy cseppvért a közepső mintaművedés fölé terjedne, tolja azt át a külső mintaművedésbe.
3. Nyomja meg a **START** billentyűt.

A TELJESÍTMÉNY JELLEMZŐI
MEGJEGYZÉS: *A következő adatok rögzítése a HEMOCHRON Jr. berendezés ACT-LR küvettákkal való használata során történt.*

Normális tartomány
A HEMOCHRON Jr. berendezés kiértékelése normális önkéntes donorok (N=21), valamint heparinkezelésben nem részesülő, szívbeteg és ECMO-s felnőtt betegek (N=20) friss teljes vérének felhasználásával történt . Az eredmények Celite-ekvivalens HEMOCHRON ACT értékként láthatók.

	N	Középérték (mp)	SD (mp)	Tartomány (középérték ± 2SD)
Normális donorok	21	131	9	113 – 149
Heparinnal nem kezelt betegek	20	129	20	89 – 169

MEGJEGYZÉS: *Az egyes intézményeknek magukénak kell megbátározniuk a bűvelkyítéétel céltartományát saját betegpopulációjuk alapján.*

A beültetett érbüvely kivételekor előforduló tartományok
A HEMOCHRON Jr. berendezés értékelését 20 betegen végezték el a perkután transzluminális koszorúér angioplasztika elvégzésekor, vagy 5-24 órával az szívbaj-osztályon/őrzőben adott heparin bolust követően, a beültetett érhüvely kivételekor. A referencia Celite ACT (HEMOCHRON) értéket összehasonlították kettőosztott vérminta segítségével.

Alvadási idő a hüvely kivételekor

ACT–LR

N	Középérték (mp)	SD (mp)	Tartomány (középérték ± 2SD)
20	145	31	83 – 207

HEMOCHRON Celite ACT

N	Középérték (mp)	SD (mp)	Tartomány (középérték ± 2SD)
20	142	37	68 – 216

MEGJEGYZÉS: *Az egyes betegek egyéni heparinadózis-válaszgörbéjével rendelkeznek.*

A HEMOCHRON Jr. ACT-LR és a referencia HEMOCHRON ACT közötti korreláció
A HEMOCHRON Jr. ACT-LR vizsgálat válaszérzékenysége 0-2,5 egység/ml heparinizációs tartományra optimalizált. Jelenleg a legelterjedtebb módszer a heparinszint ellenőrzésére ezen a heparinizációs tartományon belül a HEMOCHRON Celite-aktivált ACT teszt, valamint a HEMOCHRON üvegrészecske-aktivált ACT (P214). Meghatározták a HEMOCHRON Jr. ACT-LR és ezen referencia ACT tesztek közötti korrelációt.

I. A HEMOCHRON Jr. ACT-LR és a HEMOCHRON Celite-aktivált ACT közötti korreláció

A. Laboratóriumi (in vitro) vizsgálatok (Fig. 2)

Friss vért vettek 9 normális donortól. Az egyes vérminták aliquot-jait heparinizáltak 6 különböző heparinkoncentráción, 2,5 egység/ml koncentrációig. Ezután megvizsgálták az egyes mintákat a HEMOCHRON Jr. ACT-LR tesztlet és a referencia Celite ACT vizsgálattal. Összesen 40 párosított adatpontot gyűjtöttek össze és ezeket elemezték (r=0,96).

A HEMOCHRON Jr. ACT-LR értéket átalakították Celite-ekvivalens HEMOCHRON ACT értékké a klinikai vizsgálatok alapján meghatározott regressziós egyenlet segítségével, amint a Fig. 3 látható.

B. Klinikai (in vivo) vizsgálatok (Fig. 3)

17 kardiovaszkuláris betegségben szenvedő egyéntől vettek vérmintát szívkatéterezés és angioplasztika során végzett heparinizálás előtt és után. Összesen 71 mintát vettek le. A mintákat egyszerre vizsgálták a HEMOCHRON Jr. ACT-LR tesztlet és a referencia Celite ACT vizsgálattal. A korreláció (r=0,95) alapján készült el a lineáris regressziós egyenlet, mely segítségével meghatározták az ACT-LR alvadási időnek megfelelő Celite-ekvivalens ACT értéket. Ezt az átvitási egyenletet programozták be ezután minden HEMOCHRON Jr. típusba úgy, hogy azok az ACT-LR vizsgálat elvégeztekor a Celite-ekvivalens ACT értéket jelenítsék meg.

II. A HEMOCHRON Jr. ACT-LR és a HEMOCHRON üvegrészecske-aktivált ACT közötti korreláció

A HEMOCHRON üvegrészecske-aktivált ACT (P214) egy kedvelt módszer az ACT alvadási idő meghatározására ECMO és dialízis során. Más módszerek között megemlíthető a kaolin-aktivált vagy Celite-aktivált ACT teszt.

A. Laboratóriumi (in vitro) vizsgálatok (Fig. 4)

A HEMOCHRON Jr. ACT-LR és az üvegrészecske-aktivált ACT közötti korreláció meghatározása in vitro laboratóriumi vizsgálat keretei között történt. Friss vért vettek 5 normális donortól. Az egyes vérminták aliquot-jait különböző koncentrációkra heparinizálták, 2,5 egység/ml heparinkoncentrációig. Ezután megvizsgálták az egyes mintákat a HEMOCHRON Jr. ACT-LR tesztlet és az üvegrészecske ACT (P214) vizsgálattal. Összesen 27 párosított adatpontot gyűjtöttek össz és ezeket elemezték (r=0,95).

B. Klinikai (in vivo) vizsgálat ECMO kezelésben részesülő betegeken (Fig.5)

13 ECMO-s betegen 2–48 órán át óránként ellenőrizték a heparinos alvadásgátlást az üvegrészecske-aktivált ACT (P214) teszt segítségével. A betegpopulációt 5 gyermekkorú (2 hónapostól 15 évesig) és 8 felnőtt (22 – 63 éves) beteget tartalmazott. A kettőosztott mintákat egyidejűleg a HEMOCHRON Jr. ACT-LR tesztlet kiértékelték. Összesen 99 párosított adatpontot gyűjtöttek össze és elemezték a két teszt közötti korrelációt (r=0,81 felnőtteken, r=0,61 gyermekeken, r=0,72 összesítve).

C. Klinikai (in vivo) vizsgálat dialízis kezelésben részesülő betegeken (Fig. 6)

21 felnőtt (30 – 85 éves), dialízis kezelésben részesülő betegen 1-2 órán át 30 percenként ellenőrizték a heparinos alvadásgátlást egy kereskedelmi forgalomban kapható kaolin-aktivált ACT tesztlet. A kettőosztott mintákat egyidejűleg a HEMOCHRON Jr. ACT-LR tesztlet kiértékelték. Összesen 51 párosított adatpontot gyűjtöttek össze és a két teszt közötti korrelációt elemezték (r=0,92).

PONTOSSÁG
A. Napközbeni és napok közti pontosság
A HEMOCHRON Jr. berendezés pontosságának értékelésére többszörös HEMOCHRON Jr. ACT-LR vizsgálatot végeztek nem heparinozott (normális) és heparinozott (abnormális) teljesvér kontrollok felhasználásával. A teszteket három különböző napon, három analizátoron végezték, a következő eredményekkel:

	N	Középérték (mp)	SD (mp)	CV (%)
Normális	27	208	14	6,7
Abnormális	27	299	11	3,8

Ismételt vizsgálatokat végeztek ugyanazon HEMOCHRON Jr. analizátoron, három egymást követő napon át; az egyes napok pontossági eredményei a következők:

	Normális			Abnormális		
	N	Középérték (mp)	SD (mp)	CV (%)	Középérték (mp)	SD (mp)	CV (%)
1. nap	3	202	7,9	3,9	292	17,6	6,0
2. nap	3	217	18,7	8,6	300	1,5	0,5
3. nap	3	214	11,7	5,5	303	7,2	2,4
Összesen	9	211	13,4	6,4	298	10,8	3,6

B. A kétszeres tesztek közti korreláció
A HEMOCHRON Jr. ACT-LR teszt végrehajtása mind az in vitro, mind az in vivo vizsgálatokban kétszeres formában történt.

1. Az in vitro kétszeres tesztekben 15 normális donortól származó ve//rmintát használtak fel. A mintát aliquot-jait heparin hozzadásával 0-2,5 egység/ml vér közötti heparinkoncentrációkra állították be. Összesen 93 párosított adatpontot gyűjtöttek össze. A kétszeres tesztek közötti korreláció r=0,97 volt, 0,99 meredekséggel. (Fig. 7)
2. Az in vivo kétszeres teszteket 25 kardiovaszkuláris betegségben szenvedő alanyon végezték, akik ACT eredményei 87 és 400 másodperc között voltak. Összesen 76 párosított adatpontot gyűjtöttek össze. A kétszeres tesztek közötti korreláció r=0,93 volt, 0,81 meredekséggel. (Fig. 8)
3. Esposito RA, Culliford AT, Colvin SB, Thomas SJ, Lackner II, Spencer FE: The role of the activated clotting time in heparin administration and neutralization for cardiopulmonary bypass. J Thorac Cardiovasc Surg 85:174-185, 1983.
4. Gambino R: Monitoring heparin therapy. Lab Report for Physicians 4:17–20, 1982.
5. Hattersley P: Activated coagulation time of whole blood. JAMA 136:436, 1966.
6. Wang J–S, Lin C–Y, Hung W–T, Thisted RA, Karp RB: In Vitro effects of aprotinin on activated clotting time measured with different activators. J Thorac Cardiovasc Surg 104, 4:1135–1140, 1992.
7. National Committee for Clinical Laboratory Standards. Collection, Transport, and Preparation of Blood Specimens for Coagulation Testing and Performance of Coagulation Assays; Approved Guideline. CLSI document H21-A.

KORLÁTOZÁSOK
A berendezés nem jeleníti meg a 400 másodperc feletti Celite-ekvivalens ACT értékeket. Ehelyett az "Out of range – Hi" ("Tartományon kívül – magas") üzenet olvasható a kijelzőn.

MEGJEGYZÉS: *A betegek rendkívül magas heparinérzékenysége miatti, 400 másodpercet meghaladó Celite-ekvivalens ACT értékek nem jelentik a vizsgálat bibáját.*

A HEMOCHRON Jr. ACT-LR vizsgálat aktivátorként Celite-ot alkalmaz, amelynek hatását az aprotinin nevű proteáz inhibitor tudvalevőleg mesterségesen megnyújtja.[6] Az ACT-LR teszt nem alkalmazható olyan betegeken, akiknek ez az inhibitor van rendszerükben.

A vizsgálat végén megjelenő eredmények Celite-ekvivalens HEMOCHRON ACT (CA510) értékek. Az ekvivalens érték képzése klinikai betegek vizsgálatának segítségével meghatározott korreláción alapul, amely a 3. ábrán látható. Haba//r a korreláció foka igen magas (r=0,95), a két vizsgálat tényleges értékei statisztikailag csak hasonlóak, de nem azonosak. A klinikusnak az alvadási időeredményt a beteg klinikai állapotának fényében kell értelmeznie.

20% alatti, illetve 55% feletti hematokrit értékkel rendelkező minták vizsgálata nem javasolt, mivel ezek optikai denzitása kívül esik a berendezés detektálási tartományán.

A HEMOCHRON Jr. ACT-LR értéket befolyásolja a rossz technika, többek között a vérvétel közben, valamint a mintaművedésbe történő átvitel közben alkalmazott rossz technika. A vérminta minőségét a következők befolyásolhatják:

- A minta habzása, illetve hemolízise
- Alvadt vagy részlegesen alvadt vér
- Fel nem ismert alvadásgátlás
- Lupus-antikoaguláns

Mint minden diagnosztikus vizsgálatnál, a HEMOCHRON Jr. teszt eredményeket is a beteg állapota és az alkalmazott alvadásgátló kezelés fényében kell értékelni. Minden olyan eredményt, amely nem áll összhangban a beteg klinikai állapotával, meg kell ismételni, vagy további vizsgálati adatokkal kiegészíteni.

A HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK
NE használjon lejárt, illetve helytelen módon tárolt küvettákat.

NE erőltesse bele a küvettát a berendezésbe. Amennyiben ellenállást tapasztal a behelyezés közben, óvatosan vegye ki a küvettát és vizsgálja meg a küvetta számára szolgáló nyílást. Távolítson el minden akadályt, mielőtt tovább használná a berendezést (lásd a "Szerelés és karbantartás" részt a megfelelő HEMOCHRON Jr. használati kézikönyvben).

MINŐSÉGELLENŐRZÉS
A rutinos minőségellenőrzés és -követés egy átfogó minőségbiztosítási program része kell hogy legyen. A rutinos minőségellenőrzés kényelmessé és gazdaságossá tételéhez különböző HEMOCHRON Jr. minőségellenőrző termékek állnak rendelkezésre.

A berendezés napi minőségellenőrzése
A HEMOCHRON Jr. berendezésen minden 8 órás működés után minőségellenőrzést kell végrehajtani, kétszintű kontroll alkalmazásával. A napi minőségellenőrzés megkönnyítése érdekében elektronikus minőségellenőrzés áll rendelkezésre, amely alkalmas a berendezés kétszintű ellenőrzésére. Részletes utasításokért olvassa el a használandó HEMOCHRON műszer kezelői kézikönyvét.

A HEMOCHRON Jr. tesztküvetták minőségellenőrzése
A HEMOCHRON Jr. ACT-LR küvetták minden egyes ***tételén*** kétszintű folyadékos minőségellenőrzéssel teljesítményhitelesítést kell végezni:

- ha új szállítmány érkezik, ÉS
- azt követően minden 30 naptári nap utáltével.

A fentiek szerint végrehajtott, sikeres teljesítményhitelesítést követően a küvettákon csak akkor kell további folyadékos minőségellenőrzést végezni, ha a klinikai eredményekben eltérés gyanúja merül fel.

A teljesítményhitelesítés a megfelelő HEMOCHRON Jr. mikrokoagulációs teljes vér minőségellenőrző készítmények segítségével hajtható végre. Az elfogadható teljesítménytartományok adatait és ACT-LR tesztküvettákra való alkalmazásuk módját a minőségellenőrző készítménykészletek tartalmazzák.

IRODALOM

1. Bull BS, Korpman RA, Huse WM, Boggs BD: Heparin therapy during extracorporeal circulation: I. Problems inherent in existing protocols. J Thorac Cardiovasc Surg 69:674–684, 1975.
2. Doty DB, Knott HW, Hoyt JL, Koepke JA: Heparin dose for accurate anticoagulation in cardiac surgery. J Cardiovasc Surg 20:597–604, 1979.
3. Esposito RA, Culliford AT, Colvin SB, Thomas SJ, Lackner II, Spencer FE: The role of the activated clotting time in heparin administration and neutralization for cardiopulmonary bypass. J Thorac Cardiovasc Surg 85:174-185, 1983.
4. Gambino R: Monitoring heparin therapy. Lab Report for Physicians 4:17–20, 1982.
5. Hattersley P: Activated coagulation time of whole blood. JAMA 136:436, 1966.
6. Wang J–S, Lin C–Y, Hung W–T, Thisted RA, Karp RB: In Vitro effects of aprotinin on activated clotting time measured with different activators. J Thorac Cardiovasc Surg 104, 4: 1135–1140, 1992.
7. National Committee for Clinical Laboratory Standards. Collection, Transport, and Preparation of Blood Specimens for Coagulation Testing and Performance of Coagulation Assays; Approved Guideline. CLSI document H21-A.

HEMOCHRON® Jr.
Whole Blood Microcoagulation Systems

Czas krzepnięcia aktywowanego-niski przedział (ACT-LR)

Ulotka informacyjna
język polski

test diagnostyczny do zastosowania *in vitro*

ZASTOSOWANIE TESTU
HEMOCHRON® Jr. ACT-LR jest ilościowym testem do monitorowania przeciwzakrzepowej aktywności heparyny, stosowanej podczas różnych zabiegów medycznych. Test ACT-LR wykazuje liniową korelację z przeciwzakrzepowymi własnościami heparyny o stężeniu do 2,5 j./ml krwi. Test przeznaczony jest do monitorowania od niskich do średnich dawek heparyny, często jest stosowany przy zabiegach cewnikowania serca, zabiegach pozaustrojowego, przezblonowego utlenowania krwi (ECMO), hemodializie oraz w przezskórnej wewnątrznaczyniowej angioplastyce wieńcowej (PTCA). (Test ACT+ [JACT+] do wykonywania na aparacie HEMOCHRON Jr. jest stosowany do monitorowania od średnich do wysokich dawek heparyny [1-6 j./ml].)

Test ACT-LR wykonywany jest na dowolnym aparacie HEMOCHRON Jr. w próbce świeżej krwi. Jest to przenośna aparatura przeznaczona do użytku przy łóżku pacjenta. Czytnik nie jest przeznaczony do użytku domowego.

STRESZCZENIE I OBJAŚNIENIA
Aby zapewnić przepływ wolnej od skrzepów krwi a jednocześnie zminimalizować pojawienie się komplikacji w postaci krwawień, będących konsekwencją zabiegu, należy uważnie monitorować zabieg oraz kontrolować aktywność przeciwzakrzepową leku. [2,3,4]

Test do oznaczania czasu krzepnięcia aktywowanego (ACT), po raz pierwszy opisany w 1966[3] roku przez Hattersley'a, jest metodą z wyboru, przeznaczoną do monitorowania terapii heparynowej w przebiegu zabiegów interwencyjnych takich jak PTCA. Chociaż zastosowanie terapii heparynowej jest bardzo istotne dla utrzymania prawidłowej hemostazy w czasie wykonywanych zabiegów, to jej podanie pacjentowi obarczone jest znacznym ryzykiem. Wśród pacjentów spotykana jest 12-krotna różnica w reakcji na heparynę.[1] Przedawkowanie heparyny może zakończyć się niebezpiecznym krwawieniem, podczas gdy podanie niewystarczającej dawki może doprowadzić do zakrzepicy. Dlatego też , aby nie dopuścić do wystąpienia wymienionych niepożądanych efektów ubocznych, należy monitorować terapię heparynową.

Wyniki testu ACT-LR są automatycznie przeliczane na odpowiadające im wartości referencyjnego Celite® ACT. Na zakończenie testu, czasomierz cyfrowy czytnika wyświetli tylko wartość równoważnika Celite ACT (w sekundach). Wartości podawane w równoważnikach Celite ACT ułatwiają interpretację wyników.

zasada działania testu
Zasada działania czytników HEMOCHRON Jr. polega na wykorzystaniu mechanizmu tworzenia się skrzepu w punkcie końcowym procesu krzepnięcia. Skrzep tworzy się w jednorazowych kuwetach ACT-LR. Po dodaniu próbki pełnej krwi, czytnik odmierza dokładnie 15 mikrolitrów krwi do kuwety ACT-LR, a następnie przesuwa ją do kanału pomiarowego. Pozostała część próbki, nie objęta badaniem, przesuwana jest automatycznie do kanału kuwety, w którym umieszczany jest materiał odpadowy. Mieszanie próbki z odczynnikiem oraz moment rozpoczęcia testu dokonuje się również w sposób automatyczny, bez udziału operatora. Po zmieszaniu z odczynnikiem próbka przesuwana jest ruchem wahadłowym w kanale testowym, a tworzenie się skrzepu jest monitorowane.

Mechanizm wykrywania skrzepu składa się z układu detektorów optycznych (fotodiod), ustawionych w linii kanału testowego kuwety. Mierzona jest prędkość z jaką próbka krwi przesuwa się pomiędzy detektorami. Wraz z rozpoczęciem procesu tworzenia się skrzepu, przepływ krwi jest hamowany i ruch ulega spowolnieniu. Gdy prędkość ulega zmniejszeniu poniżej założonej wartości, w pomiarze instrumentalnym rozpoznawany jest osiągnięty punkt końcowy procesu krzepnięcia. Czytnik podaje wyniki testu w równoważnikach Celite ACT (w sekundach).

ODCZYNNIKI
Każde opakowanie kuwet testowych ACT-LR zawiera:

- 45 saszetek, każda z nich zawiera jedną kuwetę testową HEMOCHRON Jr. ACT-LR oraz jeden osuszacz.

Kuwety testowe ACT-LR są autonomicznymi, jednorazowymi testowymi komorami, wypełnionymi wstępnie suchym celitem, dekstryną ziemniaczaną, stabilizatorami i buforami. Każda kuweta jest oddzielnie zapakowana w saszetkę. Saszetki z kuwetami są ostemplowane datą ważności właściwą dla danej serii produktu.

OSTRZEŻENIE: *Wszystkie używane kuwety testowe należy uważać za potencjalnie zakaźne, należy je stosować z zachowaniem środków ostrożności, oraz niszczyć zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami o likwidowaniu odpadów medycznych.*

przechowywanie i stabilność
Zafoliowane w saszetki, przechowywane w lodówce (2 - 8°C) kuwety ACT-LR zachowują stabilność aż do osiągnięcia deklarowanej daty ważności. Kuwety w zafoliowanych, zamkniętych saszetkach można też opcjonalnie przechowywać w temperaturze pokojowej (15 - 30°C). Kuwety ACT-LR nie powinny być wystawiane na działanie temperatur wyższych niż 37°C.

UWAGA: *Przechowywanie w temperaturze pokojowej może zostać wydłużone maksymalnie do 12 tygodni, ale nigdy nie powinno przekroczyć deklarowanej daty ważności. Przedatowywanie jest niezbędne przy przechowywaniu testu w temperaturze pokojowej i powinno zostać zaznaczone w tabeli "Performance Verified" ("Potwierdzenie przydatności") jako uzupełnienie informacji dotyczących przechowywania i umieszczone na bocznej ściance każdego opakowania zawierającego kuwetę. Otwarta saszetka właściwie zawinięta od strony rozcięcia i przechowywana w lodówce zachowuje stabilność przez siedem dni. Dla zachowania optymalnego okresu ważności, zaleca się otworzyć saszetkę z kuwetą bezpośrednio przed jej zastosowaniem.*

instrukcja postępowania
Przed przystąpieniem do wykonania jakiegokolwiek oznaczenia, w celu zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania, użytkownik powinien odwołać się do odpowiedniego Podręcznika użytkownika czytnika HEMOCHRON Jr.

Oznaczenie instrumentalne polega na wstawieniu kuwety do czytnika, pozostawieniu jej do ogrzania, dodaniu próbki pełnej krwi oraz wciśnięciu klawisza **START**. Pomiar próbki, wymieszanie próbki z odczynnikiem, inicjacja oznaczenia oraz wykrycie skrzepu nastąpi w sposób automatyczny.

Materiały dostarczone w zestawie
- Wstępnie wypełnione kuwety testowe HEMOCHRON Jr. ACT-LR

Materiały potrzebne do wykonania testu, ale nie dostarczone w zestawie
- HEMOCHRON Jr., HEMOCHRON Jr. II lub HEMOCHRON Jr. Signature
- 1 ml lub 3 ml plastykowe strzykawki, igły o rozmiarze 23 lub 21 (opcjonalnie)

pobieranie próbek oraz wykonanie testu
Przed przystąpieniem do pobrania próbki krwi, należy zapoznać się z instrukcjami zakładowymi oraz CLSI (H21-A) zawierającymi wskazówki, jak pobierać próbki do oznaczania krzepliwości krwi.

Nie należy pobierać próbek świeżej krwi stosując szklane probówki do pobierania krwi.

Nie należy pobierać krwi z heparynizowanego cewnika, wenflonu lub heparynizowanego cewnika umocowanego na stałe.

Jeżeli próbki pobierane są przy zastosowaniu cewników umocowanych na stałe, należy przepłukać dokładnie jego ujście, postępując zgodnie z zakładowymi procedurami.

1. Przy pomocy strzykawki pobrać 0,2 ml krwi.
2. Natychmiast odmierzyć jedną kroplę krwi do studzienki kuwety testowej, zaczynając od dna, aż do całkowitego jej zapełnienia. W tym celu można użyć (opcjonalnie) igły do przenoszenia. Wystarczająca objętość krwi powinna być rozdzielona dokładnie do centralnej studzienki testowej, wypełniając ją równomiernie aż do brzegu. Jeżeli zdarzy się, że duża kropla krwi przelejе się ponad brzegiem centralnej studzienki testowej, należy ją przesunąć do zewnętrznej studzienki testowej.
3. Wcisnąć klawisz **START.**

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA
Uwaga: *Poniższe wartości otrzymano stosując HEmochron jr. łącznie z kuwetami act-LR.*

Normalny zakres
HEMOCHRON Jr. oceniano stosując do oznaczenia świeżą, pełną krew, pobraną od zdrowych dawców – ochotników (N=21) oraz od chorych na serce i poddanych zabiegowi ECMO dorosłych pacjentów, nie poddawanych terapii heparynowej (N=20). Wyniki podano w równoważnikach HEMOCHRON Celite ACT.

	N	średnio (sek)	SD (sek)	zakres (wart. średnia ±2 SD)
zdrowi dawcy	21	131	9	113 – 149
pacjenci (nie otrzymujący heparyny)	20	129	20	89 – 169

UWAGA: *Każda instytucja powinna określić swój własny normalny zakres oraz zakres docelowy terapeutycznego poziomu środków przeciwzakrzepowych w odniesieniu do własnej grupy pacjentów.*

Czas (zakres) potrzebny do przeprowadzenia zabiegu usunięcia implantu naczyniowej kaniuli
HEMOCHRON Jr. oceniano w badaniu przeprowadzonym na grupie 20 pacjentów po zabiegu PTCA (przezskórna wewnątrznaczyniowa angioplastyka wieńcowa) lub w 5 do 24 godzin po jednorazowym szybkim podaniu heparyny w CCU, w czasie zabiegu usuwania implantu naczyniowej kaniuli. Zastosowano podzielonąprobkę aby porównać wyniki z referencyjnym testem Celite ACT (HEMOCHRON).

Czas krzepnięcia mierzony w czasie usuwania kaniuli
ACT–LR

N	średnio (sek)	SD (sek)	Zakres (śr. zakres ±2SD)
20	145	31	83 – 207

HEMOCHRON Celite ACT

N	średnio (sek)	SD (sek)	Zakres (śr. zakres ±2SD)
20	142	37	68 – 216

Uwaga: *Każda instytucja powinna ustalić swój własny zakres docelowy potrzebny do przeprowadzenia zabiegu usuwania kaniuli w odniesieniu do własnej grupy pacjentów.*

Czułość heparyny (Fig. 1)
Krzywą czułości heparyny, wykreśloną na podstawie oznaczeń in vitro, uzyskano dodając do rosnących objętości heparyny (od 0 do 2,5 j./ml) do próbek krwi o równych objętościach, pobranej od 9 zdrowych dawców. Każdą próbkę podzielono na dwie pochodne wykonując testy HEMOCHRON Jr. ACT-LR oraz HEMOCHRON ACT, w którym aktywatorem jest celit. Każdy test był wykonany w dwukrotnym powtórzeniu. Dla każdego stężenia heparyny przeprowadzono uśrednienie czasów krzepnięcia próbek pobranych od 9 dawców.

Uwaga: *Przedstawiona krzywa jest jedynie przykładowym wykresem.. W przypadku każdego pacjenta odpowiedź na dawkę heparyny jest inna, a więc i krzywe mają indywidualny charakter.*

Korelacja pomiędzy testem ACT-LR wykonywanym na HEMOCHRON Jr. a referencyjnym HEMOCHRON ACT)
Optymalna odpowiedź uzyskana w teście HEMOCHRON Jr. ACT-LR jest osiągalna dla stężeń heparyny mieszczących się w zakresie od 0 do 2,5 j./ml. Najczęściej stosowaną metodą monitorowania poziomów heparyny w tym zakresie heparynizacji jest test HEMOCHRON Jr. ACT (+ celit zastosowany jako aktywator) oraz test HEMOCHRON ACT, w którym aktywatorem są szklane granulki (P214). Określono korelację pomiędzy testami HEMOCHRON Jr. ACT-LR i referencyjnym testem ACT.

I. Korelacja pomiędzy testami HEMOCHRON Jr. ACT-LR i HEMOCHRON ACT (+celit zastosowany jako aktywator).

A. Badania laboratoryjne (in vitro) (Fig. 2)

Pobrano świeżą krew od 9 zdrowych dawców. Odmierzono równe objętości krwi dodając do nich heparynę (in vitro), uzyskując 6 różnych stężeń; najwyższe stężenie wynosiło 2,5 j./ml. Każda próbka była oznaczona na aparacie HEMOCHRON Jr. z zastosowaniem testu ACT-LR oraz testu referencyjnego Celite ACT. Przeanalizowano 40 uzyskanych wyników (r=0,96).

Wartości testu ACT-LR uzyskane z badania na HEMOCHRON Jr. zostały zamienione na równoważniki Celite ACT (dla HEMOCHRON Jr.) w oparciu o równanie regresji opracowane na podstawie przeprowadzonych badań klinicznych (Fig. 3).

B. Badania kliniczne (in vivo) (Fig. 3)

17 próbek krwi pobrano od pacjentów z zaburzeniami sercowo-naczyniowymi przed podaniem im heparyny a następnie po podaniu heparyny podczas zabiegów cewnikowania serca i przeprowadzonej angioplastyki. Zebrano razem 71 próbek krwi. Próbki były oceniane równolegle dwoma testami: ACT-LR (oznaczenia na czytniku HEMOCHRON Jr.) oraz referencyjnym testem Celite ACT. Na podstawie uzyskanej korelacji (r=0,95) opracowano równanie regresji liniowej, a następnie wyliczono wartości równoważnika Celite ACT, odpowiadającego uzyskanemu testem ACT-LR czasowi krzepnięcia. Powyższa kon