HEMOCHRON® Jr.

Whole Blood Microcoagulation Systems

Activated Partial Thromboplastin Time (APTT)

Package Insert

English

For *in vitro* Diagnostic Use

INTENDED USE

The HEMOCHRON® Jr. APTT is a unitized microcoagulation test intended for use in performing a quantitative, one-stage APTT. The APTT test is used for evaluation of low dose heparin anticoagulation (up to 1.5 units/ml of blood).

The APTT test is performed on the HEMOCHRON Jr. Signature or HEMOCHRON Jr. II instrument using a fresh whole blood sample. Each instrument is portable and intended for bedside use. The instrument is not intended for home use.

NOTE: *This HEMOCHRON Jr. APTT is not intended for use with earlier versions of the HEMOCHRON Jr.*

SUMMARY AND EXPLANATION

The HEMOCHRON Jr. APTT is a measure of the intrinsic coagulation pathway, which involves all coagulation factors except Factors VII and III (tissue factor). The APTT is a modification of the Partial Thromboplastin Time (PTT). The PTT uses a phospholipid derived from either brain or lung tissue to mimic the role of platelets in the coagulation process. The APTT contains a contact activating substance to standardize the activation of Factor XII, thereby providing a more precise and sensitive assay. The addition of a contact activator such as glass, kaolin or diatomaceous earth distinguishes the APTT from the PTT.

Whole blood APTT values obtained with the HEMOCHRON Jr. instruments are converted to plasma equivalent APTT values which may be more familiar to the clinician thus providing a common standard against which therapeutic decisions can be made.

Assay resolution is achieved through the use of a platelet factor 3 substitute and a kaolin activator, and does not require an incubation step.

PRINCIPLE OF OPERATION

The HEMOCHRON Jr. instruments utilize a mechanical endpoint clotting mechanism in which clot formation occurs within the disposable APTT cuvette. Following whole blood sample introduction, the instrument precisely measures 15 microliters of blood and automatically moves it into the test channel within the APTT cuvette. The remainder of the blood sample, not needed for testing, is automatically drawn into the waste channel of the cuvette. Sample/reagent mixing and test initiation are also performed automatically, requiring no operator interaction. After mixing with the reagent, the sample is then moved back and forth within the test channel and monitored for clot formation.

The clot detection mechanism consists of a series of LED optical detectors aligned with the test channel of the cuvette. The speed at which the blood sample moves between the detectors is measured. As clot formation begins, blood flow is impeded and the movement slows. The instrument recognizes that a clot endpoint has been achieved when the movement decreases below a predetermined rate. The instrument reports plasma equivalent values mathematically converted from whole blood test results. The whole blood APTT value can be displayed by depressing and holding the instrument's **START** key.

REAGENTS

Each box of APTT test cuvettes contains:

– 45 pouches, each containing one HEMOCHRON Jr. APTT test cuvette and one desiccant

The APTT test cuvette is a self-contained disposable test chamber preloaded with a dried preparation of kaolin, phospholipid, stabilizers and buffers. Each cuvette is individually packaged in a pouch. Cuvette pouches are stamped with a lot specific expiration date.

CAUTION: *All used test cuvettes should be considered as potentially infectious, handled with care and disposed of using standard medical waste disposal policy.*

STORAGE AND STABILITY

When refrigerated (2 - 8°C), the foil pouched APTT cuvettes are stable until the marked expiration date. Room temperature storage (15 - 30°C) is optional for unopened, pouched cuvettes. APTT cuvettes should not be exposed to temperatures in excess of 37°C.

NOTE: *Room temperature re-dating is to a maximum of 12 weeks, but must never exceed the marked expiration date. Re-dating is necessary if stored at room temperature and should be indicated by completing the storage information section of the "Performance Verified" table on the side panel of each cuvette box. The opened pouch, properly folded at the open end, and refrigerated, is stable for five days. For optimal shelf life, it is recommended to open the cuvette pouch immediately before use.*

OPERATING INSTRUCTIONS

Before performing any assay, the user should refer to the HEMOCHRON Jr. Signature or the HEMOCHRON Jr. II Operator's Manual for detailed operating instructions.

The instrument is operated by inserting a cuvette into the instrument, allowing it to warm, introducing a whole blood sample and depressing the **START** key. Sample measurement, sample/reagent mixing, test initiation and clot detection will then proceed automatically.

Material Provided

– Preloaded HEMOCHRON Jr. APTT test cuvettes

Material Required, but Not Provided

– HEMOCHRON Jr. Signature or HEMOCHRON Jr. II only

– 1 mL or 3 mL plastic syringes, 23 or 21 gauge needle (optional)

SAMPLE COLLECTION AND HANDLING

To obtain blood specimen, follow institutional and NCCLS (H21-A3, H47-A) guidelines for obtaining samples for coagulation testing.

Do not collect fresh whole blood samples using glass blood collection tubes.

Do not obtain blood from heparinized access line, lock or indwelling heparin lock.

When sampling through indwelling blood lines, flush access port thoroughly following institutional procedures.

1. Obtain 0.2 mL of blood with the syringe.
2. Immediately dispense one drop of blood into the sample well of the test cuvette; filling from the bottom of the well up. This may be done either with or without a transfer needle. A sufficient quantity of blood must be added directly to the center sample well to fill it flush to the top. Should a large drop of blood extend above the center sample well, push it over into the outer sample well.
3. Depress the **START** key.

PERFORMANCE CHARACTERISTICS

Normal Range

The HEMOCHRON Jr. APTT was evaluated using fresh whole blood from normal volunteer donors (n=30).

	Mean (secs)	SD (secs)	Range (mean ± 2SD)
Plasma equivalent	31	3.9	23.2-38.7
Whole blood	75.4	6.3	62.8-88

NOTE: *Plasma equivalent APTT values less than 20 seconds are not routinely available and should be reported as "less than 20 seconds".*

NOTE: *Each institution should establish its own normal range and target range of therapeutic anticoagulation based on its patient population.*

NOTE: *HEMOCHRON Jr. plasma equivalent APTT values less than 10 seconds will be reported as "Out of range - Lo" and may indicate excessive blood coagulation activation, possibly due to specimen contamination upon collection or processing, and should be repeated.*

Test results are displayed in plasma equivalent values. The whole blood APTT clotting time may be obtained by depressing and holding the **START** key.

Plasma equivalent APTT values are calculated specifically for a given APTT reagent and instrument system. Different APTT systems demonstrate diverse normal ranges and heparin sensitivities. The plasma equivalent APTT values programmed into the HEMOCHRON Jr. Signature and the HEMOCHRON Jr. II are approximate plasma equivalents for use in the clinical setting. A more relevant conversion may be obtained by each institution through performance of a whole blood to plasma APTT comparative study using a protocol similar to that described under "CORRELATION OF THE HEMOCHRON Jr. APTT AND LABORATORY PLASMA APTT".

Heparin Sensitivity (Fig. 1)

An *in vitro* heparin sensitivity curve was generated by adding increasing amounts of heparin to aliquots of normal donor blood. Triplicate HEMOCHRON Jr. APTT assays were performed at each heparin level.

NOTE: This graph serves as an example only. Each patient demonstrates a unique dose response curve.

Determination of the Whole Blood to Plasma Equivalent Conversion Equation (Fig. 2)

Fresh blood samples (n=94) from pre and post-procedure patients of cardiac catheterization and angioplasty were analyzed with the HEMOCHRON Jr. APTT at the bedside. An aliquot of each specimen was mixed with citrate and centrifuged, and the plasma frozen. A plasma APTT test was performed on each plasma sample at a reference laboratory using a single lot of reagent (Dade Actin FSL APTT Reagent [Baxter Healthcare, Miami, FL] and the Electra 900 analyzer [IL, Lexington, MA]). The HEMOCHRON Jr. APTT whole blood results were highly correlated with the reference laboratory APTT (r=0.92) as shown in Fig. 2.

Correlation of the HEMOCHRON Jr. APTT and Laboratory Plasma APTT (Fig. 3)

Fresh blood samples (n=48) from pre and post-procedure patients of cardiac catheterization and angioplasty were analyzed with the HEMOCHRON Jr. APTT at the bedside. An aliquot of each specimen was mixed with citrate and centrifuged, and a plasma APTT test was performed on each plasma sample in the laboratory using standard hospital reagents.

The HEMOCHRON Jr. APTT plasma equivalent values were highly correlated with the laboratory plasma APTT values (r=0.92) as shown in Fig. 3.

The HEMOCHRON Jr. Signature and the HEMOCHRON Jr. II automatically convert whole blood APTT test results to plasma equivalent APTT test values in seconds. Plasma APTT values above 150 seconds are not routinely available using a photo-optical instrument due to limitations of the plasma assay. Since heparin sensitivity is specific for different APTT reagents and test systems, this upper limit of recordable values will vary among different APTT test systems.

In addition to APTT reagent sensitivity, the method of clot detection affects upper limits of recordable endpoints. Plasma based photo-optical analyzers will yield recordable endpoints over the range of 100-150 seconds depending upon the reagent employed and the quality of the blood specimen. A mechanical endpoint plasma analyzer will yield recordable endpoints up to 200 seconds or greater, depending upon the reagent used.

Plasma APTT Conversion Chart (Fig. 4)

Based on the regression analysis of the HEMOCHRON Jr. whole blood APTT and the reference laboratory plasma APTT, a conversion table has been programmed into the HEMOCHRON Jr. Signature and the HEMOCHRON Jr. II. The plasma APTT conversion is provided so that interpretation of patient status may be made using a value familiar to the clinician. The programmed plasma conversion chart is based on actual regression data (for plasma APTTs of 150 seconds or less) with a theoretical extension of that data to the upper limits of the clinical range for which the test is intended. The upper limits of linearity range from 200 to 400 plasma equivalent seconds, depending upon the clotting characteristics of the patient's blood specimen and the sensitivity of the plasma assay.

NOTE: *The plasma APTT shown is specific for a plasma APTT obtained using a specific APTT reagent and an automated photo-optical coagulation instrument. Due to the variability of reagents and test instruments, different assay systems will produce different conversions. For optimal results, institutions should establish their own performance range and conversion chart for the specific reagent employed in the clinical laboratory, using a protocol similar to that found in the above correlation study.*

PRECISION

In-house Precision Studies

The precision of the HEMOCHRON Jr. APTT was evaluated by performing multiple APTT tests using a control preparation at two levels. Two lots of APTT test cuvettes were included in this study. Assays were performed on three separate days using well maintained instruments with the following results:

Cuvette Lot 1

	Normal				Abnormal			
	N	Mean (sec)	SD (sec)	CV (%)	N	Mean (sec)	SD (sec)	CV (%)
Day 1	3	100.7	1.5	1.5	3	210.3	15.0	7.1
Day 2	3	102.0	3.0	2.9	3	198.0	2.0	1.0
Day 3	3	98.7	2.1	2.1	3	204.3	6.1	3.0
Total	9	100.4	2.5	2.4	9	204.2	9.8	4.8

Cuvette Lot 2

	Normal				Abnormal			
	N	Mean (sec)	SD (sec)	CV (%)	N	Mean (sec)	SD (sec)	CV (%)
Day 1	3	100.0	3.6	3.6	3	200.3	2.9	1.4
Day 2	3	98.0	1.0	1.0	3	199.7	5.1	2.6
Day 3	3	99.7	0.6	0.6	3	214.3	8.5	4.0
Total	9	99.2	2.1	2.1	9	204.8	8.8	4.3

Combined Cuvette Lots 1 and 2

	Normal				Abnormal			
	N	Mean (sec)	SD (sec)	CV (%)	N	Mean (sec)	SD (sec)	CV (%)
Day 1	6	100.3	2.5	2.5	6	205.3	11.1	5.4
Day 2	6	100.0	3.0	3.0	6	198.8	3.6	1.8
Day 3	6	99.2	1.5	1.5	6	209.3	8.6	4.1
Total	18	99.8	2.3	2.3	18	204.5	9.0	4.4

LIMITATIONS

The HEMOCHRON Jr. APTT is not intended for use with heparin levels above 1.5 units/ml. Performance characteristics have not been determined for heparin levels above 1.5 units/ml. Test results under 20 plasma equivalent seconds and over 400 plasma equivalent seconds are not reported on the HEMOCHRON Jr. Signature or the HEMOCHRON Jr. II. Instead, either "Out of range - Lo" or "Out of range - Hi" is displayed. Samples with a hematocrit less than 20% or greater than 55% are not recommended due to an optical density outside of the level of detection of the instruments.

The HEMOCHRON Jr. APTT is affected by poor technique including blood collection and the transfer of blood to the sample well. The quality of the blood specimen may be affected by:

– Foaming or hemolysis of the sample
– Clotted or partially clotted blood
– Unsuspected anticoagulation
– Lupus anticoagulant

As with all diagnostic tests, HEMOCHRON Jr. test results should be scrutinized in light of a specific patient's condition and anticoagulant therapy. Any results exhibiting inconsistency with the patient's clinical status should be repeated or supplemented with additional test data.

HEMOCHRON Jr. plasma equivalent results greater than 400 seconds should be considered beyond clinical significance and the test should be repeated or reported as >400 seconds.

OPERATING PRECAUTIONS

Do NOT use cuvettes that are past their marked expiration date, or which have been improperly stored.

Do NOT force a cuvette into the instrument. If resistance to insertion is encountered, gently remove the cuvette and examine the cuvette slot. Remove any obstruction before attempting further use of the instrument (see Service and Maintenance in the appropriate HEMOCHRON Jr. Operator's Manual).

QUALITY CONTROL

Routine quality control testing and tracking should be part of a comprehensive quality assurance program. HEMOCHRON Jr. quality control products are available to make routine QC convenient and affordable.

Daily QC of the Instrument

The HEMOCHRON Jr. should be quality controlled at two levels of control once every 8 hours of operation. To assist in accomplishing daily QC, Electronic Quality Control is available and can provide a two-level check of the instrument. Refer to the Operator's Manual for the specific HEMOCHRON Instrument in use for detailed instructions.

QC of the HEMOCHRON Jr. Test Cuvettes

Each ***lot*** of HEMOCHRON Jr. APTT cuvettes should be validated for performance at two liquid quality control levels:

• When a new shipment is received, AND
• Once per 30 calendar days thereafter

Following successful performance validation as above, the cuvettes will not require any further liquid quality control unless a shift in clinical results is suspected.

Performance validation can be accomplished using the appropriate HEMOCHRON Jr. Microcoagulation Whole Blood Quality Control products. Acceptable performance ranges and how to apply them for the APTT test cuvettes are included with each quality control product kit.

HEMOCHRON® Jr.

Whole Blood Microcoagulation Systems

Activated Partial Thromboplastin Time
Aktivierte partielle Thromboplastinzeit (APTT)

Packungsbeilage

Deutsch

Zur *In-vitro*-Diagnose

VERWENDUNGSZWECK

Der HEMOCHRON® Jr. APTT-Test ist ein modularer Mikrokoagulationstest für eine quantitative, einstufige APTT. Der APTT-Test wird verwendet, um eine niedermolekulare Heparin-Antikoagulation zu ermitteln (bis zu 1,5 Einheiten/ml Blut).

Der APTT-Test wird mit Hilfe des HEMOCHRON Jr. Signature oder HEMOCHRON Jr. II Gerätes unter Verwendung einer neuen Blutprobe ausgeführt. Jedes Gerät ist tragbar und kann am Krankenbett verwendet werden. Das Gerät ist nicht für den Privatgebrauch gedacht.

HINWEIS: *Dieser HEMOCHRON Jr. APTT-Test kann nicht mit früheren Versionen des HEMOCHRON Jr. verwendet werden.*

ZUSAMMENFASSUNG UND ERKLÄRUNG

Der HEMOCHRON Jr. APTT-Test misst den intrinsischen Koagulationsablauf, der alle Koagulationsfaktoren außer VII und III (Gewebefaktor) umfasst. Der APTT-Test ist eine Abwandlung des PTT-Test (PTT = Partielle Thromboplastinzeit). Der PTT-Test verwendet ein Phospholipid, das entweder aus Hirn- oder Lungengewebe stammt, um die Rolle der Blutplättchen im Koagulationsablauf zu imitieren. Der APTT-Test enthält eine kontaktaktivierende Substanz, um die Aktivierung des Faktors XII zu standardisieren, wodurch eine präzisere Untersuchung gewährleistet werden kann. Zusätzliche Kontaktaktivatoren, z. B. Glas, Kaolin oder Kieselgur, unterscheiden den APTT- vom PTT-Test.

Die mit den HEMOCHRON Jr. Geräten ermittelten Vollblut-Werte werden in Plasma-äquivalente APTT-Werte umgerechnet, die aufgrund des vertrauten Formats als Grundlage für eine Diagnose dienen können.[1]

Die Assay-Auflösung wird durch einen Ersatz für den Thrombozytenfaktor 3 und einen Kaolinaktivator erzielt und erfordert keine Inkubation.

BETRIEBSPRINZIP

Die HEMOCHRON Jr. Geräte verwenden einen mechanischen Gerinnungsmechanismus, bei dem die Gerinnung in der Einmal-APTT-Küvette stattfindet. Nach der Vollblut-Einführung misst das Gerät exakt 15 Mikroliter Blut und verschiebt es automatisch in den Testkanal innerhalb der APTT-Küvette. Die verbleibende Blutprobe wird nicht mehr benötigt und automatisch in den Entsorgungskanal der Küvette gezogen. Vermischung von Probe und Reagens sowie Testbeginn werden auch automatisch durchgeführt. Nach dem Mischen mit dem Reagens wird die Probe in dem Testkanal hin- und herbewegt, wobei die Gerinnselbildung überwacht wird.

Der Gerinnsel-Erkennungsmechanismus besteht aus einer Reihe optischer LED-Detektoren, die mit dem Testkanal der Küvette ausgerichtet sind. Die Geschwindigkeit der Blutprobe zwischen den Detektoren wird gemessen. Sobald die Gerinnung erfolgt, wird der Blutfluss gebremst und verlangsamt sich. Das Gerät registriert das Gerinnsel, wenn sich das Blut unterhalb einer vorbestimmten Flussrate bewegt. Das Gerät gibt mathematisch aus den Vollblut-Ergebnissen umgerechnete Plasma-äquivalente Werte aus. Der Vollblut-APTT-Wert wird durch Gedrückthalten der **START**-Taste des Geräts angezeigt.

REAGENZIEN

Jede Packung mit APTT-Testküvetten enthält Folgendes:

– 45 Folienbeutel, die jeweils eine HEMOCHRON Jr. APTT-Testküvette und ein Trockenmittel enthalten

Die APTT-Testküvette ist eine in sich abgeschlossene Testkammer, die mit einer getrockneten Aufbereitung von Kaolin, Phospholipiden, Stabilisatoren und Puffern vorgefüllt ist. Jede Küvette befindet sich in einem separaten Beutel. Diese Beutel sind mit einem bestimmten Verfallsdatum versehen.

VORSICHT: *Alle benutzten Testküvetten sollten als potenziell infektiös betrachtet werden, mit Vorsicht gehandhabt werden und gemäß den üblichen medizinischen Entsorgungsrichtlinien entsorgt werden.*

LAGERUNG UND STABILITÄT

Die verpackten APTT-Küvetten sind gekühlt (2–8 °C) bis zu dem auf der Verpackung angegebenen Verfallsdatum haltbar. Ungeöffnete Küvetten können bei einer Raumtemperatur von 15–30 °C gelagert werden. Die APTT-Küvetten sollten niemals einer Temperatur von mehr als 37 °C ausgesetzt werden.

HINWEIS: *Bei raumtemperatur sind die Produkte 12 Wochen haltbar, aber niemals länger als bis zu dem auf der Verpackung angegebenen Verfallsdatum. Ein neues Verfallsdatum muss bei Lagerung bei Raumtemperatur angegeben werden. Dazu muss das neue Datum im Abschnitt Lagerinformationen unter „Performance Verified" (Leistung verifiziert) auf der Küvettenverpackung vermerkt werden. Der geöffnete Beutel ist gekühlt 5 Tage haltbar, sofern er vorschriftsmäßig geschlossen wird. Um eine optimale Haltbarkeit zu gewährleisten, sollte der Küvettenbeutel direkt vor der Verwendung geöffnet werden.*

BEDIENUNGSANWEISUNGEN

Vor Beginn der Verwendung sollte sich der Benutzer mit den detaillierten Anweisungen des Benutzerhandbuchs von HEMOCHRON Jr. Signature oder HEMOCHRON Jr. II vertraut machen.

Das Gerät wird bedient, indem eine Küvette in das Gerät eingeführt wird, um diese zu erwärmen, eine Vollblutprobe eingeführt und die **START**-Taste gedrückt wird. Messung der Probe, Mischung von Probe und Reagens, Testbeginn und Gerinnselerkennung erfolgen daraufhin automatisch.

Mitgeliefertes Material

– Vorgefüllte HEMOCHRON Jr. APTT-Testküvetten

Erforderliches, aber nicht bereitgestelltes Material

– nur HEMOCHRON Jr. Signature oder HEMOCHRON Jr. II

– 1-ml- oder 3-ml-Spritze mit Kanüle (23 oder 21 Gauge) (optional)

PROBENENTNAHME UND HANDHABUNG

Zur Entnahme von Blutproben sind die institutionellen Richtlinien sowie NCCLS (H21-A3, H47-A) zur Entnahme von Proben für Koagulationstests zu befolgen.

Keine frischen Vollblutproben unter Verwendung von Blutabnahmeröhrchen aus Glas entnehmen.

Keine Proben aus heparinisierten Zugangsleitungen, Heparin-Locks oder Dauer-Heparin-Locks entnehmen.

Bei der Entnahme von Proben aus Dauerblutkathetern den Zugangsport sorgfältig gemäß den institutionellen Vorgaben durchspülen.

1. Mit der Spritze 0,2 ml Blut aufziehen.
2. Sofort einen Tropfen Blut in den Probenschacht der Testküvette geben, dabei den Schacht von unten nach oben füllen. Dies kann sowohl mit als auch ohne Transferkanüle geschehen. In den mittleren Probenschacht muss soviel Blut gegeben werden, dass er bis oben gefüllt ist. Sollte sich über dem mittleren Schacht eine große Flüssigkeitswölbung bilden, diese in den äußeren Schacht hinüberdrücken.
3. Die **START**-Taste drücken.

LEISTUNGSMERKMALE

Normaler Messbereich

Der HEMOCHRON Jr. APTT-Test wurde unter Verwendung von Blutproben freiwilliger Blutspender (n=30) ausgewertet.

	Durchschnitt (Sek.)	SA (Sek.)	Messbereich (Durchschnitt ±2 SA)
Plasma-Äquivalent	31	3,9	23,2–38,7
Vollblut	75,4	6,3	62,8–88

HINWEIS: *Plasma-äquivalente APTT-Werte von weniger als 20 Sekunden sind routinemäßig nicht verfügbar und sollten als „weniger als 20 Sekunden" vermerkt werden.*

HINWEIS: *In jeder Einrichtung sollte basierend auf der Patientenpopulation ein einrichtungsspezifischer, normaler Messbereich und ein Zielbereich für die Antikoagulantientherapie festgelegt werden.*

HINWEIS: *HEMOCHRON Jr. Plasma-äquivalente APTT-Werte von weniger als 10 Sekunden werden als „Out of range – Lo" (außerhalb des Messbereichs – Niedrig) angegeben und können auf eine übermäßige Blutkoagulation hinweisen, die möglicherweise auf eine Probenkontaminierung während der Entnahme oder der Verarbeitung zurückzuführen ist. In diesem Fall muss der Test wiederholt werden.*

Die Testergebnisse werden als Plasma-äquivalente Werte angezeigt. Der Gerinnungszeit der Vollblut-APTT kann durch langes Drücken der **START**-Taste abgerufen werden.

Die Plasma-äquivalenten APTT-Werte werden speziell für ein gegebenes APTT-Reagens und Gerätesystem berechnet. Unterschiedliche APTT-Systeme weisen unterschiedliche Normalbereiche und Heparinempfindlichkeiten auf. Die im HEMOCHRON Jr. Signature und dem HEMOCHRON Jr. II vorprogrammierten Plasma-äquivalenten APTT-Werte sind ungefähre Plasma-äquivalente Werte für die klinische Verwendung. Eine relevantere Umrechnung kann durch eine Vollblut-zu-Plasma-APTT-Vergleichsstudie unter Verwendung des unter „KORRELATIONSWERTE DES HEMOCHRON JR. APTT-TEST UND DES PLASMA-APTT-TESTS DES REFERENZLABORS" beschriebenen Protokolls erzielt werden.

Heparinempfindlichkeit (Fig. 1)

Durch Zusetzen zunehmender Mengen von Heparin *in-vitro* zu Teilproben von normalen Spenderblut wurde eine Kurve der Heparinempfindlichkeit erstellt. Für jede Heparinkonzentration wurden dreifache HEMOCHRON Jr. APTT-Tests ausgeführt.

HINWEIS: Dieses Diagramm dient nur als Beispiel. Jede Kurve zeigt die eindeutige Patientenreaktion auf die Dosis.

Ermittlung der Umrechnungsformel für die Umrechnung der Vollblut- in Plasma-äquivalente Werte (Fig. 2)

Mit dem HEMOCHRON Jr. APTT-Test wurden frische Blutproben (n=94) am Krankenbett von Patienten analysiert, die einer Katheterisierung und Angioplastie unterzogen werden sollten oder wurden. Eine Teilprobe der Blutproben wurde mit Citrat gemischt und zentrifugiert, und das Plasma wurde anschließend eingefroren. Für jede Plasmaprobe wurde ein Plasma-APTT-Test in einem Referenzlabor unter Verwendung einer Einzelcharge Reagens ausgeführt (Dade Actin FSL APTT Reagent [Baxter Healthcare, Miami, FL] und der Electra 900-Analysator [IL, Lexington, MA]). Die Vollblut-Ergebnisse des HEMOCHRON Jr. APTT-Tests korrelierten stark mit den APTT-Ergebnissen (r=0,92) des Referenzlabors (siehe Fig. 2).

Korrelationswerte des HEMOCHRON Jr. APTT-Test und des Plasma-APTT-Tests des Referenzlabors (Fig. 3)

Mit dem HEMOCHRON Jr. APTT-Test wurden frische Blutproben (n=48) am Krankenbett von Patienten analysiert, die einer Katheterisierung und Angioplastie unterzogen werden sollten oder wurden. Eine Teilprobe der Blutproben wurde mit Citrat gemischt und zentrifugiert. Anschließend wurde unter Verwendung der standardmäßigen Laborreagenzien für jede Plasmaprobe ein APTT-Test durchgeführt.

Die Plasma-äquivalenten Werte des HEMOCHRON Jr. APTT-Tests korrelierten stark mit den APTT-Ergebnissen (r=0,92) des Referenzlabors (siehe Fig. 3).

Das HEMOCHRON Jr. Signature und das HEMOCHRON Jr. II rechnen Vollblut-APTT-Testergebnisse automatisch in Sekunden in Plasma-äquivalente APTT-Testergebnisse um. Plasma-APTT-Werte über 150 Sekunden sind unter Verwendung eines photo-optischen Geräts aufgrund von Beschränkungen des Plasma-Assays routinemäßig nicht verfügbar. Da die Heparinempfindlichkeit abhängig von den verwendeten APTT-Reagenzien und Testsystemen unterschiedlich ist, kann die Obergrenze der protokollierbaren Werte je nach APTT-Testsystem variieren.

Zusätzlich zur APTT-Reagensempfindlichkeit wirkt sich auch das Verfahren für die Erkennung der Gerinnselbildung auf die obere Grenze von protokollierbaren Endpunkten aus. Plasma-basierte photo-optische Analysegeräte zeichnen je nach verwendetem Reagens und Qualität der Blutprobe keine Endpunkte oberhalb des Bereichs von 100–150 Sekunden auf. Ein mechanisches Endpunkt-Plasma-Analysegerät zeichnet abhängig vom verwendeten Reagens bis zu 200 Sekunden oder mehr auf.

Plasma-APTT-Umwandlungstabelle (Fig. 4)

Basierend auf der Regressionsanalyse des HEMOCHRON Jr. Vollblut-APTT-Tests und den Ergebnissen des Referenzlabors wurde eine Umwandlungstabelle in das HEMOCHRON Jr. Signature und das HEMOCHRON Jr. II programmiert. Die Plasma-APTT-Umwandlung wird bereitgestellt, so dass der Patientenzustand mit Hilfe vertrauter Werte interpretiert werden kann. Die programmierte Plasma-Umwandlungstabelle basiert auf tatsächlichen Regressionsdaten (für Plasma-APTTs von höchstens 150 Sekunden), wobei diese Daten theoretisch auf die obere Grenze des Messbereichs erweitert werden können, für den der Test bestimmt ist. Die obere Linearitätsgrenzen reichen von 200 bis 400 Plasma-äquivalenten Sekunden, je nach Gerinnungsmerkmalen der Blutprobe und der Empfindlichkeit des Plasma-Assays.

HINWEIS: *Die dargestellte Plasma-APTT ist spezifisch für eine Plasma-APTT, die mit Hilfe eines spezifischen APTT-Reagens und einem automatisierten photo-optischen Koagulationsgerät ermittelt wurde. Aufgrund der unterschiedlichen Reagenzien und Testgeräte produzieren unterschiedliche Assay-Systeme auch unterschiedliche Umwandlungen. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollte jede Einrichtung ihren eigenen Leistungsbereich und eine entsprechende Umwandlungstabelle für die verwendeten Reagenzien erstellen, und dabei ein Protokoll verwenden, das dem in der o. g. Korrelationsstudie genannten Protokoll entspricht.*

PRÄZISION

Klinikinterne Präzisionsstudien

Die Präzision des HEMOCHRON Jr. APTT-Tests wurde ermittelt, indem mehrere APTT-Tests unter Verwendung einer zweistufigen Kontrollvorbereitung durchgeführt wurden. In dieser Studie wurden zwei Chargen APTT-Testküvetten verwendet. Die an drei unterschiedlichen Tagen mit sorgfältig gewarteten Geräten ausgeführten Assays wiesen folgende Ergebnisse auf:

Küvettencharge 1

	Normaler				Abnormaler			
	N	Durchschnitt (Sek.)	SA (Sek.)	VK (%)	N	Durchschnitt (Sek.)	SA (Sek.)	VK (%)
Tag 1	3	100,7	1,5	1,5	3	210,3	15,0	7,1
Tag 2	3	102,0	3,0	2,9	3	198,0	2,0	1,0
Tag 3	3	98,7	2,1	2,1	3	204,3	6,1	3,0
Gesamt	9	100,4	2,5	2,4	9	204,2	9,8	4,8

Küvettencharge 2

	Normaler				Abnormaler			
	N	Durchschnitt (Sek.)	SA (Sek.)	VK (%)	N	Durchschnitt (Sek.)	SA (Sek.)	VK (%)
Tag 1	3	100,0	3,6	3,6	3	200,3	2,9	1,4
Tag 2	3	98,0	1,0	1,0	3	199,7	5,1	2,6
Tag 3	3	99,7	0,6	0,6	3	214,3	8,5	4,0
Gesamt	9	99,2	2,1	2,1	9	204,8	8,8	4,3

Küvettencharge 1 und 2 kombiniert

	Normaler				Abnormaler			
	N	Durchschnitt (Sek.)	SA (Sek.)	VK (%)	N	Durchschnitt (Sek.)	SA (Sek.)	VK (%)
Tag 1	6	100,3	2,5	2,5	6	205,3	11,1	5,4
Tag 2	6	100,0	3,0	3,0	6	198,8	3,6	1,8
Tag 3	6	99,2	1,5	1,5	6	209,3	8,6	4,1
Gesamt	18	99,8	2,3	2,3	18	204,5	9,0	4,4

BESCHRÄNKUNGEN

Der HEMOCHRON Jr. APTT-Test kann nicht mit Heparinkonzentrationen über 1,5 Einheiten/ml verwendet werden. Für Heparinkonzentrationen über 1,5 Einheiten/ml wurden keine Leistungsmerkmale ermittelt. Testergebnisse unter 20 und über 400 Plasma-äquivalenten Sekunden werden auf dem HEMOCHRON Jr. Signature oder dem HEMOCHRON Jr. II nicht protokolliert. Es wird stattdessen „Out of range – Lo" (außerhalb des Messbereichs – Niedrig) oder „Out of range – Hi" (außerhalb des Messbereichs – Hoch) angezeigt. Proben mit einem Hämatokrit-Wert von weniger als 20 % oder mehr als 55 % werden aufgrund einer optischen Dichte außerhalb des Erkennungs-Levels des Geräts nicht empfohlen.

Eine mangelhafte Blutentnahmetechnik und das Übertragen des Bluts in den Probensammler kann die Ergebnisse des HEMOCHRON Jr. APTT-Tests beeinträchtigen. Die Qualität der Blutproben kann durch Folgendes beeinträchtigt werden:

– Schaumbildung oder Hämolyse der Probe
– teilweise oder vollständige Gerinnung des Bluts
– Nicht erwartete Antikoagulation
– Lupus-Antikoagulans

Die HEMOCHRON Jr. Testergebnisse sollten wie bei allen diagnostischen Tests hinsichtlich des Befindens und der Antikoagulantientherapie jedes Patienten beurteilt werden. Testergebnisse, die nicht mit dem klinischen Zustand des Patienten übereinstimmen, sollten wiederholt oder durch zusätzliche Testdaten ergänzt werden.

HEMOCHRON Jr. Plasma-äquivalente Ergebnisse von mehr als 400 Sekunden sollten als klinisch unerheblich betrachtet werden und der Test sollte wiederholt oder das Ergebnis von 400 Sekunden vermerkt werden.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER BEDIENUNG

Küvetten, die das angegebene Verfallsdatum überschritten haben oder nicht ordnungsgemäß gelagert wurden, dürfen **NICHT** mehr verwendet werden.

Die Küvette **NICHT** gewaltsam in das Gerät drücken. Sollte das Einführen Schwierigkeiten bereiten, die Küvette vorsichtig herausnehmen und den Schacht kontrollieren. Eventuelle Blockierungen vor einem weiteren Einsatz des Gerätes entfernen (siehe Kapitel „Service und Wartung" des entsprechenden HEMOCHRON Jr. Benutzerhandbuchs).

QUALITÄTSKONTROLLE (QK)

Routinemäßige Tests zur Qualitätskontrolle und -verfolgung sollten Bestandteil eines umfassenden Qualitätssicherheitsprogramms sein. HEMOCHRON Jr.-Qualitätskontroll-Produkte sind erhältlich und machen die routinemäßigen Kontrollen einfach und erschwinglich.

Tägliche QK der Geräte

Das HEMOCHRON Jr. sollte nach 8-stündiger Verwendung auf zwei Kontroll-Levels auf seine Qualität überprüft werden. Zur Unterstützung bei den täglichen Qualitätsprüfungen kann die Elektronische Qualitätskontrolle für eine zweistufige Prüfung des Geräts verwendet werden. Detaillierte Anweisungen zur Verwendung des jeweiligen HEMOCHRON-Geräts finden Sie im Benutzerhandbuch.

QK der HEMOCHRON Jr. Testküvetten

Jede ***Lieferung*** von HEMOCHRON Jr. APTT-Küvetten muss zur Leistungsvalidierung einer zweistufigen Flüssigkeits-Qualitätskontrolle unterzogen werden:

• Bei Erhalt einer neuen Lieferung, UND
• Nach Erhalt alle 30 Kalendertage

Nach der erfolgreichen Leistungsprüfung der Küvetten wird keine weitere Flüssigkeits-Qualitätskontrolle benötigt, es sei denn, es tritt eine Änderung der klinischen Ergebnisse auf.

Die Leistungsprüfung kann mit Hilfe der entsprechenden HEMOCHRON Jr. Mikrokoagulations-Vollblut-Qualitätskontrollprodukte geschehen. Akzeptable Leistungsbereiche und deren Anwendung auf die APTT-Testküvette werden mit jedem Qualitätskontrollprodukt geliefert.

HEMOCHRON® Jr.

Whole Blood Microcoagulation Systems

Activated Partial Thromboplastin Time
Tiempo parcial de tromboplastina activada (APTT)

Folleto

Español

Para uso diagnóstico *in vitro*

APLICACIÓN

El HEMOCHRON® Jr. APTT es una prueba de microcoagulación unitaria para uso en el diagnóstico in vitro para llevar a cabo un APTT de una etapa. La prueba del APTT se utiliza para la evaluación de la anticoagulación con bajas dosis de heparina (hasta 1,5 unidades/ml de sangre).

La prueba del APTT se lleva a cabo en los instrumentos HEMOCHRON Jr. Signature o HEMOCHRON Jr. II utilizando una muestra de sangre total fresca. C

HEMOCHRON® Jr.

Whole Blood Microcoagulation Systems

Activated Partial Thromboplastin Time
Tempo di tromboplastina parziale attivata (APTT)

Foglietto illustrativo

Italiano

Per uso diagnostico *in vitro*.

USO PREVISTO

HEMOCHRON® Jr. APTT è un test di microcoagulazione unificato, inteso per l'esecuzione di un test APTT quantitativo in passaggio singolo. Il test APTT trova impiego nella valutazione dell'anticoagulazione con eparina a basse dosi (fino a 1,5 unità/ml di sangue).

Il test APTT viene eseguito con gli strumenti HEMOCHRON Jr. Signature o con l'HEMOCHRON Jr. II, utilizzando un campione di sangue fresco intero Giacuno strumento è portatile e destinato ad essere usato nel luogo di ricovero. La strumentazione non è adatta all'uso domestico.

NOTA: *HEMOCHRON Jr. APTT non è stato studiato per l'uso con versioni precedenti di HEMOCHRON Jr.*

SOMMARIO E SPIEGAZIONE

HEMOCHRON Jr. APTT è un test per la misurazione della via intrinseca della coagulazione, che comprende tutti i fattori della coagulazione, eccetto il fattore VII e III (fattore tissutale). APTT è una variante modificata del tempo di tromboplastina parziale (PTT). PTT utilizza un fosfolipide derivato dal tessuto cerebrale o polmonare, per mimare il ruolo delle piastrine nel processo di coagulazione. APTT contiene una sostanza attivante per contatto, per la standardizzazione dell'attivazione del fattore XII, consentendo un'analisi più precisa e sensibile. L'aggiunta di attivatori per contatto, come vetro, caolino o farina fossile differenzia APTT da PTT.

I valori APTT da sangue intero ottenuti con gli strumenti HEMOCHRON Jr. vengono convertiti in valori APTT equivalenti a quelli plasmatici, probabilmente più familiari al medico, consentendo di utilizzare uno standard comune sulla base del quale prendere una decisione terapeutica.

La risoluzione dell'analisi viene ottenuta mediante l'uso di un fattore piastrinico 3 e di un attivatore al caolino e non richiede incubazione.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Gli strumenti HEMOCHRON Jr. utilizzano un meccanismo di coagulazione end-point meccanico in cui la formazione del coagulo avviene all'interno della cuvetta monouso APTT. Successivamente all'introduzione del campione di sangue intero, lo strumento misura con precisione 15 microlitri di sangue e li invia automaticamente nel canale di test della cuvetta APTT. La rimanenza del campione di sangue, non necessaria per il test, viene automaticamente inviata al canale di scarto della cuvetta. Anche la miscelazione del campione/reagente e l'avvio del test avvengono in modo automatico, senza necessità di intervento da parte dell'operatore. Dopo la miscelazione con il reagente, il campione viene mosso avanti e indietro all'interno del canale di test, sorvegliando la formazione del coagulo.

Il meccanismo di rilevazione del coagulo consiste in una serie di rilevatori ottici LED allineati con il canale di test della cuvetta. Viene misurata la velocità con cui il campione di sangue si muove fra i rilevatori. Quando ha inizio la formazione del coagulo, il flusso del sangue viene ostacolato ed il movimento rallentato. Lo strumento rileva che è stato raggiunto un endpoint della coagulazione nel momento in cui il movimento del sangue scende al di sotto del limite prestabilito. Lo strumento indica valori equivalenti a quelli plasmatici matematicamente convertiti dai risultati dell'analisi del sangue intero. Il valore APTT del sangue intero può essere visualizzato premendo e mantenendo premuto il tasto **START** dello strumento.

REAGENTI

Ogni confezione di test in cuvetta APTT contiene:

– 45 confezioni, ognuna delle quali contiene un test in cuvetta HEMOCHRON Jr. APTT ed un essiccante

Il test in cuvetta APTT è una camera di test completa, monouso, precaricata con un preparato secco di caolino, un fosfolipide, sali di calcio, stabilizzanti e tamponi. Ogni cuvetta è confezionata individualmente in un involucro. Sugli involucri delle cuvette è stampata la data di scadenza specifica del lotto.

ATTENZIONE: *tutte le cuvette utilizzate devono essere considerate potenzialmente infettive, pertanto vanno maneggiate con cura ed eliminate in conformità alle normative per l'eliminazione dei rifiuti medici.*

CONSERVAZIONE E STABILITÀ

Se conservate in frigorifero (2–8 °C) le cuvette APTT confezionate rimangono stabili fino alla data di scadenza indicata. Le cuvette confezionate, integre, possono essere conservate a temperatura ambiente (15–30 °C). Non esporre le cuvette APTT a temperature superiori a 37 °C.

NOTA: *le cuvette possono essere conservate a temperatura ambiente per max. 12 settimane, ma non devono essere utilizzate dopo la data di scadenza riportata. Occorre indicare la data di inizio della conservazione a temperatura ambiente, completando la sezione sulle informazioni relative alla conservazione della tabella "Performance Verified" (Performance controllata) apposta sul lato di ogni scatola di cuvette. La confezione aperta, con il lato aperto adeguatamente ripiegato è stabile per cinque giorni se conservata in frigorifero. Per una durata ottimale, si raccomanda di aprire l'involucro della cuvetta immediatamente prima dell'uso.*

ISTRUZIONI PER L'USO

Prima di effettuare qualsiasi analisi, l'utente dovrà fare riferimento al manuale utente di HEMOCHRON Jr. Signature o al manuale utente di HEMOCHRON Jr. II per le istruzioni dettagliate sull'utilizzo.

Inserire una cuvetta nello strumento, lasciare scaldare e introdurre il campione di sangue intero premendo il tasto **START**. La misurazione del campione, la miscelazione campione/reagente, l'avvio del test e il rilevamento del coagulo avverranno automaticamente.

Materiale fornito

– Test in cuvette precaricate HEMOCHRON Jr. APTT

Materiale necessario ma non fornito

– Esclusivamente HEMOCHRON Jr. Signature o HEMOCHRON Jr. II

– Siringhe in plastica da 1 mL o 3 mL, ago di misura 23 o 21 (opzione)

RACCOLTA E TRATTAMENTO DEL CAMPIONE

Per la raccolta del campione di sangue, seguire le direttive della struttura clinica e quelle NCCLS (H21-A3 e H47-A) sulla raccolta di campioni per il test di coagulazione.

Non prelevare campioni di sangue fresco utilizzando provette per la raccolta di sangue.

Non prelevare sangue attraverso la via di accesso eparinizzata, il tappo o il sistema impiantato.

Se il prelievo avviene attraverso aghi cannula impiantati, lavare accuratamente l'accesso seguendo le procedure utilizzate nella struttura clinica.

1. Prelevare 0,2 mL di sangue con la siringa.
2. Inserire immediatamente una goccia di sangue nel pozzetto di analisi della cuvetta, iniziando il riempimento dal fondo del pozzetto. Ciò può essere effettuato con o senza ago. Occorre aggiungere una quantità sufficiente di sangue direttamente al pozzetto centrale per riempirlo. Se una grande goccia di sangue dovesse espandersi oltre il pozzetto centrale, spingerla nel pozzetto esterno.
3. Premere il tasto **START**.

CARATTERISTICHE DI PERFORMANCE

Ambito normale

La valutazione di HEMOCHRON Jr. APTT è stata effettuata utilizzando sangue fresco, intero da donatore volontario normale (n=30).

	Media (secs)	DS (secs)	Ambito (media ± 2DS)
Equivalente plasmatico	31	3,9	23,2–38,7
Sangue intero	75,4	6,3	62,8–88

NOTA: *i valori APTT plasmatici equivalenti inferiori a 20 secondi non sono disponibili di routine e vengono indicati con "inferiore a 20 secondi".*

NOTA: *ogni struttura clinica deve stabilire il proprio ambito normale e target in relazione alla terapia anticoagulante, in base alla propria popolazione di pazienti.*

NOTA: *i valori HEMOCHRON Jr. APTT plasmatici equivalenti inferiori a 10 secondi saranno indicati come "Out of Range – Lo" (Fuori limite – Lo) e possono indicare eccessiva attività di coagulazione del sangue, eventualmente a causa della contaminazione del campione successiva al prelievo o al trattamento e devono essere ripetuti.*

Correlatie tussen de HEMOCHRON Jr. APTT en de plasma-APTT in het laboratorium (Fig. 3)

Verse bloedmonsters (n=48) van patiënten die een hartkatheterisatie en angioplastiek ondergingen werden vóór en na de procedure in de ziekenhuiskamer geanalyseerd met de HEMOCHRON Jr. APTT. Een aliquot van elk monster werd met citraat gemengd en gecentrifugeerd en op elk plasmamonster werd een plasma-APTT-test uitgevoerd in het laboratorium met behulp van standaard in ziekenhuizen gebruikte reagentia.

Er bestond een sterke correlatie tussen de met de HEMOCHRON Jr. APTT behaalde plasma-equivalente waarden en de in het laboratorium vastgestelde plasma-APTT-waarden (r=0,92); zie Fig. 3.

De HEMOCHRON Jr. Signature en de HEMOCHRON Jr. II converteren APTT-testresultaten voor volbloed automatisch naar plasma-equivalente APTT-testwaarden in seconden. Plasma-APTT-waarden van meer dan 150 seconden zijn niet altijd beschikbaar met een foto-optisch instrument vanwege de beperkingen van de plasma-assay. Aangezien de gevoeligheid voor heparine ervan afhangt welke APTT-reagentia en testsystemen worden gebruikt, varieert deze bovengrens van de weergegeven waarden met het gebruikte APTT-testsysteem.

Naast de gevoeligheid van de APTT voor het gebruikte reagens is ook de stollingdetectiemethode van invloed op de bovengrens van de weergegeven eindpunten. Afhankelijk van het gebruikte reagens en de kwaliteit van het bloedmonster kunnen plasma-gebaseerde foto-optische analysatoren eindpunten boven het bereik van 100-150 seconden weergeven. Een plasma-analysator met een mechanisch eindpunt kan eindpunten tot 200 seconden of meer weergeven, afhankelijk van het gebruikte reagens.

Conversietabel voor de plasma-APTT (Fig. 4)

Op basis van de regressie-analyse tussen de met de HEMOCHRON Jr. op volbloed uitgevoerde APTT en de door het referentielaboratorium op plasma uitgevoerde APTT is een conversietabel in de HEMOCHRON Jr. Signature en de HEMOCHRON Jr. II geprogrammeerd. De conversie van plasma naar APTT wordt verschaft zodat de clinicus de patiëntstatus kan interpreteren met behulp van een waarde waarmee hij/zij vertrouwd is. De geprogrammeerde plasma-conversietabel is gebaseerd op werkelijke regressiegegevens (voor plasma-APTT's van 150 seconden of minder); deze gegevens worden vervolgens theoretisch voortgezet tot aan de bovengrens van het klinische bereik waarop de test betrekking heeft. De bovenste lineariteitsgrenzen variëren van 200 tot 400 plasma-equivalente seconden, afhankelijk van de stollingskarakteristieken van het bloedmonster van de patiënt en de gevoeligheid van de plasma-assay.

NB: *De getoonde plasma-APTT is typerend voor een plasma-APTT die is verkregen met behulp van een specifiek APTT-reagens in een geautomatiseerd foto-optisch stollingssysteem. Vanwege de verschillende combinaties van reagentia en testinstrumenten varieert de verrichte conversie met het gebruikte assaysysteem. Voor optimale resultaten moeten instellingen hun eigen werkbereik en conversiediagram vaststellen voor het specifieke reagens dat in hun klinisch laboratorium wordt gebruikt; hierbij dient gebruik gemaakt te worden van een protocol dat lijkt op het protocol dat in het bovengenoemde correlatieonderzoek werd gebruikt.*

NAUWKEURIGHEID

In-bouse nauwkeurigheidsonderzoeken

De nauwkeurigheid van de HEMOCHRON Jr. APTT werd geëvalueerd aan de hand van meerdere APTT-testen, waarbij gebruik werd gemaakt van controlebloed op twee niveaus. Twee partijen APTT-testcuvettes maakten deel uit van dit onderzoek. De assays werden op drie afzonderlijke dagen met behulp van goed onderhouden instrumenten verricht, met de volgende resultaten:

Cuvettes van partij 1

		Normaal				Abnormaal		
	N	Gem. (sec)	SA (sec)	VC (%)	N	Gem. (sec)	SA (sec)	VC (%)
Dag 1	3	100,7	1,5	1,5	3	210,3	15,0	7,1
Dag 2	3	102,0	3,0	2,9	3	198,0	2,0	1,0
Dag 3	3	98,7	2,1	2,1	3	204,3	6,1	3,0
Totaal	9	100,4	2,5	2,4	9	204,2	9,8	4,8

Cuvettes van partij 2

		Normaal				Abnormaal		
	N	Gem. (sec)	SA (sec)	VC (%)	N	Gem. (sec)	SA (sec)	VC (%)
Dag 1	3	100,0	3,6	3,6	3	200,3	2,9	1,4
Dag 2	3	98,0	1,0	1,0	3	199,7	5,1	2,6
Dag 3	3	99,7	0,6	0,6	3	214,3	8,5	4,0
Totaal	9	99,2	2,1	2,1	9	204,8	8,8	4,3

Combinatie van cuvettes van partij 1 en 2

		Normaal				Abnormaal		
	N	Gem. (sec)	SA (sec)	VC (%)	N	Gem. (sec)	SA (sec)	VC (%)
Dag 1	6	100,3	2,5	2,5	6	205,3	11,1	5,4
Dag 2	6	100,0	3,0	3,0	6	198,8	3,6	1,8
Dag 3	6	99,2	1,5	1,5	6	209,3	8,6	4,1
Totaal	18	99,8	2,3	2,3	18	204,5	9,0	4,4

HEMOCHRON® Jr.

Whole Blood Microcoagulation Systems

Geactiveerde partiële tromboplastinetijd (APTT)

BIJSLUITER

Nederlands

Voor *in-vitro*-diagnose

BEDOELD GEBRUIK

De HEMOCHRON® Jr. APTT is een zelfstandige microcoagulatietest, die bedoeld is om gebruikt te worden voor het verrichten van een kwantitatieve APTT in één fase. De APTT-test wordt gebruikt voor de evaluatie van anticoagulatie met lage doses heparine (tot 1,5 eenheid/ml bloed).

De APTT-test wordt met het HEMOCHRON Jr. Signature- of HEMOCHRON Jr. II-instrument verricht op een vers volbloedmonster. De instrumenten zijn draagbaar en zijn bedoeld om in de ziekenhuiskamer gebruikt te worden. De instrumenten zijn niet bedoeld voor thuisgebruik.

NB: *Deze HEMOCHRON Jr. APTT dient niet gebruikt te worden met eerdere versies van de HEMOCHRON Jr.*

SAMENVATTING EN UITLEG

De HEMOCHRON Jr. APTT meet de intrinsieke stollingsroute, waarvan alle stollingsfactoren deel uitmaken, behalve factor VII en III (de weefselfactor). De APTT is een aangepaste versie van de Partial Thromboplastin Time (PTT). De PTT maakt gebruik van een fosfolipide die van oliwel hersen- of longweefsel afkomstig is om de rol te imiteren die door bloedplaatjes in het stollingsproces wordt gespeeld. De APTT bevat een bij contact activerende stof om de activering van factor XII te standaardiseren, wat resulteert in een preciezere en gevoeligere assay. De toevoeging van een contactactivator, zoals glas, kaolien of kiezelgoer, onderscheidt de APTT van de PTT.

APTT-waarden die bij volbloed met de HEMOCHRON Jr.-instrumenten zijn verkregen worden geconverteerd naar plasma-equivalente APTT-waarden, waarmee de clinicus mogelijk beter bekend is, wat resulteert in een algemene standaard op basis waarvan therapeutische beslissingen genomen kunnen worden.

De assay vindt plaats met behulp van een vervangmiddel voor factor 3 (bloedplaatjes) en kaolien als activator; hierbij is geen incubatiestap nodig.

BESCHRIJVING VAN DE WERKING

De HEMOCHRON Jr.-instrumenten maken gebruik van een mechanisch stolseleindpuntsysteem; de stolsevorming vindt plaats binnen de disposable APTT-cuvet. Na het nemen van het volbloedmonster meet het instrument precies 15 microliter bloed af, wat vervolgens automatisch in het testkanaal van de APTT-cuvet wordt verplaatst. De rest van het bloedmonster, die voor de test niet nodig is, wordt automatisch in het afvalkanaal van de cuvet gezogen. Het mengen van het monster met het reagens en de aanvang van de test vinden eveneens automatisch plaats, zonder interactie van de bediener. Na het mengen met het reagens wordt het monster in het testkanaal heen en weer bewogen en gecontroleerd op stolsevorming.

Het stollingdetectiesysteem bestaat uit een serie optische LED-detectoren, die op één lijn staan met het testkanaal van de cuvet. De snelheid waarmee het bloedmonster tussen de detectoren beweegt wordt gemeten. Wanneer de stolsevorming begint, wordt de stroom van het bloed belemmerd en daalt de snelheid van deze beweging. Het instrument herkent dat de stolling een eindpunt heeft bereikt wanneer de snelheid van de beweging tot beneden een vooraf vastgesteld minimumpunt daalt. Het instrument geeft cijfers voor volbloed weer, mathematisch geconverteerd naar een plasma-equivalente waarde. De gebruiker kan de APTT-waarde van het volbloed weergeven door de START-toets van het instrument in te drukken en ingedrukt te houden.

REAGENTIA

Elke doos APTT-testcuvettes bevat het volgende:

– 45 zakjes, elk met één HEMOCHRON Jr. APTT-testcuvet en één droogmiddel

De APTT-testcuvet is een zelfstandig, disposable testinstrument gevuld met een gedroogd preparaat van kaolien, fosfolipide, stabilisatoren en buffers. Elke cuvet is apart verpakt in een zakje. De zakjes waarin de cuvettes zijn verpakt zijn voorzien van een vervaldatum, die per partij varieert.

ATTENTIE: *Alle gebruikte testcuvettes moeten als mogelijk infectieus beschouwd en voorzichtig behandeld worden en afgevoerd worden overeenkomstig de standaardprocedures voor de verwerking van medisch afval.*

OPSLAG EN STABILITEIT

Als zij gekoeld worden bewaard (2 - 8° C), zijn de in folie zakjes verpakte APTT-cuvettes tot de aangegeven vervaldatum stabiel. Ongeopende, in zakjes verpakte cuvettes kunnen eventueel ook bij kamertemperatuur (15 - 30° C) worden bewaard. APTT-cuvettes mogen niet worden blootgesteld aan temperaturen boven 37° C.

NB: *Voor opslag bij kamertemperatuur mag de datum met maximaal 12 weken aangepast worden, maar de aangegeven vervaldatum mag nooit overschreden worden. De datum moet worden aangepast als de cuvettes bij kamertemperatuur worden opgeslagen; dit moet worden aangegeven in het gedeelte met opslaginformatie van de tabel 'Performance Verified' (Prestaties geverifieerd) op de zijkant van elke doos cuvettes. Het zakje blijft na opening gedurende vijf dagen stabiel, mits het naar behoren aan het open einde wordt opgevouwen en gehouden wordt bewaard. Om de levensduur te optimaliseren verdient het aanbeveling het zakje van de cuvet onmiddellijk vóór het gebruik te openen.*

BEDIENINGSAANWIJZINGEN

Alvorens een assay uit te voeren dient de gebruiker de Bedieningshandleiding van de HEMOCHRON Jr. Signature of de HEMOCHRON Jr. II te raadplegen voor gedetailleerde bedieningsaanwijzingen.

De bediening van het instrument gaat als volgt in zijn werk: breng een cuvet in het instrument aan, geef deze de tijd om op te warmen, breng een volbloedmonster aan en druk op de START-toets. De meting van het monster, het mengen van het monster met het reagens, de aanvang van de test en het waarnemen van de stolling vinden vervolgens automatisch plaats.

Bijgeleverd materiaal

– Gevulde HEMOCHRON Jr. APTT-testcuvettes

Benodigd (maar niet bijgeleverd) materiaal

– HEMOCHRON Jr. Signature of HEMOCHRON Jr. II

– plastic injectienaalden van 1 ml of 3 ml, naald nr. 23 of 21 (facultatief)

AFNAME EN HANTERING VAN MONSTERS

Bij het nemen van bloedmonsters dienen de richtlijnen van de instelling en het CLSI (H21-A, H47-A) voor het nemen van monsters voor stollingstesten opgevolgd te worden.

Bij het nemen van verse volbloedmonsters dienen geen glazen bloedbuizen gebruikt te worden.

Neem geen bloed af via een geheparineerde toegangslijn, lock of permanente heparinelock.

Wanneer het monster via permanente bloedlijnen wordt genomen, dient de toegangspoort grondig doorgespoeld te worden overeenkomstig de procedures van de instelling.

1. Neem 0,2 ml bloed af met de injectienaald.
2. Plaats onmiddellijk één druppel bloed in de monsteropening van de testcuvet; begin hierbij onder aan de opening. Dit kan met of zonder verloopnaald gedaan worden. Breng voldoende bloed direct in de middelste monsteropening aan om deze tot gelijk met de bovenkant te vullen. Mocht een grote druppel bloed boven de middelste monsteropening uitsteken, dan dient u deze naar de buitenste monsteropening te schuiven.
3. Druk op de **START**-toets.

PRESTATIE-EIGENSCHAPPEN

Normaal bereik

De HEMOCHRON Jr. APTT werd geëvalueerd aan de hand van vers volbloed van normale vrijwillige donors (n=30).

	Gem. (sec)	SA (sec)	Bereik (gem. ± 2SA)
Plasma-equivalent	31	3,9	23,2-38,7
Volbloed	75,4	6,3	62,8-88

NB: *Plasma-equivalente APTT-waarden van minder dan 20 seconden zijn niet altijd beschikbaar en boren als 'minder dan 20 seconden' te worden weergegeven.*

NB: *Elke instelling moet haar eigen normale bereik en streefbereik voor anticoagulantiatherapie vaststellen, dat op de eigen patiënten afgestemd is.*

NB: *Plasma-equivalente APTT-waarden van minder dan 10 seconden worden door de HEMOCHRON Jr. als "Out of range - Lo" weergegeven en duiden wellicht op overmatige activering van de bloedstolling, mogelijk ten gevolge van verontreiniging van het monster tijdens de afname of verwerking; deze testen moeten dus worden herhaald.*

De testresultaten worden weergegeven in plasma-equivalente waarden. De gebruiker kan de APTT-stoltijd van het volbloed weergeven door de START-toets in te drukken en ingedrukt te houden.

De berekening van plasma-equivalente APTT-waarden is specifiek op een bepaalde combinatie van APTT-reagens en instrument afgestemd. Het normale bereik en de gevoeligheid voor heparine variëren afhankelijk van het APTT-systeem dat wordt gebruikt. De plasma-equivalente APTT-waarden die in de HEMOCHRON Jr. Signature en de HEMOCHRON Jr. II zijn geprogrammeerd zijn benaderingen voor gebruik in de klinische omgeving. Elke instelling kan zelf een relevantere conversie verkrijgen door een vergelijkend onderzoek van de APTT uit te voeren op volbloed en plasma aan de hand van een protocol dat lijkt op het protocol dat wordt beschreven onder "CORRELATIE TUSSEN DE HEMOCHRON JR APTT EN DE PLASMA-APTT IN HET LABORATORIUM".

Gevoeligheid voor heparine (Fig. 1)

Er werd een in vitro-heparinegevoeligheidskromme gegenereerd door het toevoegen van toenemende hoeveelheden heparine aan aliquots normaal donorbloed. Op elk heparineniveau werden de HEMOCHRON Jr. APTT-assays in drievoud uitgevoerd.

NB: *Deze grafiek dient slechts als voorbeeld. Voor elke patiënt is de dosis-effect-relatiekromme uniek.*

Bepaling van de vergelijking voor de conversie van volbloed naar het plasma-equivalent (Fig. 2)

Verse bloedmonsters (n=94) van patiënten die een hartkatheterisatie en angioplastiek ondergingen werden vóór en na de procedure in de ziekenhuiskamer geanalyseerd met de HEMOCHRON Jr. APTT. Een aliquot van elk monster werd met citraat gemengd en gecentrifugeerd; vervolgens werd het plasma bevroren. Op elk plasmamonster werd bij een referentielaboratorium een plasma-APTT-test uitgevoerd; hierbij werd gebruik gemaakt van een uit een enkele partij afkomstig reagens (Dade Actin FSL APTT Reagent [Baxter Healthcare, Miami, FL] en de Electra 900-analysator [IL, Lexington, MA]). Er bestond een sterke correlatie tussen de met de HEMOCHRON Jr. APTT op volbloed behaalde resultaten en de in het referentielaboratorium vastgestelde APTT (r=0,92); zie Fig. 2.

BEPERKINGEN

De HEMOCHRON Jr. APTT is niet bedoeld voor gebruik met heparineniveaus boven 1,5 eenheid/ml. De prestatie-eigenschappen voor heparineniveaus boven 1,5 eenheid/ml zijn nog niet vastgesteld. Testresultaten van minder dan 20 plasma-equivalente seconden en meer dan 400 plasma-equivalente seconden worden niet weergegeven op de HEMOCHRON Jr. Signature of de HEMOCHRON Jr. II. In plaats daarvan wordt "Out of range - Lo" of "Out of range - Hi" weergegeven. Monsters met een hematocriet van minder dan 20% of meer dan 55% worden niet aanbevolen, omdat hun optische dichtheid het detectieniveau van de instrumenten te buiten gaat.

De HEMOCHRON Jr. APTT wordt beïnvloed door foutieve technieken (bijv. tijdens de bloedafname en het overbrengen van het bloed naar de monsteropening). De kwaliteit van het bloedmonster kan beïnvloed worden door het volgende:

– Schuimen of hemolyse van het monster
– Gestold of gedeeltelijk gestold bloed
– Anticoagulantia waarvan het medisch personeel zich niet bewust is
– Lupus anticoagulans

Zoals bij alle diagnostische testen het geval is, moeten de met de HEMOCHRON Jr. behaalde testresultaten in de context van de aandoening en de anticoagulantiatherapie van de individuele patiënt worden gezien. Alle testen die resultaten opleveren die inconsistent zijn met de klinische status van de patiënt moeten worden herhaald of worden aangevuld met verdere testgegevens.

Met de HEMOCHRON Jr. behaalde plasma-equivalente resultaten van meer dan 400 seconden moeten als niet klinisch significant worden beschouwd; deze testen moeten ofwel worden herhaald of worden weergegeven als ">400 seconden".

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET GEBRUIK

NIET DOEN: cuvettes gebruiken waarvan de aangegeven vervaldatum is verstreken of die niet naar behoren zijn opgeslagen.

NIET DOEN: een cuvet in het instrument forceren. Als u tijdens het inbrengen weerstand ervaart, dient u de cuvet voorzichtig te verwijderen en de cuvetsleuf te inspecteren. Verwijder alle obstructies alvorens te proberen het instrument verder te gebruiken (zie het gedeelte "Service and Maintenance" (Service en onderhoud) in de bedieningshandleiding van de betreffende HEMOCHRON Jr.).

KWALITEITSCONTROLE

In het kader van een uitgebreid kwaliteitsborgingsprogramma moeten routineuze kwaliteitscontroletesten worden uitgevoerd en moeten individuele producten worden bijgehouden. Er zijn HEMOCHRON Jr.-kwaliteitscontroleproducten verkrijgbaar, waarmee routineuze kwaliteitscontrole gemakkelijk en betaalbaar is.

Dagelijkse kwaliteitscontrole van het instrument

De HEMOCHRON Jr. moet eens per acht bedrijfsuren op twee controleniveaus een kwaliteitscontrole ondergaan. Om te helpen bij de dagelijkse kwaliteitscontrole is er de zgn. Electronic Quality Control verkrijgbaar, waarmee het instrument op twee niveaus gecontroleerd kan worden. Raadpleeg de bedieningshandleiding voor het specifieke gebruikte HEMOCHRON Instrument voor gedetailleerde instructies.

Kwaliteitscontrole van de HEMOCHRON Jr.-testcuvettes

Elke ***partij*** HEMOCHRON Jr. APTT cuvettes dient gevalideerd te worden voor prestatie op twee vloeistofkwaliteitscontroleniveaus:

• Na ontvangst van een nieuwe zending, EN
• Eén keer per 30 kalenderdagen daarna

Na een succesvolle prestatievalidatie als boven, hebben de cuvettes verder geen vloeistofkwaliteitscontrole nodig tenzij een achteruitgang in klinische resultaten wordt vermoed.

Prestatievalidatie kan worden bereikt met behulp van de juiste HEMOCHRON Jr. Microcoagulation Whole Blood Quality Control-producten. Elke set kwaliteitscontroleproducten bevat aanvaardbare prestatiebereiken en hoe deze toe te passen voor de APTT testcuvettes.

REFERENTIES

1. National Committee for Clinical Laboratory Standards. Collection, Transport, and Preparation of Blood Specimens for Coagulation Testing and Performance of Coagulation Assays; Approved Guideline. CLSI document H21-A.
2. National Committee for Clinical Laboratory Standards. One-Stage Prothrombin Time (PT) Test and Activated Partial Thromboplastin Time (APTT) Test; Approved Guideline. CLSI document H47-A.

HEMOCHRON® Jr.

Whole Blood Microcoagulation Systems

Activated Partial Thromboplastin Time
Tempo de Tromboplastina Parcial Activada (APTT)

Folheto Informativo

Português

Para Utilização em Diagnóstico *in vitro*

FIM A QUE SE DESTINA

O HEMOCHRON® Jr. APTT é um teste de microcoagulação unitário que se destina a ser utilizado para a realização de um APTT quantitativo, de uma só fase. O teste de APTT é utilizado para a avaliação de anticoagulação com uma dose baixa de heparina (um máximo de 1,5 unidades/ml de sangue).

O teste APTT é realizado no instrumento HEMOCHRON Jr. Signature ou HEMOCHRON Jr. II utilizando uma amostra de sangue total fresco. Cada instrumento é portátil e destina-se a ser utilizado à cabeceira da cama do doente. O instrumento não se destina a utilização doméstica.

NOTA: *Este HEMOCHRON Jr. APTT não pode ser utilizado com versões anteriores do HEMOCHRON Jr.*

RESUMO E EXPLICAÇÃO

O HEMOCHRON Jr. APTT é uma medida da cascata da coagulação intrínseca, que envolve todos os factores de coagulação excepto os Factores VII e III (factor de tecido). O APTT é uma modificação do Tempo de Tromboplastina Parcial (PTT). O PTT utiliza um fosfolípido derivado de tecido cerebral ou pulmonar para simular o papel das plaquetas no processo de coagulação. O APTT contém uma substância de activação de contacto para normalizar a activação do Factor XII, fornecendo assim um teste mais preciso e mais sensível. A junção de um activador de contacto, como o vidro, o caulino ou a terra de diatomáceas distingue o APTT do PTT.

Os valores de APTT obtidos no sangue total com os instrumentos HEMOCHRON Jr. são convertidos em valores APTT de plasma equivalentes que podem ser mais familiares para o médico fornecendo assim um padrão comum em relação ao qual podem ser tomadas decisões de terapêutica.

A resolução do teste é conseguida através da utilização de um substituto do factor 3 de plaquetas e de um activador de caulino e não necessita de um passo de incubação.

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

Os instrumentos de HEMOCHRON Jr. utilizam um mecanismo mecânico de coagulação de ponto final, no qual ocorre a formação do coágulo, dentro da cuvete APTT descartável. A seguir à introdução da amostra de sangue total, o instrumento mede precisamente 15 microlitros de sangue e transfere-os automaticamente para o canal de teste, dentro da cuvete APTT. A amostra de sangue restante, que não é necessária para a realização do teste, é automaticamente introduzida no canal de resíduos da cuvete. A homogeneização da amostra/reagente e o início do teste são também realizados automaticamente e não necessitam da intervenção do operador. Após a homogeneização com o reagente, a amostra é então agitada para a frente e para trás dentro do canal de teste e é monitorizada quanto à formação de coágulos.

O mecanismo de detecção de coágulos consiste numa série de detectores ópticos do tipo LED alinhados com o canal de teste da cuvete. É medida a velocidade a que a amostra de sangue se move entre os detectores. Quando começa a formação de coágulos, o fluxo sanguíneo é dificultado e o movimento abranda. O instrumento reconhece que o ponto final de um coágulo foi atingido quando o movimento diminui um nível inferior de a uma taxa predeterminada. O instrumento apresenta os valores equivalentes de plasma convertidos matematicamente a partir dos resultados de teste do sangue total. O valor de APTT do sangue total pode ser apresentado premindo e mantendo premida a tecla **START** do instrumento.

REAGENTES

Cada caixa de cuvetes de teste de APTT contém:

– 45 bolsas, cada uma contendo uma cuvete de teste HEMOCHRON Jr. APTT e um dessecante

A cuvete do teste de APTT é constituída por uma câmara de teste descartável autónoma, pré-cheia com uma preparação liofilizada de caulino, fosfolípido, estabilizadores e tampões. Cada cuvete é embalada individualmente numa bolsa. As bolsas com as cuvetes têm gravada a data de validade específica do lote.

PRECAUÇÃO: *Todas as cuvetes de teste usadas devem ser consideradas como potencialmente infecciosas e devem ser manuseadas com cuidado bem como devem ser eliminadas de acordo com a política de eliminação de resíduos hospitalares.*

ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE

Quando guardadas no frigorífico (2–8°C), as cuvetes de APTT embaladas permanecem estáveis até à data de validade indicada. O armazenamento à temperatura ambiente (15–30°C) é opcional para as cuvetes embaladas e seladas. As cuvetes de APTT não devem ser expostas a temperaturas superiores a 37°C.

NOTA: *Pode atribuir-se uma nova data de validade às cuvetes quando armazenadas à temperatura ambiente, um máximo de 12 semanas, não podendo ultrapassar a data de validade indicada. Esta nova data é necessária caso as armazene à temperatura ambiente, e deve ser indicada preenchendo a secção das informações de armazenamento da tabela "Performance Verified" (desempenho verificado), na face lateral de cada caixa de cuvetes. A bolsa aberta, adequadamente dobrada na extremidade aberta e guardada no frigorífico, é estável durante cinco dias. Para um tempo de armazenamento perfeito, é recomendado que a bolsa da cuvete seja aberta imediatamente antes de a utilização.*

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Antes de realizar um ensaio, o utilizador deve consultar o Manual do Operador adequado do HEMOCHRON Jr. Signature ou HEMOCHRON Jr. II para obter instruções de funcionamento detalhadas.

O instrumento é operado inserindo-se uma cuvete no instrumento, permitindo que aqueça, introduzindo uma amostra de sangue total e premindo a tecla **START**.

Material Fornecido

– Cuvetes de teste HEMOCHRON Jr. APTT pré-carregadas

Materiais Necessários mas Não Fornecidos

– HEMOCHRON Jr. Signature ou HEMOCHRON Jr. II somente

– Seringas plásticas de 1 mL ou 3 mL, agulhas calibre 23 ou 21 (opcional)

COLHEITA DA AMOSTRA E MANUSEAMENTO

Para obter uma amostra de sangue, siga as guidelines NCCLS (H21-A3, H47-A) e as institucionais, referentes à obtenção de amostras para a realização de testes de coagulação.

Não recolha amostras de sangue total fresco utilizando tubos de colheita de sangue de vidro.

Não obtenha sangue a partir de uma tubagem heparinizada nem a partir de um bloqueio interior de heparina.

Quando obtiver amostras através de linhas de sangue interiores, lave muito bem a via de acesso seguindo os procedimentos institucionais.

1. Obtenha 0,2 mL de sangue com a seringa.
2. Aplique imediatamente um gota de sangue na cavidade da amostra da cuvete de teste; enchendo desde o fundo da cavidade para cima. Isto pode ser realizado com ou sem uma agulha de transferência. Deve ser acrescentada uma quantidade de sangue suficiente directamente na cavidade da amostra central para a encher completamente até ao topo. Caso uma gota grande de sangue atinja o topo da cavidade da amostra central, empurre o sangue em excesso para dentro da cavidade da amostra exterior.
3. Prima a tecla **START**.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO

Intervalo Normal

O HEMOCHRON Jr. APTT foram avaliados utilizando sangue total, fresco, de dadores voluntários normais (n=30).

	Média (segs.)	DP (segs.)	Intervalo (média±2DP)
Equivalente ao plasma	31	3,9	23,2–38,7
Sangue total	75,4	6,3	62,8–88

NOTA: *Não estão disponíveis rotineiramente valores de APTT equivalentes ao plasma inferiores a 20 segundos, devendo ser apresentados no relatório como "inferiores a 20 segundos".*

NOTA: *Cada instituição deve estabelecer o seu próprio intervalo normal e o intervalo alvo da anticoagulação terapêutica com base na sua população de doentes.*

Os valores do HEMOCHRON Jr. APTT equivalentes de plasma foram altamente correlacionados com os valores APTT de plasma do laboratório (r=0,92) como indic