REF J103C

CE

Hemochron® Jr.

Whole Blood Microcoagulation Systems

Citrate Activated Partial Thromboplastin Time (APTT)

Package Insert

English

INTENDED USE

The Hemochron® Jr. Citrate APTT is a unitized microcoagulation test intended for use in performing a quantitative, one-stage APTT. The Citrate APTT test is used for evaluation of low dose heparin anticoagulation (up to 1.5 units/mL of blood, depending upon individual patient heparin sensitivity).

The Citrate APTT test is performed on the Hemochron Jr. Signature or Hemochron Jr. II instrument using a citrated venous whole blood sample. The instruments are portable and the use of citrated specimens allow testing to be conducted at the point of care or in a satellite or central laboratory. The instruments are not intended for home use.

NOTE: *This Hemochron Jr. Citrate APTT is not intended for use with earlier versions of the Hemochron Jr.*

For *in vitro* Diagnostic Use, For Professional Use, Rx Only

SUMMARY AND EXPLANATION

The Hemochron Jr. Citrate APTT is a measure of the intrinsic coagulation pathway, which involves all coagulation factors except Factors VII and III (tissue factor). The APTT is a modification of the Partial Thromboplastin Time (PTT). The PTT uses a phospholipid derived from either brain or lung tissue to mimic the role of platelets in the coagulation process. The APTT contains a contact activating substance to standardize the activation of Factor XII, thereby providing a more precise and sensitive assay. The addition of a contact activator such as glass, kaolin or diatomaceous earth distinguishes the APTT from the PTT.

Whole blood APTT values obtained with the Hemochron Jr. instruments are converted to plasma equivalent APTT values which may be more familiar to the clinician thus providing a common standard against which therapeutic decisions can be made.

Assay resolution is achieved through the use of a platelet factor 3 substitute and a kaolin activator, and does not require an incubation step.

PRINCIPLE OF OPERATION

The Hemochron Jr. instruments utilize a mechanical endpoint clotting mechanism in which clot formation occurs within the disposable Citrate APTT cuvette. Following whole blood sample introduction, the instrument precisely measures 15 microliters of blood and automatically moves it into the test channel within the Citrate APTT cuvette. The remainder of the blood sample, not needed for testing, is automatically drawn into the waste channel of the cuvette. Sample/reagent mixing and test initiation are also performed automatically, requiring no operator interaction. After mixing with the reagent, the sample is then moved back and forth within the test channel and monitored for clot formation.

The clot detection mechanism consists of a series of LED optical detectors aligned with the test channel of the cuvette. The speed at which the blood sample moves between the detectors is measured. As clot formation begins, blood flow is impeded and the movement slows. The instrument recognizes that a clot endpoint has been achieved when the movement decreases below a predetermined rate. The instrument reports whole blood numbers mathematically converted to a plasma equivalent value. The whole blood Citrate APTT value can be displayed by depressing and holding the instrument's **START** key.

REAGENTS

Each box of Citrate APTT test cuvettes contains:

– 45 pouches, each containing one Hemochron Jr. Citrate APTT test cuvette and one desiccant

The Citrate APTT test cuvette is a self contained disposable test chamber preloaded with a dried preparation of kaolin, phospholipid, calcium salts, stabilizers and buffers. Each cuvette is individually packaged in a pouch. Cuvette pouches are stamped with a lot specific expiration date.

CAUTION: *All used test cuvettes should be considered as potentially infectious, handled with care and disposed of using standard medical waste disposal policy.*

WARNINGS AND PRECAUTIONS

Do NOT use cuvettes that are past their marked expiration date, or which have been improperly stored.

Do NOT force a cuvette into the instrument. If resistance to insertion is encountered, gently remove the cuvette and examine the cuvette slot. Remove any obstruction before attempting further use of the instrument (see Service and Maintenance in the appropriate Hemochron Jr. Operator's Manual).

STORAGE AND STABILITY

When refrigerated (2 - 8°C), the foil pouched Citrate APTT cuvettes are stable until the marked expiration date. Room temperature storage (15 - 30°C) is optional for unopened, pouched cuvettes. Citrate APTT cuvettes should not be exposed to temperatures in excess of 37°C.

NOTE: *Room temperature re-dating is to a maximum of 12 weeks, but must never exceed the marked expiration date. Re-dating is necessary if stored at room temperature and should be indicated by completing the storage information section of the "Performance Verified" table on the side panel of each cuvette box. The opened pouch, properly folded at the open end, and refrigerated, is stable for five days. For optimal shelf life, it is recommended to open the cuvette pouch immediately before use.*

OPERATING INSTRUCTIONS

Before performing any assay, the user should refer to the Hemochron Jr. Signature or the Hemochron Jr. II Operator's Manual for detailed operating instructions.

The instrument is operated by inserting a cuvette into the instrument, allowing it to warm, introducing a whole blood sample and depressing the **START** key. Sample measurement, sample/reagent mixing, test initiation and clot detection will then proceed automatically.

Material Provided

– Preloaded Hemochron Jr. Citrate APTT test cuvettes

Material Required, but Not Provided

– Hemochron Jr. Signature or Hemochron Jr. II only

– Evacuated tube containing sodium citrate (3.8% or 3.2%) and blood collection needle

– 1 mL or 3 mL plastic syringes, 23 or 21 gauge needle for syringe sampling

SAMPLE COLLECTION AND HANDLING

To obtain blood specimen, follow institutional and NCCLS (H21-A, H47-A and H03-A) guidelines for obtaining samples for coagulation testing.

NOTE: *Blood samples for testing should be collected at least 5 minutes prior to testing to allow for adequate mixing of the sodium citrate with the sample. Optimal results are obtained when samples are tested within one hour, and specimens maintained at room temperature until tested.*

Do not obtain blood from heparinized access line, lock or indwelling heparin lock.

When sampling through indwelling blood lines, flush access port thoroughly following institutional procedures.

1. Collect a 5mL blood sample using either a syringe or an evacuated tube.
2. If a syringe collection system is used, attach a transfer needle to the syringe. Carefully puncture the stopper of an evacuated tube containing sodium citrate (3.8% or 3.2%) and allow blood to be drawn into tube until the flow stops. Mix gently. Discard syringe with transfer needle.
3. Before testing, invert the test tube at least four times to ensure complete mixing of sample.
4. Dispense one drop of citrated blood into the sample well of the test cuvette; filling from the bottom of the well up. This may be done either with or without a transfer needle. A sufficient quantity of blood must be added directly to the center sample well to fill it flush to the top. Should a large drop of blood extend above the center sample well, push it over into the outer sample well.
5. Depress the **START** key.

QUALITY CONTROL

Routine quality control testing and tracking should be part of a comprehensive quality assurance program. Hemochron Jr. quality control products are available to make routine QC convenient and affordable.

Daily QC of the Instrument

The Hemochron Jr. should be quality controlled at two levels of control once every 8 hours of operation. To assist in accomplishing daily QC, Electronic Quality Control is available and can provide a two-level check of the instrument. Refer to the Operator's Manual for the specific Hemochron Instrument in use for detailed instructions.

QC of the Hemochron Jr. Test Curettes

Each ***lot*** of Hemochron Jr. Citrate APTT cuvettes should be validated for performance at two liquid quality control levels:

• When a new shipment is received, AND
• Once per 30 calendar days thereafter

Following successful performance validation as above, the cuvettes will not require any further liquid quality control unless a shift in clinical results is suspected.

Performance validation can be accomplished using the appropriate Hemochron Jr. Microcoagulation Whole Blood Quality Control products. Acceptable performance ranges and how to apply them for the Citrate APTT test cuvettes are included with each quality control product kit.

LIMITATIONS

The Hemochron Jr. Citrate APTT is not intended for use with heparin levels above 1.5 units/mL. Performance characteristics have not been determined for heparin levels above 1.5 units/mL. Test results under 10 plasma equivalent seconds and over 400 plasma equivalent seconds are not reported on the Hemochron Jr. Signature or the Hemochron Jr. II. Instead, either "Out of range - Lo" or "Out of range - Hi" is displayed. Results between 10 and 20 plasma equivalent seconds are reported as <20. Samples with a hematocrit less than 20% or greater than 55% are not recommended due to an optical density outside of the level of detection of the instruments.

Hemochron Jr. plasma equivalent results greater than 400 seconds should be considered beyond clinical significance and the test should be repeated or reported as >400 seconds. The Hemochron Jr. Citrate APTT is affected by poor technique including blood collection and the transfer of blood to the sample well. The quality of the blood specimen may be affected by:

– Foaming or hemolysis of the sample
– Clotted or partially clotted blood
– Unsuspected anticoagulation
– Lupus anticoagulant

As with all diagnostic tests, Hemochron Jr. test results should be scrutinized in light of a specific patient's condition and anticoagulant therapy. Any results exhibiting inconsistency with the patient's clinical status should be repeated or supplemented with additional test data.

PERFORMANCE CHARACTERISTICS

Normal Range

The Hemochron Jr. Citrate APTT was evaluated using fresh citrated whole blood from normal volunteer donors.

Results obtained using citrate concentrations of 3.8% and 3.2% are presented in Table 1.

Table 1.

Normal	Citrate	3.2%	3.8%
Range	n	36	35
Plasma	Mean	29.6	31.6
Equivalent	SD	4.5	5.1
(seconds)	Range (±2 SD)	20.6-38.6	21.4-41.8
Whole	Mean	103	105
Blood	SD	5.3	5.9
(seconds)	Range (±2 SD)	92.4-113.6	93.2-116.8

NOTE: *Plasma equivalent APTT values less than 20 seconds are not routinely available and should be reported as "less than 20 seconds".*

NOTE: *Each institution should establish its own normal range and target range of therapeutic anticoagulation based on its patient population.*

NOTE: *Hemochron Jr. plasma equivalent APTT values less than 10 seconds will be reported as "Out of range - Lo" and may indicate excessive blood coagulation activation, possibly due to specimen contamination upon collection or processing, and should be repeated.*

Test results are displayed in plasma equivalent values. The whole blood APTT clotting time may be obtained by depressing and holding the **START** key.

Plasma equivalent APTT values are calculated specifically for a given APTT reagent and instrument system[a]. Different APTT systems demonstrate diverse normal ranges and heparin sensitivities. The plasma equivalent APTT values programmed into the Hemochron Jr. Signature and the Hemochron Jr. II are approximate plasma equivalents for use in the clinical setting. A more relevant conversion may be obtained by each institution through performance of a whole blood to plasma APTT comparative study using a protocol similar to that described under "CORRELATION OF THE Hemochron Jr. CITRATE APTT AND LABORATORY PLASMA APTT".

Heparin Sensitivity (Fig. 1)

An *in vitro* heparin sensitivity curve was generated by adding increasing amounts of heparin to aliquots of normal donor blood. Triplicate Hemochron Jr. Citrate APTT assays were performed at each heparin level.

NOTE: *This graph serves as an example only. Each patient demonstrates a unique dose response curve.*

Correlation of the Hemochron Jr. Citrate APTT and Laboratory Plasma APTT (Fig. 2)

Fresh citrated blood samples (n=210) from pre and post-procedure patients of cardiac catheterization and angioplasty were analyzed with the Hemochron Jr. Citrate APTT at the bedside. An aliquot of each specimen was mixed with citrate and centrifuged, and a plasma APTT test was performed on each plasma sample at a reference laboratory using a single lot of Dade Actin FSL[a] APTT reagent (Dade, Baxter Healthcare, Dade Division, Miami, FL) on an Electra 900 (IL, Lexington, MA) instrument.

The Hemochron Jr. Citrate APTT plasma equivalent values were highly correlated with the laboratory plasma Citrate APTT values (r=0.88) as shown in Fig. 2.

The Hemochron Jr. Signature and the Hemochron Jr. II automatically convert whole blood Citrate APTT test results to plasma equivalent APTT test values in seconds. Plasma APTT values above 180 seconds are not routinely available using a photo-optical instrument due to limitations of the plasma assay. Since heparin sensitivity is specific for different APTT reagents and test systems[a], this upper limit of recordable values will vary among different APTT test systems.

In addition to APTT reagent sensitivity, the method of clot detection affects upper limits of recordable endpoints. Plasma based photo-optical analyzers will yield recordable endpoints over the range of 100-180 seconds depending upon the reagent employed and the quality of the blood specimen. A mechanical endpoint plasma analyzer will yield recordable endpoints up to 200 seconds or greater, depending upon the reagent used.

Plasma APTT Conversion Chart (Fig. 3)

Based on the regression analysis of the Hemochron Jr. whole blood Citrate APTT and the reference laboratory plasma APTT, a conversion table has been programmed into the Hemochron Jr. Signature and the Hemochron Jr. II. The plasma APTT conversion is provided so that interpretation of patient status may be made using a value familiar to the clinician. The programmed plasma conversion chart is based on actual regression data (for plasma APTTs of 180 seconds or less) with a theoretical extension of that data to the upper limits of the clinical range for which the test is intended. The upper limits of linearity range from 200 to 400 plasma equivalent seconds, depending upon the clotting characteristics of the patient's blood specimen and the sensitivity of the plasma assay.

NOTE: *The plasma APTT shown is specific for a plasma APTT obtained using a specific APTT reagent and an automated photo-optical coagulation instrument. Due to the variability of reagents and test instruments, different assay systems will produce different conversions. For optimal results, institutions should establish their own performance range and conversion chart for the specific reagent employed in the clinical laboratory, using a protocol similar to that found in the above correlation study.*

PRECISION

In-house Precision Studies

The precision of the Hemochron Jr. Citrate APTT was evaluated by performing multiple Citrate APTT tests using the ITC Level I and Level II whole blood control products specific for the Citrate APTT cuvettes. Two lots of Citrate APTT test cuvettes were included in this study. Assays were performed on three separate days using well maintained instruments with the following results. Results are expressed in whole blood values.

Cuvette Lot 1

	Level 1				Level 2			
	N	Mean (sec)	SD (sec)	CV (%)	N	Mean (sec)	SD (sec)	CV (%)
Day 1	3	95	6.5	6.9	3	202	12.8	6.3
Day 2	3	92	2.1	2.3	3	191	7.4	3.9
Day 3	3	86	2.0	5.9	3	199	8.2	4.1
Total	9	91	5.9	6.4	9	197	9.8	5.0

Cuvette Lot 2

	Level 1				Level 2			
	N	Mean (sec)	SD (sec)	CV (%)	N	Mean (sec)	SD (sec)	CV (%)
Day 1	3	94	1.0	1.1	3	200	7.5	3.8
Day 2	3	99	5.9	5.9	3	210	3.5	1.7
Day 3	3	90	6.1	6.8	3	201	3.2	1.6
Total	9	95	5.8	6.1	9	204	6.6	3.2

Citrate Activated Partial Thromboplastin Time
Citrataktiveret partiel promboplastintid (APTT)

Indlægsseddel

Dansk / Danish

TILSIGTET BRUG

Hemochron® Jr. citrat APTT er en enhedsbestemt mikrokoagulationstest beregnet til brug ved udførelse af en kvantitativ, et-trins APTT-test. Citrat APTT-testen bruges til evaluering af lavdoseret heparin-antikoagulation (op til 1,5 enheder/ml blod, afhængigt af den enkelte patients følsomhed overfor heparin).

Citrat APTT-testen udføres på Hemochron Jr. Signature eller Hemochron Jr. II instrumentet ved brug af en citreret, venøs fuldblodsprøve. Instrumenterne er bærbare, og anvendelsen af citrerede prøver gør det muligt at udføre testene på behandlingssstedet eller i et satellit eller centralt laboratorium. Instrumenterne er ikke beregnet til hjemmebrug.

BEMÆRK: *Denne Hemochron Jr. citrat APTT-test er ikke beregnet til brug på tidligere modeller af Hemochron Jr.*

Til *in vitro* diagnostisk brug

OVERSIGT OG FORKLARING

Hemochron Jr. citrat APTT er en måling af den interne koagulationsbane, som involverer alle koagulationsfaktorer undtagen faktor VII og III (vævsfaktor). APTT er en modificering af den partielle tromboplastintid (PTT). PTT anvender en fosfolipid, som stammer fra enten hjerne- eller lungevæv, således at den efterligner thrombocytternes rolle i koagulationsprocessen. APTT indeholder et kontaktaktiverende stof til at standardisere aktiveringen af faktor XII, hvorved der fås en mere nøjagtig og sensitiv analyse. Tilsætningen af en kontaktaktivator, f.eks. glas, kaolin eller diatoméjord, skelner APTT fra PTT.

Fuldblod APTT-værdier, der opnås med Hemochron Jr. instrumenter, omregnes til plasmaækvivalente APTT-værdier, som klinikeren muligvis er mere fortrolig med. Der skabes således en fællesstandard, som kan danne baggrund for beslutninger om behandling.

Der opnås en analyseopløsning ved at anvende et thrombocyt faktor 3 erstatning og en kaoliinaktivator, og der er ikke behov for et inkubationstrin.

FUNKTIONSPRINCIP

Hemochron Jr. instrumenter benytter en mekanisk slutpunkts koagulationsmekanisme, hvor der opstår en koageldannelse inden i citrat APTT-kuvetten til engangsbrug. Efter indførsel af fuldblodsprøven, afmåler instrumentet nøjagtigt 15 mikroliter blod, og fører det automatisk ind i testrillen inden i citrat APTT-kuvetten. Resten af blodprøven, som ikke er nødvendig til testning, bliver automatisk suget ind i kuvettens affaldskanal. Blanding af prøve/reagens samt påbegyndelse af testen udføres ligeledes automatisk, og kræver ingen handling fra brugerens side. Efter prøven er blandet med reagenset, flyttes den frem og tilbage inden i testrillen, hvor den overvåges for koageldannelse.

Koageldetektionsmekanismen består af række optiske LED-detektorer, som flugter med kuvettens testrille. Hastigheden, som blodprøven bevæger sig med mellem detektorerne, måles. Efterhånden som koageldannelsen begynder, hæmmes blodstrømmen og bevægelsen bliver langsommere. Instrumentet registrerer, at der er opnået et koagelslutpunkt, når bevægelsen falder til under en fastlagt hastighed. Instrumentet viser fuldblodstal, der matematisk er omregnet til en plasma ækvivalent værdi. Fuldblod citrat APTT-værdien vises ved at trykke på og holde instrumentets **START**-tast nede.

REAGENSER

Hver kasse med citrat APTT-testkuvetter indeholder:

– 45 poser, som hver indeholder en Hemochron Jr. citrat APTT-testkuvette og et tørremiddel.

Citrat APTT-testkuvetten er et lukket testkammer til engangsbrug, hvor der på forhånd er tilsat et tørret præparat af kaolin, fosfolipid, calciumsalte, stabiliseringsmidler og puffere. Hver kuvette er individuelt indpakket i en pose. Kuvetteposerne er påtrykt en partispecifik udløbsdato.

FORSIGTIG: *Alle brugte testkuvetter skal anses for at være potentielt smittefarlige og skal håndteres forsigtigt, samt bortskaffes i henhold til standard bortskaffelsesregler for medicinsk affald.*

FORHOLDSREGLER VED BRUG

Kuvetter, der har overskredet den påtrykte udløbsdato eller som har været forkert opbevaret, må **IKKE** anvendes.

Kuvetter må **IKKE** forceres ind i instrumentet. Hvis der mødes modstand ved indføringen, skal kuvetten forsigtigt fjernes og kuvettelibningen skal undersøges. Alle hindringer skal fjernes, inden instrumentet anvendes igen (se Service og vedligeholdelse i den relevante Hemochron Jr. brugervejledning).

OPBEVARING OG STABILITET

Når de er anbragt i køleskab (2 – 8 °C), er folieposerne med citrat APTT-kuvetterne stabile indtil den påtrykte udløbsdato. Opbevaring ved stuetemperatur (15 – 30 °C) er valgfri for ulåbnede poser med kuvetter. Citrat APTT-kuvetter må ikke udsættes for temperaturer over 37 °C.

BEMÆRK: *Stuetemperatur omdatering gælder i maksimalt 12 uger, men må aldrig overstige den påtrykte udløbsdato. Det er nødvendigt at omdatere, hvis produktet opbevares ved stuetemperatur, og dette skal angives ved at udfylde afsnittet med opbevaringsinformation i skemaet "Præstation bekræftet" på kuvettekassernes sidepanel. Når en åben pose er korrekt foldet i den åbne ende og sat i køleskab, er den stabil i fem dage. For optimal holdbarbed anbefales det at åbne kuvetteposen lige før brug.*

BRUGSANVISNING

Brugeren skal, inden der udføres nogen analyse, læse brugervejledningen for Hemochron Jr. Signature eller Hemochron Jr. II for en detaljeret brugsanvisning.

Instrumentet betjenes ved at indsætte en kuvette i instrumentet, lade kuvetten varme op, tilsætte en fuldblodsprøve og trykke på **START**-tasten. Afmåling af prøve, blanding af prøve og reagens, påbegyndelse af testen samt koageldetektion foregår herefter automatisk.

Vedlagt Materiale

– Hemochron Jr. citrat APTT-testkuvetter med tilsat præparat

Nødvendigt materiale, som ikke er vedlagt

– Hemochron Jr. Signature eller Hemochron Jr. II
– Lufttomt rør med natriumcitrat (3,8% eller 3,2%) og kanyle til blodindsamling
– 1 ml eller 3 ml plastiksprøjte, 23 eller 21 gauge kanyle til prøveudtagning vha. sprøjteprøvetagning

PRØVEUDTAGNING OG HÅNDTERING

Institutions- og CLS- (H21-A, H47-A og H03-A) retningslinier for indsamling af blod til koagulationstestning skal følges.

BEMÆRK: *Blodprøver til testning bør indsamles mindst 5 minutter før testningen for at give nok tid til tilstrækkelig blanding af natriumcitratet med prøven. Optimale resultater opnås ved at teste prøverne indenfor en time, samt opbevare prøverne ved stuetemperatur, indtil de er testet.*

Blod må ikke indsamles fra en hepariniseret adgangsslange, lås eller indlagt heparinlås.

Når der indsamles blod gennem indlagte katetre, skal adgangsporten skylles omhyggeligt i henhold til institutionsprocedurer.

1. Indsaml en 5 ml blodprøve ved hjælp af en sprøjte eller et lufttomt rør.
2. Hvis der anvendes et indsamlingssystem med en sprøjte, skal der fastgøres en overførselskanyle til sprøjten. Punkter forsigtigt proppen på et lufttomt rør med natriumcitrat (3,8% eller 3,2%) , og lad blodet blive suget ind i røret, indtil strømningen stopper. Bland forsigtigt. Bortskaf sprøjten med overførselskanylen.
3. Før testning skal der vendes op og ned på reagensglasset mindst fire gange for at sikre, at prøven er fuldstændigt blandet.
4. Tilsæt en dråbe citreret blod i testkuvettens prøvebrønd; idet den fyldes fra bunden af brønden og op. Dette kan gøres enten med eller uden en overførselskanyle. Der skal tilsættes tilstrækkeligt med blod direkte i midterprøvebrønden til at fylde den helt op til randen. Hvis en stor dråbe blod breder sig over midterprøvebrønden, skubbes den over i den udvendige prøvebrønd.
5. Tryk på **START**-tasten.

KVALITETSKONTROL

Rutinemæssig kvalitetskontrol og sporing bør være en del af et omfattende kvalitetssikringsprogram. Der findes produkter til kvalitetskontrol af Hemochron Jr., som letter rutinemæssig kvalitetskontrol (QC) og er prismæssigt overkommelig.

Daglig kvalitetskontrol af instrumentet

Hemochron Jr. bør gennemgå kvalitetskontrol på to kontrolniveauer, hver gang det har været i drift i 8 timer. Til hjælp i udførelsen af den daglige kvalitetskontrol findes der elektroniske kvalitetskontrolsystemer, som kan kontrollere instrumentet på to niveauer. Se brugermanualen for det bestemte Hemochron-instrument, der anvendes, for detaljerede anvisninger.

Kvalitetskontrol af Hemochron Jr. testkuvetterne

Hvert ***parti*** Hemochron Jr. Citrate APTT kuvetter bør præstationsvalideres på to kvalitetskontrolniveauer for væsker:

• Når der modtages en ny forsendelse OG
• én gang hver 30 kalenderdage derefter

Hvis præstationsvalideringen viser tilfredsstillende resultater, er det ikke nødvendigt at foretage yderligere kvalitetskontrol af væsken, med mindre der opstår afvigelser i de kliniske resultater.

Præstationsvalidering kan foretages ved brug af de relevante Hemochron Jr. produkter til mikrokoagulationskvalitetskontrol fuldblod. Acceptable referenceområder og hvordan de anvendes på Citrate APTT testkuvetterne er vedlagt hvert produktkit til kvalitetskontrol.

BEGRÆNSNINGER

Hemochron Jr. citrat APTT er ikke beregnet til brug med heparinniveauer på over 1,5 enheder/ml. Præstationskarakteristika er ikke blevet fastlagt for heparinniveauer på over 1,5 enheder/ml. Test-resultater på under 10 plasma-ækvivalente sekunder og over 400 plasma-ækvivalente sekunder registreres ikke på Hemochron Jr. Signature eller Hemochron Jr. II. I stedet vises enten "Out of range - Lo" ("Uden for området - Lav") eller "Out of range - Hi" ("Uden for området - Høj"). Resultater på mellem 10 og 20 plasma-ækvivalente sekunder registreres som <20. Prøver med en hæmatokrit på mindre end 20% eller større end 55% frarådes pga. optisk tæthed udenfor instrumentets detektionsniveau.

Hemochron Jr. plasma-ækvivalente resultater, som er større end 400 sekunder, bør ikke anses for at være klinisk signifikante, og testen skal gentages eller registreres som >400 sekunder.

Hemochron Jr. citrat APTT påvirkes, hvis der anvendes en dårlig teknik ved blodindsamling og overførsel af blod til prøvebrønden. Blodprøvens kvalitet kan blive påvirket af:

– Skum eller hæmolyse i prøven
– Koaguleret eller delvist koaguleret blod
– Uventet antikoagulation
– Lupus antikoagulant

I lighed med alle diagnostiske tests bør Hemochron Jr. testresultater gennemgås grundigt i lyset af en specifik patients tilstand og antikoagulantbehandling. Ethvert resultat, der udviser uoverensstemmelse med patientens kliniske status, bør gentages eller suppleres med yderligere testdata.

PRÆSTATIONSKARAKTERISTIKA

Normalområde

Hemochron Jr. citrat APTT blev evalueret ved brug af friskt, citreret fuldblod fra raske, frivillige donorer.

Resultater, der blev opnået med citratkoncentrationer på 3,8% og 3,2%, vises i Tabel 1.

Tabel 1.

Normal-område	Citrat	3,2%	3,8%
	n	36	35
Plasma-ækvivalent (sekunder)	Middelværdi	29,6	31,6
	SD	4,5	5,1
	Område (±2 SD)	20,6-38,6	21,4-41,8
Fuldblod (sekunder)	Middelværdi	103	105
	SD	5,3	5,9
	Område (±2 SD)	92,4-113,6	93,2-116,8

BEMÆRK: *Plasmaækvivalente APTT- værdier på mindre end 20 sekunder foreligger almindeligvis ikke og bør angives som "mindre end 20 sekunder".*

BEMÆRK: *Institutioner bør hver især etablere deres eget normalområde og målområde for terapeutisk antikoagulation baseret på deres patientgruppe.*

BEMÆRK: *Hemochron Jr. plasma-ækvivalente APTT- værdier på mindre end 10 sekunder vil blive angivet som "Out of range – Lo" ("Uden for området - Lav"). Dette kan tyde på for kraftig aktivering af blodkoagulation, muligvis forårsaget af kontaminering af prøven under indsamling eller forarbejdning, og testen bør derfor gentages.*

Testresultater vises i plasma-ækvivalente værdier. Fuldblod citrat APTT-koagulationstiden opnås ved at trykke på START tasten og holde den nede.

Plasma-ækvivalente APTT-værdier udregnes specifikt for en nærmere angivet APTT- reagens og instrumentsystem. Forskellige APTT-systemer udviser forskellige normalområder og sensitivitet over for heparin. Plasma-ækvivalente APTT-værdier, der er indprogrammeret i Hemochron Jr. Signature og Hemochron Jr. II, er omtrentlige plasma-ækvivalente værdier til brug i klinisk sammenhæng. Hver institution kan opnå en mere relevant omregning ved at gennemføre en komparativ undersøgelse af fuldblod til plasma-APTT ved brug af en protokol, der ligner den, der beskrives i "KORRELATION MELLEM Hemochron Jr. CITRAT APTT OG LABORATORIEPLASMA APTT".

Heparin-sensitivitet (fig. 1)

Der blev genereret en *in vitro* heparin-sensitivitetskurve ved at tilsætte stigende mængder heparin til afmålinger af raskt donorblod. Der blev udført tre-dobbelte Hemochron Jr. citrat APTT-analyser ved hvert heparin-niveau.

BEMÆRK: *Denne kurve er kun et eksempel. Hver patient udviser en forskellig dosis-responsiv kurve.*

Korrelation mellem Hemochron Jr. citrat APTT og laboratorieplasma APT (fig. 2)

Friske, citrerede blodprøver (n=210) fra præ- og post-procedure hjertekateterisation og angioplastikpatienter blev analyseret med Hemochron Jr. citrat APTT ved sengeleje. En afmåling af hver prøve blev blandet med citrat og centrifugeret, og der blev udført en plasma APTT-test på hver plasmaprøve på et kontrollaboratorium ved hjælp af et enkelt parti Dade Actin FSL[a] APTT-reagens (Dade, Baxter Healthcare, Dade Division, Miami, FL) på et Electra 900 (IL, Lexington, MA) instrument.

Hemochron Jr. citrat APTT-plasma-ækvivalente værdier stemte i høj grad overens med laboratorieplasma citratværdier (r=0.88), se fig. 2.

Hemochron Jr. Signature og Hemochron Jr. II omregner automatisk fuldblod citrat APTT-testresultaterne til plasma-ækvivalente APTT-testværdier i løbet af sekunder. Plasma APTT-værdier på over 180 sekunder foreligger normalt ikke, når der anvendes et foto-optisk instrument pga. plasma-analysens begrænsninger. Da heparin-sensitivitet er specifik for forskellige APTT-reagenser og testsystemer[a], varierer denne øvre grænse for registrerbare værdier blandt de forskellige APTT-testsystemer.

Foruden APTT-reagenssensitivitet, påvirker koageldetektionsmetoden de øvre grænser for registrerbare slutpunkter. Plasmabaserede foto-optiske analysatorer giver registrerbare slutpunkter inden for et område på 100 – 180 sekunder, afhængigt af den anvendte reagens og kvaliteten af blodprøven. En mekanisk slutpunkts plasma-analysator giver registrerbare slutpunkter på op til 200 sekunder eller større, afhængigt af den anvendte reagens.

Vedlagt Materiale

– Hemochron Jr. Signature eller Hemochron Jr. II

Nødvendigt materiale, som ikke er vedlagt

– Lufttomt rør med natriumcitrat (3,8% eller 3,2%) og kanyle til blodindsamling
– 1 ml eller 3 ml plastiksprøjte, 23 eller 21 gauge kanyle til prøveudtagning vha. sprøjteprøvetagning

PRØVEUDTAGNING OG HÅNDTERING

Institutions- og CLS- (H21-A, H47-A og H03-A) retningslinier for indsamling af blod til koagulationstestning skal følges.

BEMÆRK: *Blodprøver til testning bør indsamles mindst 5 minutter før testningen for at give nok tid til tilstrækkelig blanding af natriumcitratet med prøven. Optimale resultater opnås ved at teste prøverne indenfor en time, samt opbevare prøverne ved stuetemperatur, indtil de er testet.*

Blod må ikke indsamles fra en hepariniseret adgangsslange, lås eller indlagt heparinlås.

Når der indsamles blod gennem indlagte katetre, skal adgangsporten skylles omhyggeligt i henhold til institutionsprocedurer.

1. Indsaml en 5 ml blodprøve ved hjælp af en sprøjte eller et lufttomt rør.
2. Hvis der anvendes et indsamlingssystem med en sprøjte, skal der fastgøres en overførselskanyle til sprøjten. Punkter forsigtigt proppen på et lufttomt rør med natriumcitrat (3,8% eller 3,2%) , og lad blodet blive suget ind i røret, indtil strømningen stopper. Bland forsigtigt. Bortskaf sprøjten med overførselskanylen.
3. Før testning skal der vendes op og ned på reagensglasset mindst fire gange for at sikre, at prøven er fuldstændigt blandet.
4. Tilsæt en dråbe citreret blod i testkuvettens prøvebrønd; idet den fyldes fra bunden af brønden og op. Dette kan gøres enten med eller uden en overførselskanyle. Der skal tilsættes tilstrækkeligt med blod direkte i midterprøvebrønden til at fylde den helt op til randen. Hvis en stor dråbe blod breder sig over midterprøvebrønden, skubbes den over i den udvendige prøvebrønd.
5. Tryk på **START**-tasten.

KVALITETSKONTROL

In het kader van een uitgebreid kwaliteitsborgingsprogramma moeten routineuze kwaliteitscontroletesten worden uitgevoerd en moeten individuele producten worden bijgehouden. Er zijn Hemochron Jr.-kwaliteitscontroleproducten verkrijgbaar, waarmee routineuze kwaliteitscontrole gemakkelijk en betaalbaar is.

Dagelijkse kwaliteitscontrole van het instrument

De Hemochron Jr. moet eens per acht bedrijfsuren op twee controleniveaus een kwaliteitscontrole ondergaan. Om te helpen bij de dagelijkse kwaliteitscontrole is er de zgn. Electronic Quality Control verkrijgbaar, waarmee het instrument op twee niveaus gecontroleerd kan worden. Raadpleeg de bedieningshandleiding voor het specifieke gebruikte Hemochron Instrument voor gedetailleerde instructies.

Kwaliteitscontrole van de Hemochron Jr.-testcuvettes

Elke ***partij*** Hemochron Jr. Citrate APTT cuvettes dient gevalideerd te worden voor prestatie op twee vloeistofkwaliteitscontroleniveaus:

• Na ontvangst van een nieuwe zending, EN
• Eén keer per 30 kalenderdagen daarna

Na een succesvolle prestatievalidatie als boven, hebben de cuvettes verder geen vloeistofkwaliteitscontrole nodig tenzij een achteruitgang in klinische resultaten wordt vermoed.

Prestatievalidatie kan worden bereikt met behulp van de juiste Hemochron Jr. Microcoagulation Whole Blood Quality Control-producten. Elke set kwaliteitscontroleproducten bevat aanvaardbare prestatiebereiken en hoe deze toe te passen voor de Citrate APTT testcuvettes.

BEPERKINGEN

De Hemochron Jr. Citrate APTT is niet bedoeld voor gebruik met heparineniveaus boven 1,5 eenheid/ml. De prestatie-eigenschappen voor heparineniveaus boven 1,5 eenheid/ml zijn nog niet vastgesteld. Testresultaten van minder dan 10 plasma-equivalente seconden en meer dan 400 plasma-equivalente seconden worden niet weergegeven op de Hemochron Jr. Signature of de Hemochron Jr. II. In plaats daarvan wordt "Out of range - Lo" of "Out of range - Hi" weergegeven. Resultaten tussen de 10 en 20 plasma-equivalente seconden worden weergegeven als "<20". Monsters met een hematocriet van minder dan 20% of meer dan 55% worden niet aanbevolen, omdat hun optische dichtheid het detectieniveau van de instrumenten te buiten gaat.

Citrate Activated Partial Thromboplastin Time (APTT)
Aktivoitu Osittainen Tromboplastiiniaika

Pakkauslehtinen

suomi / Finnish

KÄYTTÖTARKOITUS

Hemochron® Jr. Citrate APTT on erillispakattu mikrokoagulaatiomääritys, jota käytetään kvantitatiivisen, yksivaiheisen APTT-määrityksen suorittamiseen. Citrate APTT -määritystä käytetään pieniannoksisen hepariinin aiheuttaman antikoagulaation määrittämiseen (1,5 yks/mL, riippuen yksittäisen potilaan hepariiniherkkyydestä).

Citrate APTT suoritetaan Hemochron Jr. Signature tai Hemochron Jr. II -mittarilla käyttäen laskimosta otettua sitraattikokoverinäytettä. Mittari on siirrettävä, ja sitraattikokoverinäytteet mahdollistavat mittauksen hoitopisteessä tai sivu- tai keskuslaboratoriossa. Näitä laitteita ei ole tarkoitettu kotikäyttöön.

HUOMAUTUS: *Hemochron Jr. Citrate APTT ei ole tarkoitettu käytettäväksi Hemochron Jr. -mittarin aikaisempien versioiden kanssa.*

Diagnostiseen *in vitro* -käyttöön.

YHTEENVETO JA MENETELMÄN KUVAUS

Hemochron Jr. Citrate APTT mittaa sisäisen hyytmisjärjestelmän toimintaa, joka sisältää kaikki hyytymistekijät paitsi tekijöitä VII ja III (kudostekijä). APTT-testi on partiaalisen tromboplastiiniaika-määrityksen (PTT) muunnos PTT-määrityksessä käytetään aivo- tai keuhkokudosperäistä fosfolipidiä, joka simuloi verihiutaleiden vaikutusta hyytymistapahtumassa. APTT sisältää aktivoivaa kontaktiainetta, joka standardoi tekijä XII:n aktivoitumisen, minkä vuoksi määritys on tarkempi ja herkempi. Kontaktiaktivaattorilisä (esim. lasi, kaoliini tai piimaa) erottaa APTT-määrityksen PTT-määrityksestä.

K

Citrate Activated Partial Thromboplastin Time
Sitrat-aktivert partiell tromboplastintid (APTT)

Pakningsvedlegg

Norsk / Norwegian

TILTENKT BRUK

Hemochron™ Jr. sitrat-APTT (test av aktivert partiell tromboplastintid) er en helhetlig mikrokoagulasjonstest beregnet på å utføre en kvantitativ, enfaset APTT. Sitrat APTT-testen brukes til å evaluere koagulasjonshemming ved lave heparindoser (opptil 1,5 enheter/ml med blod, avhengig av hver enkelt pasients følsomhet overfor heparin).

Sitrat-APTT-testen utføres på Hemochron Jr. Signature- eller Hemochron Jr. II-instrumenter ved bruk av en sitrert venøs fullblodprøve. Instrumentene er bærbare, og bruken av sitrerte prøver gjør det mulig å gjennomføre testene påbehandlingsstedet (point-of-care) eller en underavdeling, eller et eksternt laboratorium. Instrumentene er ikke ment til hjemmebruk.

MERK: *Hemochron Jr. Sitrat-APTT-testen er ikke beregnet for bruk med tidligere versjoner av Hemochron Jr.*

For diagnostisk *in vitro*-bruk, for profesjonelt bruk, kun Rx

OPPSUMMERING OG FORKLARING

Hemochron Jr. Sitrat-APTT-testen er en måling av den indre koagulasjonskaskaden, som involverer alle andre koagulasjonsfaktorer enn faktor VII og III (vevsfaktor). APTT er en modifisering av "partiell tromboplastintid" (PTT). PTT bruker et fosfolipid fra hjerne- eller lungevev for å etterlikne rollen til blodplatene i koagulasjonsprosessen. APTT inneholder et kontaktaktiverende stoff, som standardiserer aktivering av faktor XII og dermed gir en mer presis og sensitiv analyse. Forskjellen på APPT og PTT, er at APTT bruker en kontaktaktivering, for eksempel med glass, kaolin eller kiselgur.

Fullblods APPT-verdier hentet med Hemochron Jr.-instrumentene omformes til plasmaekvivalente APPT-verdier. Legene kjenner ofte bedre til disse verdiene, noe som gir en felles standard som kan brukes til behandlingsavgjørelser.

Analysens oppløsning oppnås ved hjelp av en erstatning for blodplatefaktor 3 og en kaolinaktivator, og krever ikke et inkubasjonstrinn.

BRUKSPRINSIPP

Hemochron Jr.-instrumenter bruker en mekanisk endepunkt-koaguleremde mekanisme, der koagulasjon skjer inni en sitrat-APTT-kyvette for engangsbruk. Etter innføring av en fullblodprøve, gir instrumentet en presis måling av 15 mikroliter blod, som flyttes automatisk inn i testkanalen i sitrat-APTT-kyvetten. Resten av blodprøven, som ikke brukes til testing, trekkes automatisk inn i avfallskanalen i kyvetten. Blanding og testing av prøven/reagensen utføres også automatisk, uten behov for inngripen fra brukeren. Etter blanding med reagensen, flyttes prøven frem og tilbake innenfor testkanalen mens prøven overvåkes for koagulasjon.

Koagulasjonspåvisningsmekanismen består av en serie LED-optiske detektorer som er innstilt mot kyvettens bunnsentral. Det utføres en måling av hastigheten blodprøvene beveger seg gjennom detektorene. Når koagulasjonen starter, hindres blodstrømmingen slik at bevegelseshastigheten reduseres. Instrumentet gjenkjenner at et koagulasjonspunkt er oppnådd når bevegelseshastigheten går lavere enn en forhåndsdefinert strømningshastighet. Instrumentet rapporter hele blodnumre, som matematisk omdannes til en plasmaekvivalent verdi. Den fullblods sitrat-APTT-verdien kan vises ved å holde inne instrumentets **START**-tast.

REAGENSER

Hver boks med kyvetter for sitrat-APTT-testing inneholder:

- 45 poser som inneholder en Hemochron Jr.-kyvette for sitrat-APTT-testing og ett tørkemiddel

Kyvetten for sitrat-APTT-testing er et uavhengig testkammer forhåndslastet med et tørket preparat bestående av kaolin, fosfolipid, kalsiumsalter, stabilisatorer og buffermidler. Hver kyvette er pakket inn i en egen pose. Kyvetteposene er stemplet med en lotspesifikk utløpsdato.

FORSIKTIG: *Alle brukte testkyvetter bør betraktes som potensielt smittsomme. De må behandles med forsiktighet og kasseres i henhold til forskrifter for kassering av medisinsk avfall.*

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER

IKKE bruk kyvetter etter utløpsdatoen merket på posen, eller kyvetter som ikke har blitt lagret på riktig måte.

IKKE tving kyvetten inn i instrumentet. Hvis motstand oppstår når kyvetten skal settes inn, ta den forsiktig ut og undersøk kyvettesporet. Fjern enhver hindring før du bruker instrumentet videre (se Service og vedlikehold i brukerhåndboken for det aktuelle Hemochron Jr.-instrumentet).

OPPBEVARING OG STABILITET

Folieinnpakkede sitrat-APTT-kyvetter er stabile frem til den merkede utløpsdatoen når de oppbevares nedkjølt (2–8 °C). Ikke åpnede, innpakkede kyvetter kan oppbevares i romtemperatur (15–30 °C). Sitrat-APTT-kyvetter skal ikke utsettes for romtemperaturer over 37 °C.

MERK: *Omdatering ved romtemperaturer er maksimalt 12 uker, men den nye datoen må aldri overgå den merkede utløpsdatoen. Omdatering er nødvendig hvis kyvettene oppbevares i romtemperaturer, og skal indikeres ved å fylle ut opphevaringsinformasjon i tabellen Ytelse bekreftet på sidepanelet på hver kyvettepakke. En åpnet pakke er stabil i fem dager, forutsatt at den er brettet sammen i den åpne enden. For å oppnå optimal brukstid, anbefales det å åpne kyvetteposen umiddelbart før bruk.*

BRUKSANVISNING

Før prøven analyseres, må brukeren lese de detaljerte bruksanvisningene for Hemochron Jr. Signature eller Hemochron Jr. II.

Instrumentet brukes ved å sette inn en kyvette i instrumentet, la det varme seg opp, sette inn en fullblodsprøve og trykke på **START**-tasten. Måling av prøver, blanding av prøver/reagens, teststarting og påvisning av koagulasjon vil deretter fortsette automatisk.

Medfølgende materialer

– forhåndslastede Hemochron Jr.-kyvetter for sitrat-APTT-testing

Materialer som kreves, men ikke medfølger

– Hemochron Jr. Signature, eller kun Hemochron Jr. II
– vakuumrør med natriumsitrat (3,8 % eller 3,2 %) og blodprøvekanyle
– 1 ml eller 3 ml plastsprøyter, 23 G eller 21 G kanyle for prøvetaking med sprøyte

PRØVETAKING OG -HÅNDTERING

Når du skal ta en blodprøve, må du følge retningslinjene til institusjonen og NCCLS (H21-A, H47-A og H03-A) for prøvetaking og koagulasjonstesting.

MERK: *Blodprøvene som skal testes må være tatt minst 5 minutter før testing, slik at natriumsitratet og blodet får blandet seg godt. Man oppnår best resultater når prøvene har vært oppbevart i romtemperatur og testes innen én time.*

Du må ikke ta blod fra en heparinisert tilgangsslange, lås eller fast heparinlås.

Når prøver tas gjennom faste blodlinjer, må tilgangsporten spyles grundig i henhold til institusjonens prosedyrer.

1. Ta en 5 ml blodprøve, enten med en sprøyte eller et vakuumrør.
2. Hvis det brukes et sprøytesystem, må du feste en overføringskanyle til sprøyten. Punkter stopperen på et vakuumrør med natriumsitrat (3,8 % eller 3,2 %) og la blodet trekke inn i røret til strømningen stopper. Bland forsiktig. Kast sprøyten og overføringskanylen.
3. Før testing må testrøret vendes minst fire ganger for å sikre at prøven blandes godt.
4. Drypp én dråpe med sitrert blod i testkyvettens prøveglass; fyll prøveglasset helt. Dette kan gjøres enten med eller uten en overføringskanyle. Det må dryppes tilstrekkelig med blod rett i midten av prøveglasset for å fylle det helt opp med blod. Hvis en stor dråpe med blod går utenfor prøvebrønnen i midten, må du dytte den over til den ytre prøvebrønnen.
5. Trykk på **START**-tasten.

KVALITETSKONTROLL (QC)

Rutinemessig kvalitetskontroll og -sporing må være en del av et omfattende kvalitetssikringsprogram. Hemochron Jr. fører kvalitetskontrollprodukter som gjør rutinemessig kvalitetskontroll både praktisk og rimelig.

Daglig QC av instrumentet

Hemochron Jr. bør kvalitetskontrolleres på to nivåer for hver 8. time instrumentet brukes. Som hjelp til den daglige kvalitetskontrollen finnes det elektronisk kvalitetskontroll som kan kvalitetskontrollere instrumentet på to nivåer. Se bruksanvisningen for det aktuelle Hemochron-instrumentet for detaljerte instruksjoner.

Kvalitetskontroll av Hemochron Jr. testkyvetter

Det må kvalitetskontrolleres at hver ***lot*** med Hemochron Jr. sitrat-APTT-kyvetter fungerer på to nivåer for væskekvalitet:

- når en ny leveranse mottas OG
- deretter hver 30. kalenderdag

Etter at valideringen ovenfor er utført, er det ikke nødvendig å kvalitetskontrollere væsken ytterligere med mindre det er mistanke om avvik i de kliniske resultatene.

Valideringen kan utføres ved å bruke egnede Hemochron Jr.-produkter for kvalitetskontroll av mikrokoagulasjon i fullblod. Hvert produktsett for kvalitetskontroll inneholder informasjon om akseptable intervaller og hvordan man skal bruke dem for kyvetter for sitrat-APTT-testing.

BEGRENSNINGER

Hemochron Jr. Sitrat-APTT er ikke beregnet for bruk ved heparinnivåer over 1,5 enheter/ml. Det har enda ikke blitt fastslått ytelseskarakteristikker for heparinnivåer over 1,5 enheter/ml. Prøveresultater som er under 10 plasmaekvivalente sekunder og over 400 plasmaekvivalente sekunder rapporteres ikke på Hemochron Jr. Signature eller Hemochron Jr. II. I stedet vises "Out of range - Lo" eller "Out of range - Hi". Resultater mellom 10 og 20 plasmaekvivalente sekunder rapporteres som <20. Prøver med en hematokrit som er mindre enn 20 % eller større enn 55 % anbefales ikke, da dette gir en optisk tetthet utenfor instrumentenes deteksjonsnivå.

Plasmaekvivalente resultater som er større enn 400 sekunder på Hemochron Jr. bør vurderes som utenfor klinisk betydning. Testen må da repeteres, eller rapporteres som > 400 sekunder. Hemochron Jr. sitrat-APTT påvirkes av dårlig teknikk, inkludert blodprøvetaking og overføring av blod til prøvebrønnen. Kvaliteten på blodprøven kan bli påvirket av:

– skumming eller hemolyse i prøven
– klumpet eller delvis klumpet blod
– Uventet koagulasjonshemming
– lupusantikoagulant

Som med alle diagnostiske tester må testresultatene fra Hemochron Jr. undersøkes nærmere i forhold til en bestemt pasients tilstand og behandling med koagulasjonshemmende midler. Alle resultater som ikke stemmer overens med pasientens kliniske tilstand bør repeteres eller suppleres med data fra ytterligere tester.

YTELSESKARAKTERISTIKKER

Normalområde

Hemochron Jr. Sitrate-APTT ble evaluert ved hjelp av nylig sitrert fullblod fra normale, frivillige donorer.

Resultater oppnådd med sitratkonsentrasjoner på 3,8 % og 3,2 % presenteres i tabell 1.

Tabell 1.

Normal	Sitrat	3,2%	3,8%
Område	n	36	35
Plasma-	Snitt	29,6	31,6
ekvivalent	SD	4,5	5,1
(sekunder)	Område (±2 SD)	20,6-38,6	21,4–41,8
Full-	Snitt	103	105
blod	SD	5,3	5,9
(sekunder)	Område (±2 SD)	92,4-113,6	93,2-116,8

MERK: *Plasmaekvivalente APTT-verdier på under 20 sekunder er ikke rutinemessig tilgjengelige, og bør rapporteres som "mindre enn 20 sekunder".*

MERK: *Hver institusjon bør etablere sitt eget normalområde og målområde for terapeutisk koagulasjonsbehandling basert på institusjonens egen pasientpopulasjon.*

MERK: *Plasmaekvivalente APTT-verdier fra Hemochron Jr. som er mindre enn 10 sekunder vil bli rapportert som "Out of range - Lo", og kan indikere for høy aktivering av blodkoagulasjon, noe som trolig skyldes at prøven har blitt kontaminert ved prøvetaking eller behandling, og at testen bør gjentas.*

Testresultatene vises i plasmaekvivalente verdier. Fullblodets APTT-klumpingsverdi kan fastslås ved å trykke og holde inne **START**-tasten.

Plasmaekvivalente APTT-verdier kalkuleres spesifikt for en gitt APTT-reagens og instrumentsystem'. Ulike APTT-systemer demonstrerer diverse normalområder og heparinsensitiviteter. De plasmaekvivalente APTT-verdiene som er programmert inn i Hemochron Jr. Signature og Hemochron Jr. II, er omtrentlige plasmaekvivalenter beregnet for bruk i kliniske miljøer. En mer relevant konvertering kan oppnås på hver enkelt institusjon ved å utføre en sammenligningsstudie av fullblod- til plasma-APPT ved bruk av en protokoll tilsvarende protokollen som beskrivs i "KORRELASJON MELLOM APTT FRA Hemochron Jr. OG PLASMA-APTT FRA LABORATORIER". OG PLASMA-APTT FRA LABORATORIER.

Heparinsensitivitet (fig. 1)

En *in vitro* heparinsensitivitetskurve ble generert ved å øke mengden av heparinalikvoter med normalt donorblod. Det ble utført tredoble sitrat-APTT-analyser med Hemochron Jr. på hvert heparinnivå.

MERK: *Denne grafen er kun ment som et eksempel. Hver pasient demonstrerer en unik doseresponskurve.*

Korrelasjon mellom sitrat-APTT fra Hemochron Jr. og plasma-APTT fra laboratorier (fig. 2)

Nylig sitrerte blodprøver (n=210) fra pasienter før og etter hjertekateterisering og angioplastikk ble analysert med Hemochron Jr. Sitrate-APTT på mens pasientene var sengeliggende. En alikvot av hver prøve ble blandet med sitrat og sentrifugert, og en plasma-APTT-test ble utført på hver plasmaprøve, i et referanselaboratorium, med én lot med Dade Actin FSL® APTT-reagens (Dade, Baxter Healthcare, Dade Division, Miami, FL) på et Electra 900-instrument (IL, Lexington, MA).

De plasmaekvivalente sitrat-APTT-verdiene på Hemochron Jr. viste høy korrelasjon med laboratoriets sitrat-APTT-verdier for plasmaet (r=0,88), som vist i fig. 2.

Hemochron Jr. Signature og Hemochron Jr. II konverterer resultatet fra fullblodets APTT-test til plasmaekvivalente APTT-testverdier på få sekunder. På grunn av plasmaanalysens begrensninger er plasma-APTT-verdier over 180 sekunder ikke rutinemessig tilgjengelige når det brukes et fotooptisk instrument. Ettersom heparinsensitivitet er spesifikk for APTT-reagensmidler og testsystemet', vil denne øvre grensen for registrerte verdier variere fra et APTT-testsystem til et annet.

I tillegg til APTT-reagenssensitivitet, vil også metoden for påvisning av koagulasjon påvirke de øvre grensene til registrerte sluttpunkter. Plasmabaserte fotooptiske analysatorer vil gi registrerte sluttpunkter over området på 100-180 sekunder, avhengig av hvilket reagensmiddel som brukes og kvaliteten på blodprøven. En plasmaanalysator med et mekanisk sluttpunkt vil gi registrerte sluttpunkter på 200 sekunder eller mer, avhengig av hvilket reagensmiddel som brukes.

Konverteringsdiagram for Plasma-APTT (fig. 3)

Basert på regresjonsanalysen av fullblodets sitrat-APTT fra Hemochron Jr. og plasma-APTT fra referanselaboratoriet, har det blitt programmert inn en konverteringstabell i Hemochron Jr. Signature og Hemochron Jr. II. Konverteringen av plasma-APTT fremlegges så pasientens tilstand kan tolkes ved hjelp av en verdi legen kjenner til. Det programmerte plasmakonverteringsdiagrammet er basert på faktiske regresjonsdata (for plasma-APTT-er på 180 sekunder eller mindre) med en teoretisk utvidelse av dataene til de øvre grensene i det kliniske området testen er beregnet for. De øvre linearitetsgrensene varierer fra 200–400 plasmaekvivalente sekunder, avhengig av koagulasjonsegenskapene i pasientens blodprøve og plasmaanalysens sensitivitet.

MERK: *Plasma-APTT som vises er spesifikk for plasma-APTT bentet ved hjelp av et spesifikt APTT-reagensmiddel og et automatisert fotooptisk koagulasjonsinstrument. Variasjonen av reagensmidler og testinstrumenter fører til at ulike analysesystemer vil gi ulike konverteringer. For å oppnå best mulige resultater, bør institusjonene bruke en protokoll tilsvarende protokollen i korrelasjonsstudien ovenfor, til å etablere sitt eget ytelsesområde og konverteringsdiagram for reagensmiddelet som brukes i akkurat deres kliniske laboratorium.*

PRESISJON

Interne presisjonsstudier

Presisjonen av sitrat-APTT fra Hemochron Jr. ble evaluert gjennom flere sitrat-APTT-tester med fullblods kontrollprodukter som er spesifikke for sitrat-APTT-kyvetter på ITC-nivå 1 og II. To loter med testkyvetter for sitrat-APTT var inkludert i denne studien. Analysene ble utført på tre ulike dager, med godt vedlikeholdte instrumenter, med følgende resultater. Resultatene uttrykkes i fullblodverdier.

Kyvettelot 1

		Nivå 1				Nivå 2		
	N	Snitt (sek)	SD (sek)	CV (%)	N	Snitt (sek)	SD (sek)	CV (%)
Dag 1	3	95	6,5	6,9	3	202	12,8	6,3
Dag 2	3	92	2,1	2,3	3	191	7,4	3,9
Dag 3	3	86	2,0	5,9	3	199	8,2	4,1
Sum	9	91	5,9	6,4	9	197	9,8	5,0

Kyvettelot 2

		Nivå 1				Nivå 2		
	N	Snitt (sek)	SD (sek)	CV (%)	N	Snitt (sek)	SD (sek)	CV (%)
Dag 1	3	94	1,0	1,1	3	200	7,5	3,8
Dag 2	3	99	5,9	5,9	3	210	3,5	1,7
Dag 3	3	90	6,1	6,8	3	201	3,2	1,6
Sum	9	95	5,8	6,1	9	204	6,6	3,2

ZASTOSOWANIE TESTU

Hemochron™ Jr. Citrate APTT jest ujednoliconym, jednoetapowym, ilościowym testem APTT do mikrokoagulacji. Test Citrate APTT jest stosowany do oceny działania antyagregacyjnego niskich dawek heparyny (do 1,5 j./ml krwi, zależnie od osobniczej wrażliwości na heparynę).

Test Citrate APTT wykonuje się w próbce pełnej cytrynianowej krwi żylnej, przy zastosowaniu cyztnika Hemochron Jr. Signature lub Hemochron Jr. II. Jest to przenośna aparatura, a zastosowanie odczynników cytrynianowych umożliwia wykonanie oznaczenia w miejscu pobrania lub w laboratoriach, zarówno centralnych jak i satelickich. Aparatura nie jest przeznaczona do użytku domowego.

UWAGA: Hemochron Jr. Citrate APTT nie jest przeznaczony do stosowania z wcześniejszymi wersjami Hemochron Jr.

test diagnostyczny do zastosowania *in vitro*

STRESZCZENIE I OBJAŚNIENIA

Hemochron Jr. Citrate APTT stosowany jest do wykonywania oznaczeń w obrębie szlaku krzepnięcia wewnątrzpochodnego, do którego należą wszystkie czynniki krzepnięcia z wyjątkiem Czynnika VII i III (czynnik tkankowy). APTT jest modyfikacją czasu częściowej tromboplastyny (PTT). W PTT stosowany jest jako odczynnik fosfolipid uzyskiwany z tkanki mózgowej lub płucnej, naśladujący funkcję płytek krwi, biorących udział w procesie krzepnięcia. W APTT zawarta jest substancja aktywująca działanie poprzez kontakt, normalizująca aktywację Czynnika XII, co sprawia, że oznaczenie jest dokładniejsze i bardziej czułe. Takie aktywatory kontaktowe jak szkło, kaolin czy ziemia okrzemkowa pozwalają dodatkowo na odróżnienie APTT od PTT.

Wartości APTT uzyskiwane z oznaczenia prowadzonego w pełnej krwi przy zastosowaniu aparatury Hemochron Jr., przeliczane są na wartości będące równoważnikiem plazmy APTT, które są bliższe klinicystom i stanowią powszechnie stosowany standard, w odniesieniu do którego podejmowane są decyzje terapeutyczne.

Oznaczenie wykonane jest poprzez zastosowanie substytutu czynnika płytkowego 3 oraz aktywatora kaolinowego i nie wymaga etapu inkubacji.

ZASADA DZIAŁANIA TESTU

Zasada działania cztnika Hemochron Jr. polega na wykorzystaniu mechanizmu tworzenia się skrzepu w punkcie końcowym procesu krzepnięcia. Skrzep tworzy się w jednorazowych kuwetach Citrate APTT. Po dodaniu próbki pełnej krwi, cztnik odmierza dokładnie 15 mikrolitrów krwi do kuwety Citrate APTT, a następnie przesuwa ją do kanału pomiarowego. Pozostała część próbki, nie objęta badaniem, przesuwana jest automatycznie do kanału kuwety, w którym umieszczany jest material odpadowy. Mieszanie próbki z odczynnikiem oraz moment rozpoczęcia testu dokonuje się również w sposób automatyczny, bez udziału operatora. Po zmieszaniu z odczynnikiem próbka przesuwana jest ruchem wahadłowym w kanale testowym, a tworzenie się skrzepu jest monitorowane.

Mechanizm wykrywania skrzepu składa się z układu detektorów optycznych (fotodiod), ustawionych w linii kanału testowego kuwety. Mierzona jest prędkość z jaką próbka krwi przesuwa się pomiędzy detektorami. Wraz z rozpoczęciem procesu tworzenia się skrzepu, przepływ krwi jest hamowany i ruch ulega spowolnieniu. Gdy prędkość ulega zmniejszeniu poniżej założonej wartości, w pomiarze instrumentalnym rozpoznawany jest osiągnięty punkt końcowy procesu krzepnięcia. Wartości uzyskane z oznaczenia pełnej krwi na drodze matematycznych przekształceń są zamieniane przez czytnik na równoważniki plazmy. Wyniki oznaczenia pełnej krwi testem Citrate APTT można wyświetlić wciskając i przytrzymując klawisz **START** czytnika.

ODCZYNNIKI

Każde opakowanie kuwet testowych Citrate APTT zawiera:

– 45 saszetek, każda z nich zawiera jedną kuwetę testową Hemochron Jr. Citrate oraz jeden osuszacz.

Kuwety testowe Citrate APTT są autonomicznymi, jednorazowymi testowymi komorami, wypełnionymi wstępnie suchymi związkami kaolinu, fosfolipidu, soli wapnia, stabilizatorami i buforami. Każda kuweta jest oddzielnie zapakowana w saszetkę. Saszetki z kuwetami są ostemplowane datą ważności właściwą dla danej serii produktu.

OSTRZEŻENIE: Wszystkie używane kuwety testowe należy uważać za potencjalnie zakaźne, należy je stosować z zachowaniem środków ostrożności, oraz niszczyć zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami o likwidowaniu odpadów medycznych.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

NIE UŻYWAĆ kuwet po wygaśnięciu terminu ważności lub niewłaściwie przechowywanych.

NIE NALEŻY siłą wstawiać kuwety do czytnika. Jeżeli wyczuwany jest opór, należy delikatnie usunąć kuwetę i zbadać jej szczelnę . Usunąć wszystkie przeszkody przed ponowną próbą uruchomienia czytnika (patrz rozdział Obsługa i konserwacja (Service and Maintenance) w Podręczniku użytkownika aparatu Hemochron Jr.)

PRZECHOWYWANIE I STABILNOŚĆ

Zafoliowane w saszetki, przechowywane w lodówce (2 - 8°C) kuwety Citrate APTT zachowują stabilność aż do osiągnięcia deklarowanej daty ważności. Kuwety w zafoliowanych, zamkniętych saszetkach można też opcjonalnie przechowywać w temperaturze pokojowej (15 - 30°C). Kuwety Citrate APTT nie powinny być wystawiane na działanie temperatur wyższych niż 37°C.

UWAGA: Przechowywanie w temperaturze pokojowej może zostać wydłużone maksymalnie do 12 tygodni, ale nigdy nie powinno przekroczyć deklarowanej daty ważności. Przedatowywanie jest niezbędne przy przechowywaniu testu w temperaturze pokojowej i powinno zostać zaznaczone w tabeli "Performance Verified" ("Potwierdzenie przydatności") jako uzupełnienie informacji dotyczących przechowywania i umieszczone na bocznej ściance każdego opakowania zawierającego kuwetę. Otwarta saszetka właściwie zawinięta od strony rozcięcia i przechowywana w lodówce zachowuje stabilność przez pięć dni. Dla zachowania optymalnego okresu ważności, zaleca się otworzyć saszetkę z kuwetą bezpośrednio przed jej zastosowaniem.

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA

Przed przystąpieniem do wykonania jakiegokolwiek oznaczenia, w celu zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania, użytkownik powinien odwołać się do Podręcznika użytkownika czytnika Hemochron Jr. Signature lub Hemochron Jr. II.

Oznaczenie instrumentalne polega na wstawieniu kuwety do czytnika, pozostawieniu jej do ogrzania, dodaniu próbki pełnej krwi oraz wciśnięciu klawisza START. Pomiar próbki, wymieszanie próbki z odczynnikiem, inicjaca oznaczenia oraz wykrycie skrzepu nastąpi w sposób automatyczny.

Materiały dostarczone w zestawie

– Wstępnie wypełnione kuwety testowe Hemochron Jr. Citrate APTT.

Materiały potrzebne do wykonania testu, ale nie dostarczone w zestawie

– Aparat Hemochron Jr. Signature lub Hemochron Jr. II (tylko)
– Probówka próżniowa zawierająca cytrynian sodu (3,8% lub 3,2%) oraz igła do pobierania krwi
– 1 ml lub 3 ml plastykowe strzykawki, igły o rozmiarze 23 lub 21 do pobierania próbek strzykawką

KONTROLA JAKOŚCI

Testowanie i śledzenie rutynowej kontroli jakości powinno być częścią wszechstronnego programu systemu zapewnienia jakości. Odczynniki do kontroli jakościowej Hemochron Jr. przekształcają procedurę rutynowej kontroli jakości (QC) w badanie wygodne i dostępne.

Codzienna kontrola jakości działania urządzenia

Urządzenia Hemochron Jr. powinny być poddane dwupoziomowej kontroli jakości po każdych 8 godzinach pracy. Dostępny jest elektroniczny produkt do kontroli jakości, który umożliwia przeprowadzenie codziennej kontroli. Szczegółowe informacje zawiera Instrukcja obsługi stosowanego urządzenia Hemochron.

Kontrola jakości kuwet testowych Hemochron Jr.

Charakterystykę każdej serii kuwet Hemochron Jr. APTT należy zatwierdzić poprzez przeprowadzenie płynnej kontroli jakości na dwóch poziomach:

• Po odebraniu nowej partii, ORAZ
• Co 30 dni kalendarzowych od pierwszej kontroli

Jeżeli procedura zatwierdzenia kuwet da wynik pomyślny, przeprowadzanie płynnej kontroli jakości nie będzie potrzebne, chyba że nastąpi odchylenie w wynikach klinicznych.

Zatwierdzanie można przeprowadzić za pomocą produktów do kontroli jakości mikrokoagulacji krwi pełnej Hemochron Jr. Dopuszczalne zakresy charakterystyk i znaczenie wyników dla kuwet testowych Citrate APTT zostały dołączone do każdego zestawu produktu do kontroli jakości.

OGRANICZENIA TESTU

Test Hemochron Jr. Citrate APTT nie jest przeznaczony dla poziom¯w heparyny powyżej 1,5 j/ml. Charakterystyka wykonania nie przewiduje poziomów heparyny wyższych niż 1,5 j/ml. Wyniki oznaczenia niższe niż 10 równoważników plazmy (w sekundach) oraz przekraczające 400 równoważników plazmy (w sekundach) nie są odczytywane przez Hemochron Jr. Signature i Hemochron Jr. II. W miejsce konkretnych wartości wyświetlany jest komunikat "poza zakresem – Lo" lub "Poza zakresem – Hi". Wartości znajdujące się w zakresie pomiędzy 10 i 20 równoważników plazmy (w sekundach) prezentowane są jako < 20. Nie zaleca się stosowania próbek o hematokrycie mniejszym od 20% lub przewyższającym 55%, ze względu na gęstość optyczną będącą poza obszarem odczytu instrumentalnego.

Wartości Hemochron Jr. wyrażone w równoważnikach plazmy wyższe niż 400 sekund nie powinny być brane pod uwagę jako klinicznie istotne, a oznaczenie powinno być powtórzone lub prezentowane jako > 400 sekund .

Test Hemochron Jr. Citrate APTT jest obarczony błędem spowodowanym między innymi nieprawidłową techniką pobierania próbek krwi i przenoszenia ich do studzienki testowej. Na jakość próbki krwi może także mieć wpływ:

– spienienie lub hemoliza pr¯bki
– skrzepła lub częściowo skrzepła krew
– nieprzewidziana antykoagulacja
– antykoagulant toczniowy

Podobnie jak w innych testach diagnostycznych, wyniki uzyskane przy zastosowaniu Hemochron Jr. powinny zostać przeanalizowane w kontekście indywidualnego stanu pacjenta oraz stosowanej terapii przeciwzakrzepowej. Każdy wynik niespójny ze stanem klinicznym pacjenta powinien być potwierdzony dodatkowym badaniem lub uzupełniony danymi uzyskanymi z dodatkowych oznaczeń.

POBIERANIE PRÓBEK ORAZ WYKONANIE TESTU

Przed przystąpieniem do pobrania próbki krwi, należy zapoznać się z instrukcjami zakładowymi oraz CLSI (H21-A, H47-A oraz H03-A) zawierającymi wskazówki, jak pobierać próbki do oznaczania krzepliwości krwi.

UWAGA: Próbki krwi do oznaczeń powinny być pobrane przynajmniej 5 minut przed wykonaniem oznaczenia, co umożliwia prawidłowe wymieszanie próbki z cytrynianem sodu. Optymalne wyniki uzyskiwane są przy wykonywaniu oznaczenia w czasie jednej godziny, oraz wtedy gdy próbki przed przystąpieniem do wykonania oznaczenia przetrzymywane są w temperaturze pokojowej.

Nie należy pobierać krwi z heparynizowanego cewnika, wenflonu lub heparynizowanego cewnika umocowanego na stałe.

Jeżeli próbki pobierane są przy zastosowaniu cewników umocowanych na stałe, należy przepłukać dokładnie jego ujście, postępując zgodnie z zakładowymi procedurami.

1. Przy pomocy strzykawki lub probówki próżniowej pobrać 5 ml krwi.
2. Jeżeli do pobrania próbki stosowana jest strzykawka, należy nałożyć na strzykawkę igłę do pobierania. Ostrożnie przekłuć gumowy korek próżniowej probówki zawierającej cytrynian sodu (3,8% lub 3,2%) i pozwolić na swobodne wypełnienie probówki krwią aż do zatrzymania wypływu. Delikatnie wymieszać. Wyrzucić strzykawkę razem z igłą.
3. Przed wykonaniem oznaczenia odwróci probówkę przynajmniej cztery razy, aby zapewnić całkowite wymieszanie próbki.
4. Odmierzyć jedną kroplę krwi cytrynianowej do studzienki kuwety testowej, zaczynając od dna, aż do całkowitego jej zapełnienia. W tym celu można użyć (opcjonalnie) igły do przenoszenia. Wystarczająca objętość krwi powinna być rozdzowana dokładnie do centralnej studzienki testowej, wypełniając ją równomiernie aż do brzegu. Jeżeli zdarzy się, że duża kropla krwi przeleje się ponad brzegiem centralnej studzienki testowej, należy ją przesunąć do zewnętrznej studzienki testowej.
5. Wcisnąć klawisz **START**

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA

Normalny zakres

Hemochron Jr. Citrate APTT oceniano używając świeżej, cytrynianowej krwi, pobranej od zdrowych dawców – ochotników.

Wyniki uzyskane przy zastosowaniu cytryniu o stężeniach 3,8% i 3,2% przedstawiono w Tabeli 1.

Tabela 1.

Normalny zakres	Cytrynian		3,2%	3,8%
	Liczba pr¯bek /n/		36	35
Równoważnik plazmy (w sekundach)	Wartości średnie		29,6	31,6
	Odchylenie standardowe /SD/		4,5	5,1
	Zakres (±2 SD)		20,6-38,6	21,4-41,8
Pełna krew (w sekundach)	Wartości średnie		103	105
	Odchylenie standardowe /SD/		5,3	5,9
	Zakres (±2 SD)		92,4-113,6	93,2-116,8

UWAGA: Wartości przedstawione jako równoważnik plazmy APTT niższe od 20 sekund nie są rutynowo dostępne i powinny być określone jako "poniżej 20 sekund".

UWAGA: Każda instytucja powinna określić swój własny normalny zakres oraz zakres docelowy terapeutycznego poziomu antykoagulacji w odniesieniu do własnej grupy pacjent¯w.

UWAGA: Wartości przedstawione jako równoważniki plazmy APTT, uzyskane w oznaczeniu przy zastosowaniu Hemochron Jr. niższe od 10 sekund, powinny być określone jako "poza zakresem - Lo" i mogą wskazywać na nadmierną krzepliwość krwi, prawdopodobnie wynikającą z zanieczyszczenia próbki w czasie jej pobierania lub obróbki. Zabieg wymaga powtórzenia.

Wyniki oznaczenia przedstawione są w równoważnikach plazmy. Czas krzepnięcia pełnej krwi cytrynianowej APTT można odczytać wciskając i przytrzymując klawisz **START**.

Wyniki przedstawione w równoważnikach plazmy APTT obliczane są dla określonego odczynnika APTT oraz systemu instrumentalnego. Poszczególne systemy APTT prezentują odmienne normalne zakresy oraz czułość na heparynę. Wartości przedstawione jako równoważniki plazmy APTT umieszczone w programie Hemochron Jr. Signature oraz Hemochron Jr. II, są przybliżonymi równoważnikami plazmy mającymi zastosowanie kliniczne. Jeżeli instytucje prowadzą porównawcze badania, przeliczając wyniki uzyskane z badania pełnej krwi na plazmę APTT, stosując zasadę oznaczenia podobną do tej, która opisana została w "CORRELATION OF THE HERMOCHRON Jr. CITRATE APTT AND LABORATORY PLASMA APTT", mogą uzyskać bardziej wiarygodny system przeliczeniowy.

Czułość heparyny (Fig. 1)

Krzywa czułości heparyny (in vitro) została opracowana na podstawie wartości rosnących objętości heparyny, dodawanych do jednakowej objętości normalnej krwi dawców, rozdzoowanej do probówek. Potrójne oznaczenia przy zastosowaniu Hemochron Jr. Citrate APTT były wykonywane z każdą ilością heparyny.

UWAGA: Przedstawiona krzywa jest jedynie przykładowym wykresem. W przypadku każdego pacjenta odpowiedź na dawkę jest inna, a więc i krzywe mają indywidualny charakter.

Korelacja pomiędzy wynikami APTT uzyskanymi na podstawie metody Hemochron Jr. Citrate oraz testu laboratoryjnego z zastosowaniem plazmy (Fig. 2)

Próbki świeżej krwi cytrynianowej (n=210) pobrane od pacjentów przed i po wykonaniu zabiegów cewnikowania serca i plastyki naczyń były analizowane przy łóżku pacjenta przy zastosowaniu Hemochron Jr. Citrate APTT. Równe objętości próbek rozdozowane do probówek, wymieszane zostały z cytrynianem i odwirowane. Każdą próbkę plazmy przebadano w laboratorium referencyjnym, określając APTT plazmy. Zużyto jedną serię odczynnika Dade Actin FSL* APTT (Dade Baxter Healthcare, Dade Division, Miami, FL) używając do odczytu analizatora Electra 900 (IL, Lexington, MA).

Wartości Hemochron Jr., wyrażone w równoważnikach plazmy Citrate APTT, były wysoko skorelowane z wartościami laboratoryjnie uzyskanych wyników Citrate APTT plazmy (r=0,88) o czkazuje Fig. 2.

Hemochron