REF J201

CE

Hemochron® Jr.

Whole Blood Microcoagulation Systems

Prothrombin Time (PT)

Package Insert

English

INTENDED USE

The Hemochron®-Jr. PT is a unitized microcoagulation test intended for use in performing a quantitative, one-stage prothrombin time.

The PT test is performed on any Hemochron Jr. model using a fresh whole blood sample. Each instrument is portable and is intended for bedside use. The instrument is not intended for home use.

For *in vitro* Diagnostic Use, For Professional Use, Rx Only

SUMMARY AND EXPLANATION

The Hemochron Jr. PT is a test of the extrinsic coagulation pathway. Whole blood test systems eliminate many of the variables known to affect the reliability of plasma PT testing, including specimen collection, handling and processing. Since no specimen processing is required, PT results are obtained in less than two minutes.[2]

Bedside testing is especially valuable during procedures and therapeutic interventions that require monitoring of oral anticoagulants and for hemostasis assessment before or after blood transfusions.

PRINCIPLE OF OPERATION

The Hemochron Jr. instruments utilize a mechanical endpoint clotting mechanism in which testing occurs within the disposable PT cuvette. Following whole blood sample introduction, the instrument precisely measures 15 microliters of blood and automatically moves it into the test channel within the PT cuvette. The remainder of the blood sample, not needed for testing, is automatically drawn into the waste channel of the cuvette. Sample/reagent mixing and test initiation are also performed automatically, requiring no operator interaction. After mixing with the reagent, the sample is moved back and forth within the test channel and monitored for clot formation.

The clot detection mechanism consists of a series of LED optical detectors aligned with the test channel of the cuvette. The speed at which the blood sample moves between the detectors is measured. As clot formation begins, blood flow is impeded and the movement slows. The instrument recognizes that the clot endpoint has been reached when the movement decreases below a predetermined rate. The instrument reports whole blood numbers mathematically converted to an International Normalized Ratio (INR) and a plasma equivalent value. The whole blood PT time may be displayed by depressing and holding the **START** key.

REAGENTS

Each box of PT test cuvettes contains:

– 45 pouches, each containing one Hemochron Jr. PT test cuvette and one desiccant

The PT test cuvette is a self-contained disposable test chamber preloaded with a dried preparation of thromboplastin, stabilizers and buffers. Each cuvette is individually packaged in a pouch. Cuvette pouches are stamped with a lot-specific expiration date.

CAUTION: *All used test cuvettes should be considered as potentially infectious, handled with care and disposed of using standard medical waste disposal policy.*

WARNINGS AND PRECAUTIONS

Do NOT use cuvettes that are past their marked expiration date, or that have been improperly stored.

Do NOT force a cuvette into the instrument. If resistance to insertion is encountered, gently remove the cuvette and examine the cuvette slot. Remove any obstruction before attempting further use of the instrument (see Service and Maintenance in the appropriate Hemochron Jr. Operator's Manual).

STORAGE AND STABILITY

When refrigerated (2 - 8°C), the foil pouched PT cuvettes are stable until the marked expiration date. Room temperature storage (15 - 30°C) is optional for unopened, pouched cuvettes. PT cuvettes should not be exposed to temperatures in excess of 37°C.

NOTE : *Room temperature re-dating is to a maximum of 12 weeks, but must never exceed the marked expiration date. Re-dating is necessary if stored at room temperature and should be indicated by completing the storage information section of the "Performance Verified" table on the side panel of each cuvette box. The opened pouch, properly folded at the open end, and refrigerated, is stable for seven days. For optimal shelf life, it is recommended to open the cuvette pouch immediately before use.*

OPERATING INSTRUCTIONS

Before performing any assay, the user should refer to the appropriate Hemochron Jr. Operator's Manual for detailed operating instructions.

The instrument is operated by inserting a cuvette into the instrument, allowing it to warm, introducing a whole blood sample and depressing the **START** key. Sample measurement, sample/reagent mixing, test initiation and clot detection will then proceed automatically.

Material Provided

– Preloaded Hemochron Jr. PT test cuvettes

Material Required, but Not Provided

– Hemochron Jr., Hemochron- Jr. II or Hemochron- Jr. Signature

– 1 mL or 3 mL plastic syringes, 23 or 21 gauge needle (for syringe sampling)

– Fingerstick device, alcohol swab, gauze (for fingerstick sampling)

SAMPLE COLLECTION AND HANDLING

To obtain blood specimen, follow institutional and NCCLS(H21-A3, H47-A) guidelines for obtaining samples for coagulation testing.

Do not collect fresh whole blood samples using glass blood collection tubes.

Do not obtain blood from heparinized access line, lock or indwelling heparin lock.

When sampling through indwelling blood lines, flush access port thoroughly following institutional procedures.

1. Obtain 0.2 mL of blood with the syringe or fingerstick.
2. Immediately dispense one drop of blood into the sample well of the test cuvette; filling from the bottom of the well up. This may be done either with or without a transfer needle. A sufficient quantity of blood must be added directly to the center sample well to fill it flush to the top. Should a large drop of blood extend above the center sample well, push it over into the outer sample well.
3. Depress the **START** key.

QUALITY CONTROL (QC)

Routine quality control testing and tracking should be part of a comprehensive quality assurance program. Hemochron Jr. quality control products are available to make routine QC convenient and affordable.

Daily QC of the Instrument

The Hemochron Jr. should be quality controlled at two levels of control once every 8 hours of operation. To assist in accomplishing daily QC, Electronic Quality Control is available and can provide a two-level check of the instrument. Refer to the Operator's Manual for the specific Hemochron Instrument in use for detailed instructions.

QC of the Hemochron Jr. Test Cuvettes

Each ***lot*** of Hemochron Jr. PT cuvettes should be validated for performance at two liquid quality control levels:

• When a new shipment is received, AND
• Once per 30 calendar days thereafter

Following successful performance validation as above, the cuvettes will not require any further liquid quality control unless a shift in clinical results is suspected.

Performance validation can be accomplished using the appropriate Hemochron Jr. Microcoagulation Whole Blood Quality Control products. Acceptable performance ranges and how to apply them for the PT test cuvettes are included with each quality control product kit.

LIMITATIONS

For the Hemochron Jr. instrument, whole blood second values less than 15 or greater than 170 are not reported. Instead, plasma equivalent (PT-P) values of "PT<10.4 sec, Repeat" or "PT - P>80 sec", respectively, are displayed.

For Hemochron Jr. II or Hemochron Jr. Signature, INR values between 0.5 and 0.8 and between 10 and 12, are displayed as "INR<0.8" or "INR>10" respectively. INR values under 0.5 and over 12 are displayed as "Out of Range-Lo" and "Out of Range-Hi" respectively.

Samples with a hematocrit less than 20% or greater than 55% are not recommended due to an optical density outside of the level of detection of the instrument.

The Hemochron Jr. PT is affected by poor technique including blood collection and the transfer of blood to the sample well. The quality of the blood specimen may be affected by:

– Foaming or hemolysis of the sample
– Clotted or partially clotted blood
– Unsuspected anticoagulation

Studies indicate interferences may occur in patients with antiphospholipid antibodies or antiphospholipid syndrome.[3,4,5]

As with all diagnostic tests, Hemochron Jr. test results should be scrutinized in light of a specific patient's condition and anticoagulant therapy. Any results exhibiting inconsistency with the patient's clinical status should be repeated or supplemented with additional test data.

PERFORMANCE CHARACTERISTICS

Normal Range

Normal volunteer donors tested on the Hemochron Jr. systems generally yield INR values of 1.3 or less. The associated plasma equivalent is:

	Jr. (ISI=2.0)	Signature/Jr. II (ISI=1.0)
INR=1.3	13.6 secs.	17.8 secs.

In an independent evaluation of 36 healthy volunteer donors, the INR range determined was:

	Jr.	Signature/Jr. II
INR range	1.0 - 1.4	0.80 - 1.4

NOTE: *The normal value established was specific for the ISI of the thromboplastin reagent employed. Each institution should establish its own normal range and target range of therapeutic anticoagulation based on their patient population.*

Whole blood PT values less than 15 seconds (Hemochron Jr.), or INR values 0.5 (Hemochron Jr. II and Hemochron Jr. Signature) indicate excessive blood coagulation activation, possibly due to specimen collection or processing, and should be repeated. The thromboplastin reagent of the Hemochron Jr. PT is a highly sensitive, low ISI reagent which provides optimal sensitivity for Vitamin K dependent clotting factors. The INR displayed at the conclusion of the assay is indicative of the degree to which these clotting factors are diminished in the presence of oral anticoagulant therapy. The plasma PT results displayed by the Hemochron Jr. model are based upon a value which corresponds to a laboratory reagent ISI of 2.0. The plasma PT results displayed by the Hemochron Jr. II and Hemochron Jr. Signature models are based upon a value which corresponds to a laboratory reagent ISI of 1.0. Different PT plasma systems demonstrate diverse normal ranges and anticoagulant sensitivity. Plasma PT values corresponding to the thromboplastin of ISI 1.0 and 2.0 are shown in Fig. 6.

Sensitivity and Specificity of the Hemochron Jr. PT Test (Fig. 1, 2 and 3)

The Hemochron Jr. PT test was tested with a standard whole blood preparation which was prepared with diminishing concentrations of normal pooled plasma and increasing concentrations of pooled plasma deficient in Vitamin K dependent clotting factors (Factors II, V, VII, IX and X). The Hemochron Jr. PT was correlated to the laboratory plasma PT using a standard thromboplastin reagent (Dade, Baxter Healthcare Corporation, Dade Division, Miami, FL) and Electra 900 (IL, Lexington, MA). In addition to PT reagent sensitivity, various clot detection methods provide different clotting factor sensitivity.

Summary of Sensitivity (Fig. 4)

The Hemochron Jr. instrument and whole blood PT test cuvette were tested against a standard laboratory plasma assay to assess the sensitivity of the whole blood test relative to this standard plasma assay. The substrates used in the plasma test were samples with diminishing Vitamin K clotting factor concentration. The sensitivity to specific factor deficient plasma was also tested. The PT results of these plasma samples were first determined using the Electra 900 (IL, Lexington, MA) with commercial reagents (Dade Thromboplastin, Baxter Healthcare Corp., Dade Division, Miami, FL). Subsequent to this assay, an appropriate volume of red blood cells was added and the whole blood sample was tested in the Hemochron Jr. instrument with the PT cuvette. The results of the plasma and whole blood tests were subjected to statistical analysis. All comparisons were significantly correlated.

Clinical Relevance (Fig. 5)

The Hemochron Jr. PT test was assessed in three hospital based outpatient thrombosis clinics with patients (n=108) who were routinely monitored by a plasma PT (obtained by venipuncture). Each hospital had a unique instrument reagent combination and collected the whole blood in different sodium citrate concentrations. Near-patient and laboratory data in all sites were obtained by split sample design. A sample of the whole blood obtained by venipuncture was run on the Hemochron Jr. and the Hemochron Jr. Signature. The remainder was mixed with sodium citrate and sent to the laboratory for processing. All tests were performed in duplicate, and results were recorded and compared. Fig. 5 represents the Hemochron Jr. INR (venous) results as compared to the laboratory plasma INR assay.

Comparison of Blood Acquisition Methods

In a separate analysis (n=50), the influence of the blood collection method was tested. The whole blood PT results obtained from the fingerstick (capillary) sample were compared to the samples obtained by venipuncture. The test results were equivalent (r=0.95).

Summary of Clinical Relevance

Each venous blood sample was split; a drop of blood was analyzed on the Hemochron Jr. instruments while the remainder of the sample was treated with sodium citrate and sent to the lab for processing and plasma PT measurement. Subsequently, a fingerstick sample of capillary blood was obtained and used in a new PT test cuvette. PT test results were compared. The plasma PT was correlated to the whole blood PT (venous) (r=0.91); plasma PT was compared to fingerstick PT (capillary) (r=0.88), and methods of collection (venous versus capillary) were compared (r=0.95). All correlations were highly significant, demonstrating the independence of the blood acquisition technique.

INR - Plasma Equivalent Conversion Charts (Fig. 6)

Each instrument displays the PT result as an INR and plasma equivalent PT in seconds. Representative conversion charts are found in Fig. 6. The instrument series uses different calculations to derive these values from the whole blood result as described in Fig. 6.

Hemochron Jr. Representative Conversion Chart

Based on a linear regression analysis of paired test results of the whole blood Hemochron Jr. PT and plasma PT (seconds) a whole blood to plasma equivalent conversion equation was generated for the Hemochron Jr. The plasma conversion programmed into the Hemochron Jr. instrument is based on a comparative plasma based thromboplastin of ISI=2.0. The INR value is subsequently derived from the plasma PT values. This conversion is based on comparative data obtained from multiple clinical sites.

Hemochron Jr. II and Hemochron Jr Signature Representative Conversion Chart

Based on a linear regression analysis of paired test results of the whole blood Hemochron Jr. PT and plasma PT (INR) a whole blood INR conversion equation was generated for the Hemochron Jr. II and Hemochron Jr. Signature models. The plasma conversion programmed into the Hemochron Jr. II and Hemochron Jr. Signature instruments are based on a comparative plasma based thromboplastin of ISI=1.0. This conversion is based on comparative data obtained from multiple clinical sites.

NOTE: *Plasma PT results are specific for reagent and test instrument. The plasma PT conversion is based upon comparative data and dependent upon the limitations of the plasma assay.*

The clinically insignificant differences observed in the table for conversion of the whole blood result to INR are attributable to the calculation methods employed in the respective device.

NOTE: *The Hemochron Jr. II and Hemochron Jr. Signature models display plasma equivalent values based on a comparative plasma based thromboplastin of ISI=1.0. Earlier models of the Hemochron Jr. display plasma equivalent values based on a comparative plasma based thromboplastin of ISI=2.0.*

Institutions may develop their own customized conversion through the performance of a whole blood PT and plasma PT comparative study.

Fig. 6 Footnotes:

1a. For the Hemochron Jr.: When a test is performed, a whole blood test result and a calculated plasma equivalent result are reported. The INR is calculated from the plasma equivalent value and the reagent ISI value.

1b. For the Hemochron Jr. II and Hemochron Jr. Signature: When a test is performed, a whole blood test result and a calculated INR are reported. The plasma equivalent result is calculated from the INR value and the reagent ISI value.

2. The conversion chart shown is specific for a plasma PT obtained using a particular PT reagent. The conversion for ISI=2.0 was obtained using Dade Thromboplastin C plus (Baxter Healthcare Corp. Dade Division, Miami, FL) and an Electra 900 instrument (IL, Lexington, MA). Due to the variability of reagents and test instruments, different assay systems will produce different conversions. Institutions may wish to establish their own performance range and conversion chart for the specific reagent employed in their clinical laboratory. Such a conversion may then be used in place of the conversion displayed in the instruments. Institutions electing to perform custom conversions are cautioned that the whole blood to plasma conversion is only relevant for a standard combination of thromboplastin reagent and instrument. Changes of either component necessitate a re-evaluation of the custom correlation.

3. The Hemochron Jr. whole blood clotting time is measured internally to the nearest tenth of a second and rounded off to the nearest whole number for display. This rounding procedure may result in slight differences between the instrument displayed plasma equivalent value and the value shown in the conversion table.

PRECISION

In-house Precision Studies

The precision of the Hemochron Jr. Signature was evaluated by performing multiple PT assays using normal and abnormal whole blood controls. Assays were performed on three separate test days utilizing up to three instruments with the following results. Hemochron Jr. precision values are expressed as INR.

	N	Mean	SD
Normal	45	2.3	0.27
Abnormal	45	8.9	0.43

Repeated testing on a single instrument for three consecutive days yielded the following precision:

	N	Mean	SD
Normal	15	2.3	0.28
Abnormal	15	9.1	0.34

Repeated testing on a single instrument yielded the following day-to-day precision results:

	Normal			Abnormal	
	N	Mean	SD	Mean	SD
Day 1	5	2.1	0.23	8.9	0.37
Day 2	5	2.3	0.18	9.0	0.15
Day 3	5	2.3	0.39	9.5	0.24

Summary of Precision

Four Hemochron Jr. instruments were subjected to precision tests with two levels of whole blood control, normal and abnormal. Instruments were tested repeatedly within a day to establish the expected variation among instruments. Instruments were also tested with the whole blood control for five consecutive days to establish the expected variation day to day. The instrument variation was demonstrated to be within 10% for both levels of whole blood control.

International Normalized Ratio

The therapeutic range of the oral anticoagulant therapy is traditionally expressed as a ratio of the patient PT to a normal PT (center of institution's normal range). Due to the variable procoagulant nature of different thromboplastins, it has been proposed by the International Council for Standardization in Hematology and the Scientific and Standardization Committee of the International Society for Thrombosis and Hemostasis that each manufacturer of thromboplastin reagent identify the potency of their preparation as compared to the World Health Organization (WHO) standard. Such comparison results in the assigning of an International Sensitivity Index (ISI) for the reagent. The ISI may then be used to convert patient normal ratios to International Normalized Ratios (INR).

The Hemochron Jr. automatically converts the whole blood PT result into its corresponding plasma equivalent PT and INR value. The equation to convert whole blood clotting time to plasma equivalent time is based on a regression analysis from data obtained from multiple clinical sites. The plasma equivalent equations programmed into the Hemochron Jr. are based on clinical data which used a reagent with an ISI of 2.0 (Dade, Thromboplastin C plus, Baxter Healthcare Corp., Dade Division, Miami, FL) and an automated plasma based coagulation instrument (Electra 900, IL, Lexington, MA).

The INR reported is designed to be independent of the plasma reference used and has been correlated to systems using an ISI of 1.0. Recent reports have emphasized the persistence of inconsistencies between INR test systems.[1] Institutions may wish to establish their own target range of therapeutic anticoagulation based on their patient population and laboratory INR test system.

The Hemochron Jr. II and Hemochron Jr. Signature models automatically convert the whole blood PT result into its corresponding INR and plasma equivalent value. The equation to convert whole blood clotting time to INR is based on a regression analysis from data obtained from multiple clinical sites. The laboratory systems employed in the clinical sites included an MDA 180 with Simplastin® (Organon Teknika, Durham, NC), an IL 1000 (IL, Lexington, MA) with Dade C+ (Dade, Miami, FL) and a Coagamate (IL, Lexington, MA) with Simplastin® (Organon Teknika, Durham, NC). The INR equation programmed into the Hemochron Jr. II and Hemochron Jr. Signature are based on clinical data which used a reagent with an ISI of 1.0 (Recombiplastin [IL, Lexington, MA]) on an automated plasma based coagulation instrument (IL, Lexington, MA).

Prothrombin Time
Prothrombinzeit (PT)

Packungsbeilage

Deutsch / German

VERWENDUNGSZWECK

Hemochron® Jr. PT ist ein modularer Mikrokoagulationstest zur Bestimmung einer quantitativen, einstufigen Prothrombinzeit.

Der PT-Test wird auf einem Hemochron Jr. Modell mit einer frischen Vollblutprobe durchgeführt. Jedes Gerät ist tragbar und für den Gebrauch am Bett bestimmt. Das Gerät ist nicht für den Heimgebrauch vorgesehen.

Zur *In-vitro*-Diagnose

ZUSAMMENFASSUNG UND ERKLÄRUNG

Hemochron Jr. PT ist ein Test für den extrinsischen Koagulationsablauf. Durch Vollblutteststysteme können viele der bekannten Variablen, die für die Zuverlässigkeit der Tests von Plasma-Prothrombinzeit (PT) verantwortlich sind, ausgeschlossen werden – einschließlich der Handhabung und Verarbeitung von Proben. Da keine Verarbeitung von Proben nötig ist, steht das Ergebnis des PT-Tests in weniger als zwei Minuten fest.[2]

Der Test ist besonders bei therapeutischen oder operativen Eingriffen nützlich, die eine Überwachung der oralen Antikoagulantien erfordern, und bei Hämostase-Untersuchungen vor oder nach Transfusionen.

BETRIEBSPRINZIP

Die Hemochron Jr. Geräte verwenden einen mechanischen Gerinnungsmechanismus, bei dem die Gerinnung in der Einmal-PT-Küvette stattfindet. Nach der Vollblut-Einführung misst das Gerät exakt 15 Mikroliter Blut und verschiebt es automatisch in den Testkanal innerhalb der PT-Küvette. Die verbleibende Blutprobe wird nicht mehr benötigt und automatisch in den Entsorgungskanal der Küvette gezogen. Vermischung von Probe und Reagens sowie Testbeginn werden auch automatisch durchgeführt. Nach dem Mischen mit dem Reagens wird die Probe in dem Testkanal hin- und herbewegt, wobei die Gerinnselbildung überwacht wird.

Der Gerinnsel-Erkennungsmechanismus besteht aus einer Reihe optischer LED-Detektoren, die mit dem Testkanal der Küvette ausgerichtet sind. Die Geschwindigkeit der Blutprobe zwischen den Detektoren wird gemessen. Sobald die Gerinnung erfolgt, wird der Blutfluss gebremst und verlangsamt sich. Das Gerät registriert das Gerinnsel, wenn sich das Blut unterhalb einer vorbestimmten Flussrate bewegt. Das Gerät gibt mathematische Vollblutwerte an, die in eine Internationale normalisierte Ratio (INR) und einen Plasma-äquivalenten Wert umgerechnet werden. Die Vollblut-PT-Zeit wird durch Gedrückthalten der **START**-Taste angezeigt.

REAGENZIEN

Jede Packung PT Testküvetten enthält:

– 45 Folienbeutel, die jeweils eine Hemochron Jr. PT-Testküvette und ein Trockenmittel enthalten

Die PT-Testküvette ist eine in sich abgeschlossene Testkammer, die mit einer getrockneten Aufbereitung von Thromboplastin, Stabilisatoren und Puffern vorgefüllt ist. Jede Küvette ist einzeln in einem Beutel verpackt. Auf den Küvetten befindet sich ein chargenspezifisches Verfallsdatum.

VORSICHT: *Alle benutzten Testküvetten sollten als potenziell infektiös betrachtet werden, mit Vorsicht gehandhabt werden und gemäß den üblichen medizinischen Entsorgungsrichtlinien entsorgt werden.*

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER BEDIENUNG

NICHT Küvetten verwenden, die das auf der Packung angegebene Verfallsdatum überschritten haben, oder unsachgemäß gelagert wurden.

Die Küvette **NICHT** gewaltsam in das Gerät drücken Wenn bei dem Einsetzen der Küvette Widerstand zu spüren ist, die Küvette vorsichtig entfernen und den Küvettenschacht untersuchen. Eventuelle Blockierungen vor einem weiteren Einsatz des Gerätes entfernen (siehe Kapitel „Service und Wartung" des entsprechenden Hemochron Jr. Benutzerhandbuchs)

LAGERUNG UND STABILITÄT

Bei entsprechender Kühlung (2–8°C) sind die folienverpackten PT Testküvetten bis zum angegebenen Verfallsdatum haltbar. Ungeöffnete, im Beutel verpackte Küvetten können eventuell auch bei Raumtemperatur (15–30°C) gelagert werden. PT Küvetten sollten niemals einer Temperatur von über 37 °C ausgesetzt werden.

HINWEIS: *Bei Raumtemperatur sind die Produkte maximal 12 Wochen halt-bar, aber niemals länger als bis zu dem auf der Verpackung angegebenen Verfallsdatum. Ein neues Verfallsdatum muss bei Lagerung bei Raumtemperatur angegeben werden. Dazu muss das neue Datum im Abschnitt Lagerinformationen unter „Performance Verified" (Leistung verifiziert) auf der Seite jeder Küvettenschachtel eingetragen werden. Geöffnete, gekühlte Beutel, deren Öffnung sachgemäß zusammengefaltet wird, sind sieben Tage haltbar. Zur optimalen Haltbarkeit wird empfohlen, jeden Küvettenbeutel erst unmittelbar vor Gebrauch zu öffnen.*

BEDIENUNGSANWEISUNGEN

Vor Beginn der Verwendung sollte sich der Benutzer mit den detaillierten Anweisungen des entsprechenden Hemochron Jr. Benutzerhandbuchs vertraut machen.

Das Gerät wird verwendet, indem eine Küvette in das Gerät eingeführt wird, eine Vollblutprobe eingeleitet und die **START** Taste gedrückt gehalten wird. Messung der Probe, Mischung von Probe und Reagens, Testbeginn und Gerinnselerkennung erfolgen daraufhin automatisch.

Beigefügtes Material

– Vorgefüllte Hemochron Jr. PT-Testküvetten

Erforderliches, aber nicht bereitgestelltes Material

– Hemochron Jr., Hemochron- Jr. II oder Hemochron- Jr. Signature

– 1- mL- oder 3- mL-Plastikspritze, Kanüle (23 oder 21-Gauge) (bei Spritzenentnahme)

– Fingerstichinstrument, Alkoholtupfer, Gaze (für Fingerstichproben)

PROBENENTNAHME UND HANDHABUNG

Zur Entnahme von Blutproben sind die institutionellen Richtlinien sowie NCCLS (H21-A3 und H47-A) zur Entnahme von Proben für Koagulationstests zu befolgen.

Keine frischen Vollblutproben unter Verwendung von Blutabnahmeröhrchen aus Glas entnehmen.

Keine Proben aus heparinisierten Zugangsleitungen, Heparin-Locks oder Dauer-Heparin-Locks entnehmen.

Bei der Entnahme von Proben aus Dauerblutkathetern den Zugangsport sorgfältig gemäß den institutionellen Vorgaben durchspülen.

1. 0,2 mL Blut mit der Spritze oder mittels Fingerstich entnehmen.
2. Sofort einen Tropfen Blut in den Probenschacht der Testküvette geben, dabei den Schacht von unten nach oben füllen. Dies kann sowohl mit als auch ohne Transferkanüle geschehen. In den mittleren Probenschacht muss soviel Blut gegeben werden, dass er bis oben gefüllt ist. Sollte sich über dem mittleren Schacht eine große Flüssigkeitswölbung bilden, diese in den äußeren Schacht hinüberdrücken.
3. **START**-Taste drücken.

QUALITÄTSKONTROLLE (QK)

Routinemäßige Test zur Qualitätskontrollen und -verfolgung sollten Bestandteil eines umfassenden Qualitätssicherungsprogramm sein. Hemochron Jr.-Qualitätskontroll-Produkte sind erhältlich und machen die routinemäßige Kontrollen einfach und erschwinglich.

Tägliche QK der Geräte

Das Hemochron Jr. sollte nach 8-stündiger Verwendung auf zwei Kontroll-Levels auf seine Qualität überprüft werden. Zur Unterstützung bei den täglichen Qualitätsprüfungen kann die Elektronische Qualitätskontrolle für eine zweistufige Prüfung des Geräts verwendet werden. Detailliierte Anweisungen zur Verwendung des jeweiligen Hemochron-Geräts finden Sie im Benutzerhandbuch.

QK der Hemochron Jr. Testküvetten

Jede ***Lieferung*** von Hemochron Jr. PT-Küvetten muss zur Leistungsvalidierung einer zweistufigen Flüssigkeits-Qualitätskontrolle unterzogen werden:

• Bei Erhalt einer neuen Lieferung, UND
• Nach Erhalt alle 30 Kalendertage

Nach der erfolgreichen Leistungsprüfung der Küvetten wird keine weitere Flüssigkeits-Qualitätskontrolle benötigt, es sei denn, es tritt eine Änderung der kli-nischen Ergebnisse auf.

Die Leistungsprüfung kann mit Hilfe der entsprechenden Hemochron Jr. Mikrokoagulations-Vollblut-Qualitätskontrollprodukte geschehen. Akzeptable Leistungsbereiche und deren Anwendung auf die PT-Testküvette werden mit jedem Qualitätskontrollprodukt geliefert.

BESCHRÄNKUNGEN

Vollblut-Zweitwerte unter 15 oder über 170 werden vom Hemochron Jr. Gerät nicht angezeigt. Stattdessen werden Plasma-Äquivalenzwerte (PT-P) von „PT<10,4 Sec, Repeat" oder „PT - P>80 Sec", angezeigt.

Beim Hemochron Jr. II oder Hemochron Jr. Signature werden INR-Werte zwischen 0,5 und 0,8 und zwischen 10 und 12 als „INR<0,8" und „INR>10" angezeigt. INR-Werte unter 0,5 und über 12 werden als „Out of Range - Lo" (Außerhalb des Messbereichs – Niedrigh) und „Out of Range - Hi" (Außerhalb des Messbereichs – Hoch) angezeigt.

Proben mit Hämatokritwerten unter 20 % oder über 55 % werden aufgrund der optischen Dichte außerhalb des Erkennungsbereichs des Gerätes nicht empfohlen.

Eine mangelhafte Verfahrenstechnik bei der Blutentnahme und dem Übertragen des Bluts in den Probenschacht kann die Ergebnisse des Hemochron Jr. PT-Tests beeinträchtigen. Die Qualität der Blutprobe kann folgendermaßen beeinflusst werden:

– Schäumen oder Hämolyse der Probe
– Geronnenes oder teilweise geronnenes Blut
– Unerwartete Antikoagulation

Studienergebnissen zufolge kann es bei Patienten mit Anti-Phospholipid-Antikörpern oder Anti-Phospholipid-Syndrom zu Beeinträchtigungen kommen.[3,4,5]

Wie bei allen diagnostischen Tests müssen Testergebnisse des Hemochron Jr. hinsichtlich des Befindens und der Antikoagulantientherapie jedes Patienten beurteilt werden. Testergebnisse, die nicht mit dem klinischen Zustand des Patienten übereinstimmen, sollten wiederholt oder durch zusätzliche Testdaten ergänzt werden.

LEISTUNGSMERKMALE

Normaler Messbereich

Bei Tests an freiwilligen Spendern mit Hemochron Jr. Systemen wurden INR Werte von 1,3 oder weniger verzeichnet. Das zugehörige Plasmaäquivalent ist:

	Jr. (ISI=2,0)	Signature/Jr. II (ISI=1,0)
INR=1,3	13,6 Sek.	17,8 Sek.

In einer unabhängigen Evaluation von 36 gesunden freiwilligen Spendern wurde der folgende INR-Bereich festgelegt:

	Jr.	Signature/Jr. II
INR Bereich	1,0–1,4	0,80–1,4

HINWEIS: *Der errechnete Normalwert ist nur für das verwendete ISI Thromboplastin-Reagens gültig. In jeder Einrichtung sollte basierend auf der Patientenpopulation ein einrichtungsspezifischer, normaler Messbereich und ein Zielbereich für die Antikoagulantientherapie festgelegt werden.*

Vollblut PT-Werte von weniger als 15-Sekunden (Hemochron Jr.) oder INR Werte von 0,5 (Hemochron Jr. II und Hemochron Jr. Signature) zeigen eine überhöhte Koagulationsaktivität des Blutes an, möglicherweise aufgrund von Probeentnahmen oder -verarbeitung; der Vorgang sollte deshalb wiederholt werden. Das Thromboplastin-Reagens des Hemochron-Jr. PT ist ein höchst sensibles Reagens mit-niedrigem ISI. Daraus resultiert eine optimale Empfindlichkeit auf Vitamin-K-abhängige Gerinnungsfaktoren. Der INR zeigt am Ende der Untersuchung an, inwieweit die Gerinnungsfaktoren durch die orale Antikoagulantientherapie zurückgegangen sind. Die Plasma PT-Ergebnisse auf dem Hemochron Jr. Modell basieren auf einem Wert, der einem Laborreagens ISI von 2,0 entspricht. Die Plasma PT-Ergebnisse auf den Hemochron Jr. II und Hemochron Jr. Signature Modellen basieren auf einem Wert, der einem Laborreagens ISI von 1,0 entspricht. Andere PT-Plasma-Systeme zeigen andere normale Bereiche und Antikoagulantien-Empfindlichkeit. Plasma-PT Werte, die dem Thromboplastin mit ISI 1,0-und 2,0 entsprechen, werden in Fig. 6 dargestellt.

Empfindlichkeit und Spezifizierung des Hemochron Jr. PT Tests (Fig. 1, 2 und 3)

Der Hemochron Jr. PT-Test wurde mit Hilfe eines Standard-Vollblutpräparats getestet, das mit einer geringeren Konzentration von normalem Mischplasma und einer erhöhten Konzentration von Mischplasma mit geringem Gehalt an Vitamin-K-abhängigen Gerinnungsfaktoren (Faktoren II, V, VII, IX und X) präpariert wurde. Das Hemochron Jr. PT wurde mit einem Labor-Plasma-PT korreliert, indem ein Standard Thromboplastin Reagens (Dade, Baxter Healthcare Corporation, Dade Division, Miami, FL) und Electra 900 (IL, Lexington, MA) verwendet wurde. Zusätzlich zur PT Reagens-Empfindlichkeit ergeben verschiedene Gerinnungserkennungsmethoden verschiedene Gerinnungsfaktorempfindlichkeiten.

Zusammenfassung der Empfindlichkeit (Fig. 4)

Das Hemochron Jr. Gerät und die Vollblut PT Testküvette wurden gegenüber einer Standard-Plasmaprobe im Labor getestet, um die Empfindlichkeit des Vollbluttests gegenüber dieser Standard-Plasmaprobe zu untersuchen. Die im Plasmatest verwendeten Substrate waren Proben mit verminderter Konzentration des Vitamin-K-Gerinnungsfaktors. Die Empfindlichkeit von spezifischem faktorabhängigen Plasma wurde ebenfalls getestet. PT Ergebnisse dieser Plasmaproben wurden zuerst unter Verwendung eines Electra 900 (IL, Lexington, MA) mit handelsüblichen Reagenzien (Dade Thromboplastin, Baxter Healthcare Corp., Dade Division, Miami, FL) bestimmt. Nach diesem Assay wurde den Vollblutproben eine ausreichende Menge roter Blutkörperchen beigefügt und im Hemochron JR. Gerät mit der PT Küvette getestet. Die Ergebnisse der Plasma- und Vollblutests wurden statistischen Analysen unterzogen. Alle Vergleiche wiesen erhebliche Korrelationen auf.

Klinische Relevanz (Fig. 5)

Der Hemochron Jr. PT Test wurde in drei Kliniken mit ambulanter Thromboseklinik an Patienten (n=108) durchgeführt, welche routinemäßig durch Plasma PT (durch Venenpunktion) überwacht wurden. Jede Klinik hatte eine eigene Reagens-Geräte-Kombination und entnahm die Proben mit verschiedenen Natriumzitratkonzentrationen. Patienten- und Labordaten wurden in allen Einrichtungen durch Teilproben-Ausführung erhalten. Eine Probe des Vollblutes, das durch Venenpunktur entnommen wurde, wurde mit Hilfe von Hemochron Jr. und Hemochron Jr. Signature untersucht. Der Rest wurde mit Natriumzitrat vermischt und zur Verarbeitung ins Labor geschickt. Alle Tests wurden doppelt ausgeführt und die Ergebnisse wurden aufgezeichnet und verglichen. In Fig. 5 sind die Hemochron Jr. INR-Ergebnisse (venös) im Vergleich zur Labor-Plasma-INR-Untersuchung aufgezeichnet.

Vergleich von Blutentnahmemethoden

In einer separaten Analyse (n=50) wurden Beeinträchtigungen durch Blutentnahmemethoden untersucht. Die Vollblut-PT-Ergebnisse der Fingerstichprobe (kapillar) wurden mit den Ergebnissen der Venenpunktionsproben verglichen. Die Testergebnisse waren äquivalent (r=0,95).

Zusammenfassung der klinischen Relevanz

Jede venöse Blutprobe wurde aufgeteilt, ein Tropfen Blut wurde mit dem Hemochron Jr. Instrument getestet, während der Rest der Probe mit Natriumzitrat behandelt und für die Verarbeitung und das Messen von Plasma ins Labor geschickt wurde. Dadurch konnte eine Fingerstichprobe von Kapillarblut erhalten und in einer neuen PT-Testküvette untersucht werden. Die PT-Testresultate wurden verglichen. Das Plasma PT korrelierte mit dem Vollblut PT (venös) (r=0,91). Das Plasma PT wurde mit der Fingerstich PT (kapillar) (r=0,88) verglichen und Entnahmemethoden (venös oder kapillar) wurden verglichen (r=0,95). Alle Korrelationen waren von großer Bedeutung, da sie die Unabhängigkeit von Blutentnahmemethoden demonstrierten.

INR - Plasma-Äquivalent Umrechnungstabellen (Fig. 6)

Jedes Gerät zeigt das PT-Ergebnis als INR und Plasma-äquivalente PT in Sekunden an. Typische Umrechnungs-tabellen sind in Fig. 6 enthalten. Die Geräteserie verwendet unterschiedliche Berechnungen, um diese Werte aus dem Vollblut-Ergebnis laut Fig. 6 zu erhalten.

Typische Hemochron Jr. Umrechnungstabelle

Basierend auf einer linearen Regressionsanalyse von gepaarten Testergebnissen von Vollblut Hemochron Jr. PT und Plasma PT (Sekunden) erfolgte die Errechnung eines Vollblut-zu-Plasma-Umrechnungsquotienten für Hemochron Jr. II und Hemochron Jr. Signature Modelle. Die in den Hemochron Jr. II und Hemochron Jr. Signature Geräten gespeicherten Umrechnungsdaten basieren auf einem vergleichbaren, auf Plasma basierenden Thromboplastinwert von ISI = 1,0. Diese Umrechnung basiert auf Vergleichsdaten, die aus mehreren
Kliniken stammen.

HINWEIS: *Plasma PT Ergebnisse sind für Reagens und Testgeräte spezifisch. Die Plasma PT-Umrechnung basiert auf Vergleichsdaten und hängt von den Beschränkungen der Plasmaprobe ab.*

Die klinisch unbedeutenden Unterschiede in der Umrechnungstabelle von Vollblut-Ergebnissen zur INR sind auf die Berrechnungsmethoden der verschiedenen Geräte zurückzuführen.

HINWEIS: *Die Hemochron Jr. II und Hemochron-Jr. Signature Modelle zeigen Plasma

Prothrombin Time
Tempo de protrombina (PT)
Foglietto illustrativo
Italiano / Italian

USO PREVISTO
Hemochron®-Jr. PT è un test di microcoagulazione unificato, a passaggio unico per la determinazione quantitativa del tempo di protrombina.

Il test PT può essere effettuato su ogni modello Hemochron Jr. utilizzando un campione di sangue fresco intero. Ogni strumento è portatile e può essere utilizzato nel luogo di ricovero. La strumentazione non è adatta all'uso domestico.

Per uso diagnostico *in vitro*.

SOMMARIO E SPIEGAZIONE
Il test Hemochron Jr. PT è un test della via estrinseca della coagulazione. I sistemi di test su sangue intero eliminano molte delle variabili note per influenzare l'affidabilità dell'analisi PT del plasma, compreso trattamento e processo dei campioni. Non essendo necessario alcun processo dei campioni risultati PT possono essere ottenuti in meno di due minuti.[2]

L'analisi presso il letto del paziente è particolarmente utile in procedure ed interventi terapeutici che richiedono il monitoraggio degli anticoagulanti orali e la valutazione dell'emostasi prima e dopo trasfusioni di sangue.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
Gli strumenti Hemochron Jr. utilizzano un meccanismo di coagulazione endpoint meccanico in cui la formazione del coagulo avviene all'interno della cuvetta monouso PT. Successivamente all'introduzione del campione di sangue intero, lo strumento misura con precisione 15 microlitri di sangue e li invia automaticamente nel canale di test della cuvetta PT. La rimanenza del campione di sangue, non necessario per il test, viene automaticamente inviata al canale di scarto della cuvetta. Anche la miscelazione del campione/reagente e l'avvio del test avvengono in modo automatico, senza necessità di intervento da parte dell'operatore. Dopo la miscelazione con il reagente, il campione viene mosso avanti e indietro all'interno del canale di test, sorvegliando la formazione del coagulo.

Il meccanismo di rilevazione del coagulo consiste in una serie di rilevatori ottici LED allineati con il canale di test della cuvetta. La velocità con cui il campione di sangue si muove fra i rilevatori viene misurata. Quando ha inizio la formazione del coagulo, il flusso del sangue viene ostacolato ed il movimento rallentato. Lo strumento rileva che è stato raggiunto un endpoint della coagulazione nel momento in cui il movimento del sangue scende al di sotto del limite prestabilito. Lo strumento riporta i numeri del sangue intero matematicamente convertiti in Rapporto internazionale normalizzato (INR) e valori plasmatici equivalenti. Il tempo di coagulazione PT del sangue intero può essere ottenuto premendo e mantenendo premuto il tasto **START**.

REAGENTI
Ogni confezione di test in cuvetta PT contiene:

- 45 confezioni, ognuna delle quali contiene un test in cuvetta Hemochron Jr. PT ed un essiccante

Il test in cuvetta PT è una camera di test completa, monouso, precaricata con un preparato secco di tromboplastina, stabilizzanti e tamponi. Ogni cuvetta è confezionata individualmente in un involucro. Sugli involucri delle cuvette è stampata la data di scadenza specifica del lotto.

ATTENZIONE: *tutte le cuvette utilizzate devono essere considerate potenzialmente infettive, pertanto vanno maneggiate con cura ed eliminate in conformità alle normative per l'eliminazione dei rifiuti medici.*

PRECAUZIONI NELL'ESECUZIONE
NON utilizzare cuvette dopo la data di scadenza indicata sulla confezione o che sono state conservate inadeguatamente.

NON introdurre a forza una cuvetta nello strumento. Se durante l'inserimento si incontra resistenza, rimuovere delicatamente la cuvetta ed esaminare lo scomparto. Rimuovere ogni ostruzione prima di tentare di riutilizzare lo strumento (vedi funzionamento e manutenzione nel manuale utente Hemochron Jr.).

CONSERVAZIONE E STABILITÀ
Se conservate in frigorifero (2–8°C) le cuvette PT confezionate rimangono stabili fino alla data di scadenza indicata. Le cuvette confezionate, integre, possono essere conservate a temperatura ambiente (15–30°C). Non esporre le cuvette PT a temperature superiori a 37 °C.

NOTA: *le cuvette possono essere conservate a temperatura ambiente per max. 12 settimane, ma non devono essere utilizzate dopo la data di scadenza riportata. Occorre indicare la data di inizio della conservazione a temperatura ambiente, completando la sezione sulle informazioni relative alla conservazione della tabella "Performance Verified" (Performance controllata) apposta sul lato di ogni scatola di cuvette. La confezione aperta, con il lato aperto adeguatamente ripiegato è stabile per sette giorni se conservata in frigorifero. Per una durata ottimale, si raccomanda di aprire l'involucro della cuvetta immediatamente prima dell'uso.*

ISTRUZIONI PER L'USO
Prima di effettuare qualsiasi analisi, l'utente dovrà fare riferimento al rispettivo manuale utente di Hemochron Jr. per le istruzioni dettagliate sull'utilizzo.

Lo strumento si avvia inserendo una cuvetta in esso, lasciandolo riscaldare, introducendo un campione di sangue intero e premendo il tasto **START**. La misurazione del campione, la miscelazione campione/reagente, l'avvio del test e il rilevamento del coagulo avverranno automaticamente.

Materiale fornito
– Test in cuvette precaricate Hemochron Jr. PT

Materiale necessario ma non fornito
– Hemochron Jr., Hemochron- Jr. II o Hemochron-Jr. Signature

– siringhe in plastica da 1 o 3 mL con ago misura 21 o 23 (per il campionamento)

– Lancetta, tampone con alcool, garza (per il prelievo da polpastrello)

RACCOLTA E TRATTAMENTO DEL CAMPIONE
Per il prelievo del campione di sangue seguire le direttive della struttura clinica e quelle NCCLS (H21-A3 e H47-A) sulla raccolta di campioni per il test di coagulazione.

Non prelevare campioni di sangue fresco utilizzando provette per la raccolta di sangue in vetro.

Non prelevare sangue attraverso la via di accesso eparinizzata, il tappo o il sistema impiantato.

Se il prelievo avviene attraverso aghi cannula impiantati, lavare accuratamente l'accesso seguendo le procedure utilizzate nella struttura clinica.

1. Prelevare 0,2 mL di sangue con la siringa o con la lancetta.
2. Inserire immediatamente una goccia di sangue nel pozzetto di analisi della cuvetta, iniziando il riempimento dal fondo del pozzetto. Ciò può essere effettuato con o senza ago. Occorre aggiungere una quantità sufficiente di sangue direttamente al pozzetto centrale per riempirlo. Se una grande goccia di sangue dovesse espandersi oltre il pozzetto centrale, spingerla nel pozzetto esterno.
3. Premere il tasto **START**.

CONTROLLO QUALITÀ (CQ)
Test e rilevamenti routinari di controllo qualità devono essere inseriti nel programma completo di garanzia della qualità. I prodotti per il controllo qualità Hemochron Jr. sono disponibili per effettuare un controllo qualità conveniente e accessibile.

CQ giornaliero dello strumento
Per Hemochron Jr. deve essere effettuato un controllo di qualità a due livelli ogni 8 ore di funzionamento. Electronic Quality Control è a disposizione per assistere nell'esecuzione del Controllo di Qualità quotidiano e può fornire un controllo dello strumento a due livelli. Per istruzioni dettagliate consultare il Manuale per l'operatore per lo specifico strumento Hemochron in uso.

CQ del test in cuvette Hemochron Jr.
Per ogni *lotto* di cuvette Hemochron Jr. PT le prestazioni delle cuvette devono essere convalidate a due livelli di controllo di qualità del liquido:

• Quando si riceve una nuova fornitura, E
• in seguito, una volta ogni 30 giorni di calendario

Una volta convalidate con successo come descritto precedentemente, le cuvette non avranno bisogno di nessun altro controllo di qualità del liquido a meno che non si sospetti una variazione dei risultati clinici.

La convalida delle prestazioni può essere effettuata usando gli appropriati prodotti per il controllo di qualità della microcoagulazione di sangue intero Hemochron Jr. Le relative informazioni sulle gamme di prestazioni accettabili e su come applicarle alle cuvette da test PT sono incluse in ogni kit del prodotto di controllo qualità.

LIMITI
Per gli strumenti Hemochron Jr. non vengono riportati valori di sangue intero in secondi inferiori a 15 o superiori a 170. Vengono invece visualizzati rispettivamente valori equivalenti (PT-P) di "PT<10,4 sec, Repeat" o "PT - P>80 sec".

Per Hemochron Jr. II o Hemochron Jr. Signature, i valori INR compresi fra 0,5 e 0,8 e fra 10 e 12, vengono visualizzati rispettivamente come "INR<0.8" o >"INR>10". Valori INR inferiori a 0,5 o superiori a 12 vengono visualizzati rispettivamente come "Out of range –Lo" e (Fuori limite – Lo) "Out of range – Hi" (Fuori limite – Hi).

Campioni con ematocrito inferiore al 20 % o superiore al 55 % non sono consigliati a causa della densità ottica esterna al livello di rilevamento degli strumenti.

Il test Hemochron Jr. PT è suscettibile a tecniche poco precise, compreso prelievo del sangue e trasferimento nel pozzetto del campione. La qualità del campione di sangue può essere influenzata da:

– Formazione di schiuma o emolisi del campione
– Sangue coagulato o parzialmente coagulato
– Anticoagulazione non sospettata

Gli studi indicano che potrebbero verificarsi delle interferenze nei pazienti con anticorpi antifosfolipidici o affetti da sindrome antifosfolipidica.[3,4,5]

Come per tutti i test diagnostici, i risultati ottenuti con il test Hemochron Jr. dovranno essere esaminati alla luce delle condizioni specifiche del paziente e della terapia anticoagulante utilizzata. Qualsiasi risultato che riveli incompatibilità con lo stato clinico del paziente dovrà essere ripetuto o integrato con i risultati di analisi aggiuntive.

CARATTERISTICHE DI PERFORMANCE
Ambito normale
Donatori normali volontari testati su sistemi Hemochron Jr. in genere producono valori INR pari a 1,3 o inferiori. L'equivalente plasmatico associato è :

	Jr. (ISI=2,0)	Signature/Jr. II (ISI=1.0)
INR=1,3	13,6 sec.	17,8 sec.

In una valutazione indipendente di 36 donatori volontari, sani, l'ambito INR determinato è stato :

	Jr.	Signature/Jr. II
ambito INR	1,0–1,4	0,80–1,4

NOTA: *il valore normale stabilito era specifico per l'ISI del reagente tromboplastinico utilizzato. Ogni struttura clinica deve stabilire il proprio ambito normale e target in relazione alla terapia anticoagulativa, in base alla propria popolazione di pazienti.*

Valori PT di sangue intero inferiori a 15 secondi (Hemochron Jr.) o valori INR 0,5 (Hemochron Jr. II e Hemochron Jr. Signature) indicano un'eccessiva attività di coagulazione del sangue, eventualmente a causa della contaminazione del campione successiva al prelievo o al trattamento e devono essere ripetuti. Il reagente tromboplastinico di Hemochron Jr. PT è un reagente altamente sensibile con ISI basso, che consente una sensibilità ottimale in relazione ai fattori di coagulazione vitamina K dipendenti. L'INR visualizzato al termine dell'analisi è indicativo per il grado di riduzione dei fattori di coagulazione in presenza di terapia anticoagulante. I risultati del PT plasmatico visualizzati sul modello Hemochron Jr. si basano su un valore corrispondente ad un ISI del reagente di laboratorio pari a 2,0. I risultati del PT plasmatici visualizzati da Hemochron Jr. II e Hemochron Jr. Signature si basano su valori corrispondenti ad un ISI del reagente di laboratorio di 1,0. Diversi sistemi del PT plasmatico evidenziano differenti ambiti normali e sensibilità all'anticoagulante. Valori plasmatici corrispondenti alla tromboplastina con ISI 1,0 e 2,0 come mostrato in Fig. 6.

Sensibilità e specificità del test Hemochron Jr. PT (Fig. 1, 2 e 3)
Il test Hemochron Jr. PT è stato testato con un preparato di sangue intero standard, preparato con concentrazioni ridotte di plasma proveniente da diversi donatori e concentrazioni crescenti di plasma proveniente da diversi donatori carenti dei fattori di coagulazione vitamina K dipendenti (fattore II, V, VII, IX e X). Il test Hemochron Jr. PT è stato confrontato con un PT plasmatico di laboratorio, utilizzando un reagente tromboplastinico standard (Dade, Baxter Healthcare Corporation, Dade Division, Miami, FL) e Electra 900 (IL, Lexington, MA). Oltre alla sensibilità del reagente PT, diversi metodi di rilevamento del coagulo hanno diversa sensibilità al fattore coagulante.

Sommario della sensibilità (Fig. 4)
Lo strumento Hemochron Jr. e il test in cuvetta PT su sangue intero sono stati testati contro un'analisi di laboratorio del plasma standard, per valutare la sensibilità del test effettuato con sangue intero in relazione all'analisi del plasma standard. Nel test del plasma sono stati utilizzati substrati formati da campioni con concentrazione ridotta del fattore di coagulazione vitamina K dipendente. È stata inoltre testata la sensibilità del plasma deficiente del fattore specifico. I risultati PT dei campioni plasmatici sono stati determinati utilizzando Electra 900 (IL, Lexington, MA) con reagenti commerciali (Dade Thromboplastin, Baxter Healthcare Corp., Dade Division, Miami, FL). Successivamente a quest'analisi è stato aggiunto un quantitativo adeguato di emazie ed il campione di sangue intero è stato analizzato sullo strumento Hemochron Jr. con cuvetta PT. I risultati dei test su sangue intero e su plasma sono stati sottoposti ad analisi statistica. Tutte le comparazioni hanno evidenziato correlazione significativa.

Rilevanza clinica (Fig. 5)
Il test Hemochron Jr. PT è stato valutato in ospedale in tre casi clinici di trombosi in pazienti esterni (n=108), che sono stati monitorati routinariamente in relazione al PT plasmatico (ottenuto per puntura di vena). Ogni ospedale aveva una combinazione strumenti-reagenti unica, il sangue intero è stato prelevato con diverse concentrazioni di citrato di sodio. I dati dei pazienti e di laboratorio sono stati ottenuti utilizzando una configurazione di campioni frazionati. Un campione di sangue ottenutoattraverso puntura di vena è stato analizzato su Hemochron Jr. e su Hemochron Jr. Signature. La rimanenza è stata miscelata con citrato di sodio ed inviata al laboratorio per l'analisi. Tutti i test sono stati effettuati in doppio ed i risultati sono stati registrati e confrontati. Fig. 5 rappresenta il confronto fra i risultati Hemochron Jr. INR (da venaj e quelli dell'analisi di laboratorio del INR plasmatico.

Confronto fra metodi di prelievo del sangue
In un'analisi separata (n=50) è stata analizzata l'influenza del metodo di prelievo del sangue. I risultati del PT di sangue intero ottenuti attraverso puntura del polpastrello (sangue capillare) sono stati comparati a quelli del campione ottenuto attraverso puntura di vena. I risultati dei test erano equivalenti (r=0,95).

Sommario dei dati clinicamente rilevanti
Ogni campione di sangue venoso è stato frazionato; una goccia di sangue è stata analizzata su Hemochron Jr. mentre il resto del campione è stato trattato con citrato di sodio ed inviato al laboratorio per essere processato e per la misurazione del PT plasmatico. Successivamente, un campine di sangue capillare, ottenuto attraverso puntura del polpastrello, è stato utilizzato in una nuova cuvetta PT. I risultati dei test PT sono stati comparati. Il PT plasmatico è stato correlato al PT di sangue intero (venoso) (r=0,91); il PT plasmatico è stato comparato al PT del sangue ottenuto da polpastrello (capillare) (r=0,88) ed i metodi di prelievo (venoso e capillare) sono stati confrontati (r=0,95). Tutte le correlazioni sono state altamente significative, dimostrando la non influenza della tecnica di prelievo del sangue.

Grafici di conversione INR – equivalente plasmatico (Fig. 6)
Ogni strumento visualizza il risultato PT come INR ed equivalente PT plasmatico espressi in secondi. Pagina 6 contiene la rappresentazione di grafici della conversione. La serie di strumenti utilizza diversi calcoli per ottenere questi valori dai risultati ottenuti da sangue intero come descritto in Fig. 6.

Grafico rappresentativo della conversione di Hemochron Jr.
Sulla base dei risultati dell'analisi di regressione lineare di test accoppiati di Hemochron Jr. PT di sangue intero e PT plasmatico (secondi) è stata generata un'equazione di conversione da sangue intero in equivalenti plasmatici per Hemochron Jr. La conversione plasmatica programmata nello strumento Hemochron Jr. si basa su tromboplastina con ISI=2,0 plasmatica, comparativa. Il valore INR è stato derivato dai valori PT plasmatici. Questa conversione si basa su dati comparativi ottenuti in diverse strutture cliniche.

Grafico rappresentativo della conversione di Hemochron Jr. II e Hemochron

Sulla base dei risultati dell'analisi di regressione lineare di test accoppiati, utilizzando Hemochron Jr. PT da sangue intero e il PT plasmatico (INR) è stata generata un'equazione di conversione da sangue intero in INR per i modelli Hemochron Jr. II e Hemochron Jr. Signature. La conversione plasmatica programmata negli strumenti Hemochron Jr. II e Hemochron Jr. Signature si basa su tromboplastina plasmatica con ISI=1,0 comparativa. Questa conversione si basa su dati comparativi ottenuti in diverse strutture cliniche.

NOTA: *i risultati PT plasmatici sono specifici per reagente e strumento di analisi. La conversione del PT plasmatico si basa su dati comparativi ed è dipendente dai limiti dell'analisi del plasma.*

Le differenze clinicamente non significative osservate nella tabella di conversione dei risultati da sangue intero in INR possono essere attribuite ai metodi di calcolo utilizzati dal rispettivo dispositivo.

NOTA: *i modelli Hemochron Jr. II e Hemochron Jr. Signature visualizzano valori plasmatici equivalenti sulla base di tromboplastina plasmatica con ISI=1,0, comparativa. Modelli precedenti di Hemochron Jr. visualizzano valori plasmatici equivalenti sulla base di tromboplastina plasmatica con ISI=2,0 comparativa. Le strutture cliniche potranno sviluppare le proprie conversioni personalizzate attraverso l'esecuzione di uno studio comparativo fra PT di sangue intero e PT plasmatico.*

Fig. 6 Note:

1a. Per Hemochron Jr.: quando si effettua un test, vengono riportati un risultato relativo al sangue intero ed un equivalente plasmatico calcolato. L'INR viene calcolato attraverso il valore plasmatico equivalente e il valore ISI del reagente.

1b. Per Hemochron Jr. II e Hemochron Jr. Signature: quando si effettua un test, vengono riportati un risultato relativo al sangue intero ed un INR calcolato. Il risultato equivalente plasmatico viene calcolato attraverso l'INR e il valore ISI del reagente.

2. Il grafico di conversione mostrato è specifico per il PT plasmatico ottenuto utilizzando un reagente PT. La conversione per ISI=2,0 è stata ottenuta utilizzando Dade Thromboplastin C plus (Baxter Healthcare Corp. Dade Division, Miami, FL) ed uno strumento Electra 900 (IL, Lexington, MA). A causa della variabilità dei reagenti e degli strumenti di controllo, diversi sistemi di analisi produranno diverse conversioni. Al fine di ottenere risultati ottimali, le strutture cliniche dovranno stabilire i propri ambiti di performance e i propri grafici di conversione per il reagente specifico utilizzato nel laboratorio clinico. Una simile conversione può poi essere utilizzata in sostituzione della conversione plasmatica visualizzata dagli strumenti. Le strutture che intendono effettuare conversioni personalizzate devono considerare che la conversione da sangue intero in plasma è rilevante unicamente se si utilizza una combinazione standard di reagente tromboplastinico e strumento. Modifiche dei componenti necessitano di una rivalutazione della correlazione.

3. Il tempo di coagulazione del sangue intero Hemochron Jr. viene misurato internamente al decimo di secondo più vicino ed arrotondato al numero intero più vicino per la visualizzazione. Questa procedura di arrotondamento può risultare in leggere differenze fra il valore visualizzato dallo strumento ed il valore indicato nella tabella di conversione.

PRECISIONE
Studi in-house sulla precisione
La precisione di Hemochron Jr. è stata valutata effettuando molteplici analisi PT utilizzando controlli di sangue intero normali ed anomali. Le analisi sono state effettuate in tre giorni diversi, utilizzando fino a tre strumenti con i seguenti risultati. I valori di precisione Hemochron Jr. sono espressi in INR.

	N	Media	SD
Normale	45	2,3	0,27
Anomalo	45	8,9	0,43

La ripetizione dei test su uno strumento singolo per tre giorni consecutivi ha prodotto la seguente precisione:

	N	Media	SD
Normale	15	2,3	0,28
Anomalo	15	9,1	0,34

Test ripetuti su uno strumento singolo hanno prodotto i seguenti risultati giorno per giorno:

	Normale			Anomalo	
	N	Media	SD	Media	SD
Giorno 1	5	2,1	0,23	8,9	0,37
Giorno 2	5	2,3	0,18	9,0	0,15
Giorno 3	5	2,3	0,39	9,5	0,24

Sommario della precisione
Quattro strumenti Hemochron Jr. sono stati sottoposti a test sulla precisione con due livelli di controlli di sangue intero, normali e anomali. Gli strumenti sono stati controllati ripetutamente in un unico giorno, al fine di stabilire le variabili previste sugli strumenti. Gli strumenti sono inoltre stati testati con un controllo di sangue intero per cinque giorni consecutivi al fine di stabilire le variabili previste giorno per giorno. E' stata evidenziata una variabilità relativa agli strumenti compresa nel 10 % per entrambi i livelli di controllo di sangue intero.

International Normalized Ratio (Rapporto internazionale normalizzato)
L'ambito terapeutico della terapia anticoagulante orale tradizionalmente viene espresso come rapporto del PT del paziente in relazione al PT (ambito normale del centro). Al fine di valutare la natura procoagulante variabile di tromboplastine diverse, il Consiglio Internazionale per la Standardizzazione in Ematologia e la Commissione Scientifica e standardizzata della Società Internazionale per le Trombosi e l'Emostasi hanno proposto che ciascun produttore di tromboplastine identifichi l'efficacia del proprio preparato confrontandola con il valore di riferimento stabilito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Tali comparazioni si applicano all'assegnazione di un valore (ISI) per il reagente. L'ISI può essere utilizzato per convertire i rapporti dei pazienti in Rapporto internazionale normalizzato (INR).

Hemochron Jr. converte automaticamente il risultato del PT di sangue intero nel corrispondente equivalente plasmatico e nel rispettivo INR. L'equazione per la conversione del tempo di coagulazione del sangue intero in tempo plasmatico equivalente si basa su un'analisi di regressione da dati ottenuti in diverse strutture cliniche. Le equazioni per l'equivalente plasmatico programmate in Hemochron Jr. si basano su dati clinici che utilizzano un reagente con ISI di 2,0 (Dade, Thromboplastin C plus, Baxter Healthcare Corp., Dade Division, Miami, FL) ed uno strumento automatizzato di coagulazione del plasma (Electra 900, IL, Lexington, MA).

L'INR riportato deve essere indipendente dal riferimento plasmatico utilizzato ed è stato correlato al sistema utilizzando un ISI di 1,0. Relazioni recenti hanno evidenziato la persistenza di incoerenze fra i sistemi di test INR.[1] Le istituzioni cliniche possono stabilire il proprio ambito target di anticoagulazione terapeutica sulla base della loro popolazione di pazienti e dei sistemi di analisi INR del laboratorio.

I modelli Hemochron Jr. II e Hemochron Jr. Signature convertono automaticamente il risultato del PT di sangue intero nel corrispondente INR e nel valore plasmatico equivalente. L'equazione per la conversione del tempo di coagulazione del sangue intero in INR si basa su un'analisi di regressione da dati ottenuti in diverse strutture cliniche. I sistemi di laboratorio utilizzati nelle strutture cliniche comprendono un MDA 180 con Simplastin® (Organon Teknika, Durham, NC), IL 1000 (IL, Lexington, MA) con Dade C+ (Dade, Miami, FL) e un Coagamate (IL, Lexington, MA) con Simplastin® (Organon Teknika, Durham, NC). L'equazione INR programmata in Hemochron Jr. II e Hemochron Jr. Signature si basa su dati clinici che utilizzano un reagente con ISI di 1,0 (Recombiplastin [IL, Lexington, MA] ed uno strumento di coagulazione del plasma automatizzato (IL, Lexington, MA).

Prothrombin Time
Tempo de Protrombina (PT)
Folheto Informativo
Português / Portuguese

FIM A QUE SE DESTINA
Hemochron®-Jr. PT é um teste de microcoagulação unitário cuja utilização se destina a realização de um tempo de protrombina quantitativo, de uma só fase.

O teste PT é realizado em qualquer modelo Hemochron Jr. com uma amostra de sangue total fresco. Cada instrumento é portátil e destina-se a ser utilizado à cabeceira. O instrumento não se destina a utilização doméstica.

Para Utilização em Diagnóstico *in vitro*

RESUMO E EXPLICAÇÃO
O Hemochron Jr. PT é um teste da cascata da coagulação extrínseca. Os sistemas de teste do sangue total eliminam muitas das variáveis que se sabe afectarem o nível de fiabilidade dos testes PT de plasma, incluindo a colheita da amostra, o manuseamento e o processamento. Uma vez que não é necessário o processamento da amostra, os resultados PT são obtidos em menos de dois minutos.[2]

Os testes realizados à cabeceira são especialmente valiosos durante os procedimentos e intervenções terapêuticas que exigem uma monitorização dos anticoagulantes orais bem como são valiosos para a avaliação da hemostase antes ou depois das transfusões de sangue.

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
Os instrumentos Hemochron Jr. utilizam um mecanismo mecânico de coagulação de ponto final, no-qual ocorre o teste, dentro da cuvete PT descartável. A seguir à introdução da amostra de sangue total, o instrumento mede precisamente 15 microlitros de sangue e transfere-os automaticamente para o canal de-teste, dentro da cuvete de PT. A amostra de sangue restante, que não é necessária para a realização do teste, é automaticamente introduzida no canal de resíduos da cuvete. A homogeneização da amostra/reagente e o início do teste são também realizados automaticamente e não necessitam da intervenção do operador. Após a homogeneização com o reagente, a amostra é agitada para a frente e para trás dentro do canal de teste e é-monitorizada quanto à formação de coágulos.

O mecanismo de detecção de coágulos consiste numa série de detectores ópticos do tipo LED alinhados com o canal de teste da cuvete. É medida a velocidade a que a amostra de sangue se move entre os detectores. Quando começa a formação de coágulos, o fluxo sanguíneo é dificultado e o movimento abranda. O instrumento reconhece que o ponto final da coagulação foi atingido quando o movimento diminui um nível inferior de a uma taxa predeterminada. O instrumento apresenta o resultado numérico do sangue total convertido matematicamente na Relação Normalizada Internacional (INR) e num valor equivalente de plasma. O tempo de PT do sangue total pode ser apresentado premindo e mantendo premida a tecla **START**.

REAGENTES
Cada caixa de cuvetes de teste de PT contém:

– 45 bolsas, cada uma contendo uma cuvete de teste Hemochron Jr. PT e um dessecante.

A cuvete do teste de PT é constituída por uma câmara de teste descartável autónoma, pré-cheia com uma preparação liofilizada de tromboplastina, estabilizadores e tampões. Cada cuvete é embalada individualmente numa bolsa. As bolsas com as cuvetes têm gravada a data de validade especifica do lote.

PRECAUÇÃO: *Todas as cuvetes de teste usadas devem ser consideradas como potencialmente infecciosas e devem ser manuseadas com cuidado e ser eliminadas de acordo com a política de eliminação de resíduos hospitalares.*

PRECAUÇÕES DE FUNCIONAMENTO
NÃO utilize cuvetes que ultrapassaram a data de validade indicada ou que não tenham sido armazenadas adequadamente.

NÃO force uma cuvete a entrar no instrumento. Se sentir resistência quando tentar inserir a cuvete, retire suavemente a cuvete e examine a ranhura da cuvete. Retire qualquer obstrução antes de voltar a utilizar o instrumento (consulte a secção "Assistência e Manutenção" no Manual do Operador do Hemochron Jr. apropriado).

ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE
Quando guardadas no frigorífico (2–8°C), as cuvetes de PT embaladas permanecem estáveis até à data de validade indicada. O armazenamento à temperatura ambiente (15–30°C) é opcional para as cuvetes embaladas e seladas. As cuvetes de PT não devem ser expostas a temperaturas superiores a 37°C.

NOTA: *Pode atribuir-se uma nova data de validade às cuvetes quando armazenadas à temperatura ambiente, um máximo de 12 semanas, não podendo ultrapassar a data de validade indicada. Esta nova data é necessária caso as armazene à temperatura ambiente, e deve ser indicada preenchendo a secção das informações de armazenamento da tabela "Performance Verified" (desempenho verificado), no face lateral de cada caixa de cuvetes. A bolsa aberta, adequadamente dobrada na extremidade aberta e guardada no frigorífico, é estável durante sete dias. Para um tempo de armazenamento perfeito, é recomendado que a bolsa-da cuvete seja aberta imediatamente antes de-a-utilização.*

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO
Antes de realizar um ensaio, o utilizador deve consultar o-Manual do Operador adequado do Hemochron Jr. para obter instruções de funcionamento detalhadas.

O instrumento é operado inserindo-se uma cuvete no instrumento, permitindo que aqueça, introduzindo uma amostra de sangue total e premindo a tecla **START**. A-medição da amostra, a homogeneização da amostra/reagente, o início do teste e a detecção de coágulos irá então dar-se automaticamente.

Material Fornecido
– Cuvetes de teste Hemochron Jr. PT pré-carregadas

Materiais Necessários mas Não Fornecidos
– Hemochron Jr., Hemochron- Jr. II ou Hemochron-Jr. Signature

– Seringas plásticas de 1 mL ou 3 mL, agulhas calibre 23 ou 21 (para amostragem da seringa)

– lanceta, compressa com álcool, gaze (para amostragem com lanceta)

COLHEITA DA AMOSTRA E MANUSEAMENTO
Para obter uma amostra de sangue, siga as guidelines NCCLS (H21-A3, H47-A) e institucionais, referentes à-obtenção de amostras para a realização de testes de-coagulação.

Não recolha amostras de sangue total fresco utilizando tubos de colheita de sangue de vidro.

Não obtenha sangue a partir de uma tubagem heparinizada nem a partir de um bloqueio interior de heparina.

Quando obtiver amostras através de linhas de sangue interiores, lave muito bem a via de acesso seguindo os-procedimentos institucionais.

1. Obtenha 0,2 cm^3 de sangue com a seringa ou lanceta.
2. Aplique imediatamente um gota de sangue na cavidade da amostra da cuvete de teste; enchendo desde o fundo da cavidade para cima. Isto pode ser realizado com ou sem uma agulha de transferência. Deve ser acrescentada uma quantidade de sangue suficiente directamente na cavidade da amostra central para a encher completamente até ao topo. Caso uma gota grande de sangue atinja o topo da cavidade da amostra central, empurre o sangue em excesso para dentro da cavidade da amostra exterior.
3. Prima a tecla **START**.

CONTROLO DE QUALIDADE (CQ)
Os testes e o seguimento do controlo de qualidade de rotina devem fazer parte de um extenso programa de garantia de qualidade. Os produtos de controlo de qualidade do Hemochron Jr. encontram-se disponíveis para tornarem o CQ de rotina mais conveniente e rentável.

CQ Diário do Instrumento
O Hemochron Jr. deve ser controlado relativamente à qualidade a dois níveis de controlo, uma vez por cada 8 horas de funcionamento. Para ajudar na persecussão do CQ diário, está disponível um Controlo de Qualidade Electrónico, com capacidade para proporcionar uma verificação do instrumento a dois níveis. Para obter instruções detalhadas, consulte o Manual do Operador do Instrumento Hemochron específico.

CQ das Cuvetes de Teste do Hemochron Jr.
Cada *lote* das cuvetes PT Hemochron Jr. deve ser validado relativamente ao seu desempenho com dois níveis de controlo de qualidade líquido:

• Quando é recebida uma nova remessa, E
• Subsequentemente uma vez a cada 30 dias do calendário

Após uma validação do desempenho bem sucedida, como acima, as cuvetes não irão necessitar de qualquer controlo de qualidade líquido adicional, excepto nos casos em que se suspeite de um desvio nos resultados clínicos.

A validação do desempenho pode ser obtida utilizando os produtos de Controlo de Qualidade de Sangue Total para Microcoagulação Hemochron Jr. adequados. Os intervalos de desempenho aceitáveis e a forma de aplicação às cuvetes de teste PT estão incluídos com cada kit de produto de controlo de qualidade.

LIMITAÇÕES
No que se refere ao instrumento Hemochron Jr., não são apresentados os valores secundários de sangue total inferiores a 15 ou superiores a 170. Em vez disso, são apresentados os valores equivalentes de plasma (PT-P) de "PT<10.4 sec, Repeat" ou "PT - P>80 sec", respectivamente.

Para o Hemochron Jr. II ou Hemochron Jr. Signature, os valores do INR entre 0,5 e 0,8 e entre 10 e 12 são apresentados como "INR<0.8" ou "INR>10", respectivamente. Os valores INR inferiores a 0,5 e superiores a 12 são apresentados são a forma de "Out of Range-Lo" (Fora do Limite – Lo) "Out of Range-Hi" (Fora do Limite – Hi), respectivamente. As amostras com um hematócrito inferior a 20 % ou superior a 55-% não são recomendadas devido a uma densidade óptica considerada fora gama de detecção do instrumento.

O Hemochron Jr. PT é afectado por uma técnica deficiente incluindo a colheita de sangue e a transferência de sangue para a cavidade da amostra. A qualidade da amostra de sangue pode ser afectada por:

– Formação de espuma ou hemólise da amostra
– Sangue coagulado ou parcialmente coagulado
– Anticoagulação insuspeita

Os estudos indicam que podem ocorrer interferências em pacientes com anticorpos antifosfolípidos ou com a síndrome antifosfolipídica.[3,4,5]

Tal como com todos os testes de diagnóstico, os resultados dos testes do Hemochron Jr. devem ser examinados minuciosamente à luz do estado do doente específico e da terapia com anticoagulantes utilizada. Quaisquer resultados que apresentem inconsistência com o estado clínico do doente devem ser repetidos ou complementados com dados de teste adicionais.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO
Intervalo Normal
Os dadores voluntários normais testados com os sistemas Hemochron Jr., produziram, geralmente, valores INR de 1,3 ou inferior. O equivalente de plasma associado é:

	Jr. (ISI=2,0)	Signature/Jr. II (ISI=1,0)
INR=1,3	13,6 segs.	17,8 segs.

Numa avaliação independente de 36 dadores voluntários saudáveis, o intervalo INR determinado foi:

	Jr.	Signature/Jr. II
Intervalo INR	1,0–1,4	0,80–1,4

NOTA: *O valor normal estabelecido foi específico para o ISI do reagente de tromboplastina utilizado. Cada instituição deve estabelecer o seu próprio intervalo normal e o intervalo alvo da anticoagulação terapêutica com base na sua população de doentes.*

Os valores de PT do sangue total inferiores a 15 segundos (Hemochron Jr.) ou os valores INR a 0,5 (Hemochron Jr. II e Hemochron Jr. Signature) indicam uma activação de coagulação excessiva no sangue, possivelmente devido à colheita ou ao processamento da amostra e deve ser repetida a colheita. O reagente de tromboplastina do Hemochron Jr. PT é um reagente altamente sensível, de baixo ISI, que fornece uma sensibilidade óptima para os factores de coagulação dependentes da vitamina K. O INR apresentado na conclusão do ensaio é indicativo do nível a que estes factores de coagulação estão reduzidos na presença de terapia com anticoagulantes orais. Os resultados do PT de plasma apresentados pelo modelo Hemochron Jr. baseiam-se num valor que corresponde ao ISI de 2,0 de-um reagente de laboratório. Os resultados do PT de plasma apresentados pelos modelos Hemochron Jr. II e-Hemochron Jr. Signature baseiam-se num valor correspondente ao ISI de 1,0 de um reagente de laboratório. Os diferentes sistemas de PT de plasma apresentam diversos intervalos normais e diversas sensibilidades de anticoagulante. Os valores do PT de-plasma correspondentes à tromboplastina com um ISI de 1,0 e 2,0 são apresentados na Fig. 6.

Sensibilidade e Especificidade do teste Hemochron Jr. PT (Fig. 1, 2 e 3)
O teste Hemochron Jr. PT foi realizado com uma preparação de sangue total padrão que, por sua vez, foi preparada com concentrações decrescentes de pools de plasma normal e concentrações crescentes de pools de plasma deficiente nos factores de coagulação dependentes da vitamina K (Factores II, V, VII, IX e X). O-Hemochron Jr. PT foi correlacionado com o PT de-plasma do laboratório utilizando um reagente padrão de tromboplastina (Dade, Baxter Healthcare Corporation, Dade Division, Miami, FL) e Electra 900 (IL, Lexington, MA). Além da sensibilidade do reagente de PT, existem diversos métodos de detecção de coágulos com diferentes sensibilidades dos factores de coagulação.

Resumo da Sensibilidade (Fig. 4)
O instrumento Hemochron Jr. e a cuvete do teste de PT de sangue total foram testados relativamente a um teste de plasma padrão do laboratório, para determinar a sensibilidade do teste de sangue total em relação a este ensaio de plasma padrão. Os substratos utilizados no teste de plasma eram amostras com