HEMOCHRON® Jr.

Whole Blood Microcoagulation Systems

Citrate Prothrombin Time (PT)

Package Insert

English

For *in vitro* Diagnostic Use

INTENDED USE

The HEMOCHRON® Jr. Citrate PT is a unitized microcoagulation test intended for use in performing a quantitative, one-stage prothrombin time. The Citrate PT test is performed using a citrated venous whole blood sample on the HEMOCHRON Jr. Signature and HEMOCHRON Jr. II microcoagulation instruments only. The instruments are portable and the use of citrated specimens allow testing to be conducted at the point of care or in a satellite or central laboratory. The instruments are not intended for home use.

NOTE: *This HEMOCHRON Jr. Citrate PT is not intended for use with earlier versions of the HEMOCHRON Jr.*

SUMMARY AND EXPLANATION

The HEMOCHRON Jr. Citrate PT, a test of the extrinsic coagulation pathway, is performed using citrated venous whole blood. The use of citrated specimens allows testing to be conducted at the point of care or in a satellite or central laboratory. Whole blood test systems eliminate many of the variables known to affect the reliability of plasma prothrombin time (PT) testing, including specimen handling and processing. Since little specimen processing is required, PT results are obtained in less than five minutes. In addition, because the test is performed using a citrated venous whole blood sample, testing can be performed for up to two hours after sample collection without affecting test results.

Bedside testing is especially valuable during procedures and therapeutic interventions that require monitoring of oral anticoagulants and for hemostasis assessment.

PRINCIPLE OF OPERATION

The HEMOCHRON Jr. instruments utilize a mechanical endpoint clotting mechanism in which clot formation occurs within the disposable Citrate PT cuvette. Following whole blood sample introduction, the instrument precisely measures 15 microliters of blood and automatically moves it into the test channel within the Citrate PT cuvette. The remainder of the blood sample, not needed for testing, is automatically drawn into the waste channel of the cuvette. Sample/reagent mixing and test initiation are also performed automatically, requiring no operator interaction. After mixing with the reagent, the sample is moved back and forth within the test channel and monitored for clot formation.

The clot detection mechanism consists of a series of LED optical detectors aligned with the test channel of the cuvette. The speed at which the blood sample moves between the detectors is measured. As clot formation begins, blood flow is impeded and the movement slows. The instrument recognizes that the clot endpoint has been achieved when the movement decreases below a predetermined rate. The instruments report whole blood numbers mathematically converted to International Normalized Ratio (INR) and plasma equivalent value. The whole blood Citrate PT time may be displayed by depressing and holding the instrument's **START** key.

REAGENTS

Each box of Citrate PT test cuvettes contains:

- 45 pouches, each containing one HEMOCHRON Jr. Citrate PT test cuvette and one desiccant

The Citrate PT test cuvette is a self contained disposable test chamber preloaded with a dried preparation of thromboplastin, calcium salts, stabilizers, and buffers. Each cuvette is individually packaged in a pouch. Cuvette pouches are stamped with a lot specific expiration date.

CAUTION: *All used test cuvettes should be considered as potentially infectious, handled with care and disposed of using standard medical waste disposal policy.*

STORAGE AND STABILITY

When refrigerated (2 - 8°C), the foil pouched Citrate PT cuvettes are stable until the marked expiration date. Room temperature storage (15 - 30°C) is optional for unopened, pouched cuvettes. Citrate PT cuvettes should not be exposed to temperatures in excess of 37°C.

NOTE: *Room temperature re-dating is to a maximum of 12 weeks, but must never exceed the marked expiration date. Re-dating is necessary if stored at room temperature and should be indicated by completing the storage information section of the "Performance Verified" table on the side panel of each cuvette box. For optimal shelf life, it is recommended to open the cuvette pouch immediately before use.*

OPERATING INSTRUCTIONS

Before performing any assay, the user should refer to the HEMOCHRON Jr. II or HEMOCHRON Jr. Signature Operator's Manual for detailed operating instructions.

The instrument is operated by inserting a cuvette into the instrument, allowing it to warm, introducing a whole blood sample and depressing the **START** key. Sample measurement, sample/reagent mixing, test initiation and clot detection will then proceed automatically.

Material Provided

– Preloaded HEMOCHRON Jr. Citrate PT test cuvettes

Material Required, but Not Provided

– HEMOCHRON Jr. II or HEMOCHRON- Jr. Signature only
– Evacuated tube containing sodium citrate (3.8% or 3.2%) and blood collection needle
– 1 mL or 3 mL plastic syringe, 23 or 21 gauge needle (for syringe sampling)

SAMPLE COLLECTION AND HANDLING

To obtain blood specimen, follow institutional and NCCLS(H21-A, H47-A and H03-A) guidelines for obtaining samples for coagulation testing.

NOTE: *Blood samples for testing should be collected at least 5 minutes prior to testing to allow for adequate mixing of the sodium citrate with the sample. Optimal results are obtained when samples are tested withbin one hour, and specimens maintained at room temperature until tested.*

Do not obtain blood from heparinized access line, lock or indwelling heparin lock.

When sampling through indwelling blood lines, flush access port thoroughly following institutional procedures.

1. Collect a 5mL blood sample using either a syringe or an evacuated tube.
2. If a syringe collection system is used, attach a transfer needle to the syringe. Carefully puncture the stopper of an evacuated tube containing sodium citrate (3.8% or 3.2%) and allow blood to be drawn into tube until the flow stops. Mix gently. Discard syringe with transfer needle.
3. Before testing, invert the test tube at least four times to ensure complete mixing of sample.
4. Dispense one drop of citrated blood into the sample well of the test cuvette; filling from the bottom of the well up. This may be done either with or without a transfer needle. A sufficient quantity of blood must be added directly to the center sample well to fill it flush to the top. Should a large drop of blood extend above the center sample well, push it over into the outer sample well.
5. Depress the **START** key.

PERFORMANCE CHARACTERISTICS:

Normal Range

The HEMOCHRON Jr. Microcoagulation Systems were evaluated using fresh citrated whole blood from normal volunteer donors. Results obtained using citrate concentrations of 3.8% (N=155) and 3.2% (N=59) are presented in Table 1.

NOTE: *The normal values shown in Table 1 have been established for the low International Sensitivity Index (ISI) thromboplastin reagent employed in the Citrate PT test (ISI of approximately 1.0). For optimal clinical use, each setting should establish its own normal range and target range of therapeutic anticoagulation based on its patient population.*

Table 1		3.2%	3.8%
INR RESULTS	average	1.1	1.0
	SD	0.2	0.2
	n	59	155
	range (±2 SD)	0.8-1.5	0.8-1.4
WHOLE BLOOD SECONDS	average	23	22
	SD	1.5	1.6
	n	59	155
	range (±2 SD)	20-26	18.8-25.4

Whole blood PT values less than 15 seconds, or INR 0.5 indicate excessive blood coagulation activation, possibly due to specimen collection or processing, and should be repeated. The INR displayed at the conclusion of the assay is indicative of the degree to which these clotting factors are diminished in the presence of oral anticoagulant therapy. The thromboplastin (rabbit brain origin) of the HEMOCHRON Jr. Citrate PT has an ISI of approximately 1.0 which provides optimal sensitivity for Vitamin K dependent clotting factors. The plasma PT results displayed on the HEMOCHRON Jr. II and HEMOCHRON Jr. Signature models are based upon a value which corresponds to a laboratory reagent ISI of 1.0. Different plasma PT reagent systems demonstrate diverse normal ranges and coagulant factor sensitivity. The plasma PT values shown in Table 2 reflect those equivalent values expected using a laboratory reagent of 1.0 ISI.

Sensitivity of the HEMOCHRON Jr. Citrate PT Test to Factor Deficiency

The HEMOCHRON Jr. Citrate PT (single test lot) was tested with a standard whole blood preparation which was prepared with known levels of Vitamin K dependent clotting factors (Factors II, VII, IX, and X), and Factor V. As the combined factor level decreases below 35% the PT value increases above the normal range upper limit (25.8 whole blood secs). The HEMOCHRON Jr. Citrate PT was compared to a laboratory plasma PT using a standard thromboplastin reagent (Dade, Baxter Healthcare Corporation, Dade Division, Miami, FL) and Electra 900 (IL, Lexington, MA), as shown in Fig. 1.

Linearity of Response of the HEMOCHRON Jr. Citrate PT to Coagulant level.

A dilutional study was employed to demonstrate the linearity of the Citrate PT result to the coagulant level. Fig. 2 demonstrates a linearity of response from 1.0 INR to greater than 10 INR. In the graph the INR is 1.56 at 50% coagulant activity, 1.84 at 40% coagulant activity and 2.48 at 30% coagulant activity.

Summary of Sensitiveity and Linearity

The HEMOCHRON Jr. instrument and whole blood Citrate PT test cuvette were tested against a standard laboratory plasma assay to assess the sensitivity of the whole blood test relative to this standard plasma assay. The substrates used in the plasma test were samples with diminishing Vitamin K clotting factor concentration. The results of the plasma and whole blood tests were subjected to statistical analysis. The results showed similar coagulant factor sensitivity for the HEMOCHRON Jr. Citrate PT and the laboratory PT. The linearity of the Citrate PT up to an INR of 10 was established using a standard dilution assay.

Calibration of the HEMOCHRON Jr. Citrate PT to the INR

The Citrate PT was assessed using specimens from one clinical site to establish the conversion of the whole blood PT result to the INR. In this analysis, blood specimens (N=74) were collected from patients receiving oral anticoagulant therapy. One sample of this citrated whole blood specimen was analyzed using the HEMOCHRON Jr. test and a second sample was centrifuged, with the resulting plasma analyzed using an Electra 900 analyzer (IL, Lexington, MA) and Dade Innovin (Dade, Miami, FL) reagent. The result of this analysis was the direct conversion of the whole blood value to the INR as shown in the conversion chart in Table 2.

Clinical Comparison of the HEMOCHRON Jr. Citrate PT and Laboratory PT

The HEMOCHRON Jr. Citrate PT was subjected to clinical validation at four clinical sites. Citrated (3.2%) blood specimens (N=233) were collected from 233 patients receiving oral anticoagulant therapy. The specimens were analyzed using the HEMOCHRON Jr. with a second aliquot analyzed in the laboratory with a plasma based assay using Dade Innovin (Dade, Miami, FL) on an Electra 900 (IL, Lexington, MA) analyzer. Results are shown in Fig. 3.

Summary of Correlation Analysis

The correlation of the Citrate PT and laboratory PT was studied in a split sample design. Each venous blood sample was treated with sodium citrate (3.2%) and tested on the HEMOCHRON Jr. while another citrated sample from the same venipuncture was sent to the lab for processing and plasma PT measurement. An initial calibration study was performed to yield the conversion of citrated whole blood PT result to INR. Subsequent clinical validation demonstrated the high degree of correlation of the HEMOCHRON Jr. Citrate PT to the laboratory.

Representative Conversion Chart

Based on linear regression analysis of paired tests using the citrated whole blood HEMOCHRON Jr. PT and a plasma PT assay with a thromboplastin reagent with an ISI of 1.0, a direct conversion of the whole blood PT (secs) to the laboratory INR was generated. The conversion chart shown is programmed into the HEMOCHRON Jr. instrument. This conversion is based on comparative data obtained from one clinical site and confirmed at three additional clinical sites.

NOTE: *Plasma PT results are specific for reagent and test instrument. The plasma PT conversion is based upon comparative data and dependent upon the limitations of the plasma assay. The INR is calculated directly from the whole blood PT value, based on a regression analysis. The plasma equivalent PT is calculated from the INR based upon an ISI of 1.0. Institutions may refine their own individualized conversion which corresponds to a specific reagent and instrument system through the performance of a whole blood PT and plasma PT comparative study.*

Table 2

Whole Blood (secs)	INR	Plasma (secs)	Whole Blood (secs)	INR	Plasma (secs)	Whole Blood (secs)	INR	Plasma (secs)
22	0.8	8	41	3.1	31	60	5.4	54
23	1.0	10	42	3.2	32	61	5.5	55
24	1.1	11	43	3.4	34	62	5.6	56
25	1.2	12	44	3.5	35	63	5.8	58
26	1.3	13	45	3.6	36	64	5.9	59
27	1.4	14	46	3.7	37	65	6.0	60
28	1.6	16	47	3.8	38	66	6.1	61
29	1.7	17	48	4.0	40	67	6.2	62
30	1.8	18	49	4.1	41	68	6.4	64
31	1.9	19	50	4.2	42	69	6.5	65
32	2.0	20	51	4.3	43	70	6.6	66
33	2.2	22	52	4.4	44	71	6.7	67
34	2.3	23	53	4.6	46	72	6.8	68
35	2.4	24	54	4.7	47	73	7.0	70
36	2.5	25	55	4.8	48			
37	2.6	26	56	4.9	49			
38	2.8	28	57	5.0	50			
39	2.9	29	58	5.2	52			
40	3.0	30	59	5.3	53			

Table 2 footnotes:

1. When a test is performed, the INR is calculated directly from the whole blood PT value based on a regression analysis.
2. The conversion chart shown is specific for a plasma PT obtained using a particular PT reagent with assumed 1.0 ISI. Due to the variability of reagents and test instruments, different assay systems (a system consists of the combination of reagent and instrument) will produce different conversions. Institutions may wish to establish their own performance range and conversion chart for the specific reagent employed in their clinical laboratory. Such a conversion may then be used in place of the plasma conversion displayed in the instruments. Institutions electing to perform custom conversions are cautioned that the whole blood to plasma conversion is only relevant for a standard combination of thromboplastin reagent and instrument. Changes of either component necessitate a re-evaluation of the custom correlation.
3. The HEMOCHRON Jr. whole blood clotting time is measured internally to the nearest tenth of a second and rounded off to the nearest whole number for display. This rounding procedure may result in slight differences between the instrument displayed value and the value shown in the conversion table.
4. The clinically useful reportable range is up to an INR value of 7.0, based on the clinical data presented in Table 2.

PRECISION

In-house Precision Studies

The precision of the HEMOCHRON Jr. Microcoagulation System was evaluated by performing multiple HEMOCHRON Jr. Citrate PT assays using normal and abnormal lyophilized whole blood controls. Assays were performed on two separate test days utilizing up to six instruments with the following results. HEMOCHRON Jr. precision values are expressed as whole blood clotting times in seconds.

	(N)	Mean (sec)	SD (sec)	CV (%)
Normal	55	26	1.9	7.4
Abnormal	55	55	2.7	5.0

Day-to-day precision:

	Normal				Abnormal		
	(N)	Mean (sec)	SD (sec)	CV (%)	Mean (sec)	SD (sec)	CV (%)
Day 1	3	27	1.6	6.0	56	2.2	4.0
Day 2	3	27	0.6	2.0	55	4.4	8.0
Day 3	3	27	2.4	9.0	57	1.7	3.0
Day 4	3	26	2.1	8.0	57	0.6	1.0
Total	12	27	1.7	6.3	56	2.2	2.2

Operator precision:

	Normal				Abnormal		
	(N)	Mean (sec)	SD (sec)	CV (%)	Mean (sec)	SD (sec)	CV (%)
Op. 1	15	26	1.6	6.2	55	2.4	4.3
Op. 2	15	26	1.2	4.7	56	1.5	2.6
Op. 3	15	27	1.1	4.2	54	2.7	4.7
Total	45	26	1.3	5.0	55	2.2	3.9

Lot-to-lot precision:

	Normal				Abnormal		
	(N)	Mean (sec)	SD (sec)	CV (%)	Mean (sec)	SD (sec)	CV (%)
Lot 1	5	27	1.0	3.7	53	3.0	5.7
Lot 2	5	24	1.5	6.2	53	1.9	3.5
Lot 3	5	25	1.6	6.3	55	1.8	3.3
Total	15	25	1.7	6.8	54	2.3	4.2

Comparison of lot to lot variability across three (3) lots yielded CV% of 6.8 and 4.2 for normal and abnormal control whole blood values, respectively. A comparison between three (3) operators yielded a CV% less than 10 at both levels.

NOTE: *Coefficient of variation (CV) values shown above include all system components and their subsequent variables, namely control material, test cuvette, and instrument.*

Summary of Precision

Up to six HEMOCHRON Jr. instruments were subjected to precision tests with two levels of whole blood control, normal and abnormal. Instruments were tested repeatedly within a day to establish the expected variation among instruments. Instruments were also tested with the whole blood control for four consecutive days to establish the expected variation day to day. Variation due to cuvette lot and operator were also analyzed. The instruments variation was demonstrated to be within 10% for both levels of whole blood control.

International Normalized Ratio

The therapeutic range of the oral anticoagulant therapy is traditionally expressed as a ratio of the patient PT to a mean normal PT. Due to the variable procoagulant nature of different thromboplastins, it has been proposed by the International Council for Standardization Committee of the International Society for Thrombosis and Hemostasis that each manufacturer of thromboplastin reagent identify the potency of their preparation as compared to the World Health Organization (WHO) standard. Such comparison results in the assigning of an ISI for the reagent. The ISI may then be used to convert patient ratios to INR.

The INR reported is designed to be independent of the plasma reference used and has been correlated to systems using an ISI of 1.0. Recent reports have emphasized the persistence of inconsistencies between INR test systems. Institutions may wish to establish their own target range of therapeutic anticoagulation based on their patient population and laboratory test system.

The HEMOCHRON Jr. microcoagulation instrument automatically converts the whole blood PT result into its corresponding INR based on the regression data. The INR equations and plasma equivalent conversions programmed into the HEMOCHRON Jr. instruments (HEMOCHRON Jr. II and HEMOCHRON Jr. Signature) are based on clinical data which used a reagent with an ISI of 1.0 (RecombiPlasTin®, IL, Lexington, MA) and an automated plasma based coagulation instrument (Electra 900, IL, Lexington, MA).

LIMITATIONS

For the HEMOCHRON Jr. II or HEMOCHRON Jr. Signature microcoagulation instruments, INR values between 0.5 to 0.8 and between 10 to 12, are displayed as "INR<0.8" and "INR>10" respectively. INR values under 0.5 and over 12 are displayed as "Out of Range - Lo" and "Out of Range - Hi" respectively. Samples with a hematocrit less than 20% or greater than 55% are not recommended due to an optical density outside of the level of detection of the HEMOCHRON Jr. microcoagulation instrument. A slight upward trend can be observed in samples with hematocrits between 10 and 60%. This trend is not clinically significant, and exists only at the hematocrit extremes.

The HEMOCHRON Jr. Citrate PT is affected by poor technique including blood collection and the transfer of blood to the sample well. The quality of the blood specimen may be affected by:

– Foaming or hemolysis of the sample
– Clotted or partially clotted blood
– Unsuspected anticoagulation

Studies indicate interferences may occur in patients with antiphospholipid antibodies or antiphospholipid syndrome.[7, 8, 9]

The HEMOCHRON Jr. microcoagulation instrument requires proper technique in specimen collection. Specimen collection and handling for all coagulation testing requires careful adherence to guidelines published here as well as CDC guidelines and NCCLS standards H21-A, H47-A and H03-A. Sample preparation and storage for point of care coagulation tests employing whole blood are more stringent than corresponding plasma assays.

As with all diagnostic tests, HEMOCHRON Jr. test results should be scrutinized in light of a specific patient's condition and anticoagulant therapy. Any results exhibiting inconsistency with the patient's clinical status should be repeated or supplemented with additional test data.

OPERATING PRECAUTIONS

Do **NOT** use cuvettes that are past their marked expiration date, or that which been improperly stored.

Do **NOT** force a cuvette into the instrument. If resistance to insertion is encountered, gently remove the cuvette and examine the cuvette slot. Remove any obstruction before attempting further use of the instrument (see Service and Maintenance in the appropriate HEMOCHRON Jr. Operator's Manual).

INTERFERING SUBSTANCES

Thromboplastin based assays are susceptible to interference from other anticoagulants such as heparin as well as the lupus anticoagulant. Many concomitant medications can also effect a PT result. Other than extreme hematocrit values (see Limitations), substances which interfere with whole blood assays but not plasma based tests have not been identified.

QUALITY CONTROL

Routine quality control testing and tracking should be part of a comprehensive quality assurance program. HEMOCHRON Jr. quality control products are available to make routine QC convenient and affordable.

Daily QC of the Instrument

The HEMOCHRON Jr. should be quality controlled at two levels of control once every 8 hours of operation. To assist in accomplishing daily QC, Electronic Quality Control is available and can provide a two-level check of the instrument. Refer to the Operator's Manual for the specific HEMOCHRON Instrument in use for detailed instructions.

QC of the HEMOCHRON Jr. Test Cuvettes

Each ***lot*** of HEMOCHRON Jr. Citrate PT cuvettes should be validated for performance at two liquid quality control levels:

- When a new shipment is received, AND
- Once per 30 calendar days thereafter

Following successful performance validation as above, the cuvettes will not require any further liquid quality control unless a shift in clinical results is suspected.

Performance validation can be accomplished using the appropriate HEMOCHRON Jr. Microcoagulation Whole Blood Quality Control products. Acceptable performance ranges and how to apply them for the Citrate PT test cuvettes are included with each quality control product kit.

EN REFERENCES
DE VERWEISE
FR RÉFÉRENCES
IT RIFERIMENTI
ES REFERENCIAS
PT REFERÊNCIAS
NL REFERENTNTIES

1. Wehrmacher WH: Guarding the prothrombin. Current Medical Digest 1967; 34:432.
2. Ens, GW, and Duff, S. A Proposed Inter-Laboratory INR Support System. Clinical Hemostasis Review 1997; 11:(1).
3. Young, Donald S.: Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests, Fourth Edition, AACC Press, Washington, D.C., 1995
4. National Committee for Clinical Laboratory Standards. Collection, Transport, and Preparation of Blood Specimens for Coagulation Testing and Performance of Coagulation Assays; Approved Guideline. NCCLS document H21-A.
5. National Committee for Clinical Laboratory Standards. One-Stage Prothrombin Time (PT) Test and Activated Partial Thromboplastin Time (APTT) Test; Approved Guideline. NCCLS document H47-A.
6. National Committee for Clinical Laboratory Standards. Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture; Approved Standard. NCCLS document H03-A.
7. Sanfelippo MJ, Sennet J, McMahon EJ, 2000. Falsely elevated INRs in warfarin-treated patients with the lupus anticoagulant. WMJ. Jun; 99(3):62-4, 43.
8. Rosborough TK, Shepherd MF, 2004. Unreliability of international normalized ratio for monitoring warfarin therapy in patients with lupus anticoagulant. Pharmacotherapy Jul; 24(7):838-42.
9. Perry SL, Samsa GP, Ortel TL, 2005. Point-of-care testing of the international normalized ratio in patients with antiphospholipid antibodies. Thromb Haemost. Dec; 94(6):1196-202.

HEMOCHRON® Jr.

Whole Blood Microcoagulation Systems

Citrate Prothrombin Time
Citrate Prothrombinzeit (PT)

Packungsbeilage

Deutsch

Zur *In-vitro*-Diagnose

VERWENDUNGSZWECK

HEMOCHRON® Jr. Citrate PT ist ein modularer Mikrokoagulationstest zur Bestimmung einer quantitativen, einstufigen Prothrombinzeit. Der Citrate PT-Test wird mit Hilfe einer venösen zitrierten Vollblutprobe auf den HEMOCHRON Jr. Signatur und HEMOCHRON Jr. II Mikrokoagulationsgeräten durchgeführt. Die Geräte sind tragbar und für die Verwendung am Behandlungsort vorgesehen. Die Geräte sind nicht für den Heimgebrauch vorgesehen.

HINWEIS: *Dieser HEMOCHRON Jr. Citrate PT-Test kann nicht mit früheren Versionen des HEMOCHRON Jr. verwendet werden.*

ZUSAMMENFASSUNG UND ERKLÄRUNG

Das HEMOCHRON Jr. Citrate PT, ein Test des extrinsischen Koagulationsablaufs, wird mit Hilfe von zitriertem venösen Vollblut durchgeführt. Dank der Verwendung von zitrierten Proben kann der Test am Behandlungsort oder in einem Satelliten- oder Zentrallabor durchgeführt werden. Durch Vollbluttest-Systeme können viele der bekannten Variablen, die für die Zuverlässigkeit der Tests von Plasma-Prothrombinzeit (PT) verantwortlich sind, ausgeschlossen werden – einschließlich der Handhabung und Bearbeitung von Proben. Da nur wenige Proben bearbeitet werden müssen, steht das Ergebnis des PT-Tests in weniger als fünf Minuten fest. Dank der Verwendung von zitrierten Vollblut-Proben können die Tests bis zu zwei Stunden nach Entnahme der Proben durchgeführt werden, ohne das Testergebnis zu beeinflussen.

Tests am Patientenbett sind besonders bei therapeutischen oder operativen Eingriffen hilfreich, wenn orale Anti-koagulantien oder Hämostase überwacht werden müssen.

BETRIEBSPRINZIP

Die HEMOCHRON Jr. Geräte verwenden einen mechanischen Gerinnungsmechanismus, bei dem die Gerinnung in der Einmal-PT-Küvette stattfindet. Nach der Vollblut-Einführung misst das Gerät exakt 15 Mikroliter Blut und verschiebt es automatisch in den Testkanal innerhalb der Citrate PT-Küvette. Die verbleibende Blutprobe wird nicht mehr benötigt und automatisch in den Entsorgungskanal der Küvette gezogen. Vermischung von Probe und Reagens sowie Testbeginn werden auch automatisch durchgeführt. Nach dem Mischen mit dem Reagens wird die Probe in dem Testkanal hin- und herbewegt, wobei die Gerinnselbildung überwacht wird.

Der Gerinnsel-Erkennungsmechanismus besteht aus einer Reihe optischer LED-Detektoren, die mit dem Testkanal der Küvette ausgerichtet sind. Die Geschwindigkeit der Blutprobe zwischen den Detektoren wird gemessen. Sobald die Gerinnung erfolgt, wird der Blutfluss gebremst und verlangsamt sich. Das Gerät registriert das Gerinnsel, wenn sich das Blut unterhalb einer vorbestimmten Flussrate bewegt. Das Gerät gibt mathematische Vollblutwerte an, die in eine Internationale normalisierte Ratio (INR) und einen Plasma-äquivalenten Wert umgerechnet werden. Die Vollblut-Citrate PT-Zeit wird durch Gedrückthalten der **START**-Taste angezeigt.

REAGENS

Jede Packung Citrate PT Testküvetten enthält:

- 45 Beutel, wovon jeder eine HEMOCHRON Jr. Citrate PT Testküvette und ein Trockenmittel enthält

Die Citrate PT Testküvette ist eine Einweg-Testkammereinheit, gefüllt mit einem Thromboplastin-Trockenpräparat, Kalziumsalzen, Stabilisatoren und Puffern. Jede Küvette ist einzeln in einem Beutel verpackt. Auf den Küvetten befindet sich ein chargenspezifisches Verfallsdatum.

VORSICHT: *Alle benutzten Testküvetten sollten als potenziell infektiös betrachtet werden, mit Vorsicht gehandhabt werden und gemäß den üblichen medizinischen Entsorgungsrichtlinien entsorgt werden.*

LAGERUNG UND STABILTÄT

Bei entsprechender Kühlung (2–8 °C) sind die folienverpackten Citrate PT Testküvetten bis zum angegebenen Verfallsdatum haltbar. Ungeöffnete, im Beutel verpackte Küvetten können eventuell auch bei Raumtemperatur (15–30 °C) gelagert werden. Citrate PT Küvetten sollten niemals einer Temperatur von über 37 °C ausgesetzt werden.

HINWEIS: *Bei Raumtemperatur sind die Produkte maximal 12 Wochen haltbar, aber niemals länger als das auf der Verpackung angegebene Verfallsdatum. Ein neues Verfallsdatum muss bei Lagerung bei Raumtemperatur angegeben werden. Dazu muss das neue Datum im Abschnitt Lagerinformationen unter „Performance Verified“ („Leistung verifiziert“) auf der Seite jeder Küvettenschachtel eingetragen werden. Zur optimalen Haltbarkeit wird empfohlen, jeden Küvettenbeutel erst unmittelbar vor Gebrauch zu öffnen.*

BEDIENUNGSANLEITUNGEN

Vor Beginn der Verwendung sollte sich der Benutzer mit den detaillierten Anweisungen des Benutzerhandbuchs von HEMOCHRON Jr. II oder HEMOCHRON Jr. Signature vertraut machen.

Das Gerät wird verwendet, indem eine Küvette in das Gerät eingeführt wird, eine Vollblutprobe eingeleitet und die **START** Taste gedrückt gehalten wird. Messung der Probe, Mischung von Probe und Reagens, Testbeginn und Gerinnselerkennung erfolgen daraufhin automatisch.

Beigefügtes Material

– Vorgefüllte HEMOCHRON Jr. Citrate PT Testküvetten

Benötigtes, aber nicht beigefügtes Material

– HEMOCHRON Jr. II oder HEMOCHRON Jr. Signature
– evakuiertes Röhrchen mit Natriumzitrat (3,8 % oder 3,2 %) und Kanüle für die Blutentnahme
– 1 ml oder 3 ml Plastikspritze, Kanüle (23 oder 21-Gauge) (bei Spritzenentnahme)

PROBENENTNAHME UND HANDHABUNG

Zur Entnahme von Blutproben sind die institutionellen Richtlinien sowie NCCLS (H21-A, H47-A y H03-A) zur Entnahme von Proben für Koagulationstests zu befolgen.

HINWEIS: *Die Blutproben für die tests sollten mindestens 5-Minuten vor Testdurchführung entnommen werden, damit das Natriumzitrat ausreichend mit der Probe vermischt wird. Optimale Ergebnisse können dann erzielt werden, wenn die Proben innerhalb einer Stunde getestet und bis zum Test bei Raumtemperatur gelagert werden.*

Keine Proben aus heparinisierten Zugangsleitungen, Heparin-Locks oder Dauer-Heparin-Locks entnehmen.

Bei der Entnahme von Proben aus Dauerblutkathetern den Zugangsport sorgfältig gemäß den institutionellen Vorgaben durchspülen.

1. Mit einer Spritze oder einem Röhrchen eine Blutprobe von 5 mL entnehmen.
2. Wenn die Blutentnahme mit der Spritze erfolgt, muss eine Transferkanüle auf die Spritze gesteckt werden. Den Verschluss des mit Natriumzitrat (3,8 % oder 3,2-%) gefüllten Röhrchens vorsichtig durchstechen und solange Blut in das Röhrchen fließen lassen, bis der Fluss stoppt. Leicht schütteln. Die Spritze samt Transferkanüle entsorgen.
3. Vor dem Test das Röhrchen mindestens vier Mal umdrehen, um sicherzustellen, dass die Probe ausreichend vermischt wurde.
4. Einen Tropfen des Blut-Zitrat-Gemischs in den Probenschacht der Test-Küvette geben, dabei den Schacht von unten nach oben füllen. Dies kann sowohl mit als auch ohne Transferkanüle geschehen. In den mittleren Probenschacht muss soviel Blut gegeben werden, dass er bis oben gefüllt ist. Sollte sich über dem mittleren Schacht eine große Flüssigkeitswölbung bilden, diese in den äußeren Schacht hinüberdrücken.
5. Die **START**-Taste drücken.

LEISTUNGSMERKMALE

Normaler Bereich

Die HEMOCHRON Jr. Mikrokoagulationssysteme wurden ausgewertet, indem frisches, zitriertes Vollblut von freiwilligen Blutspendern verwendet wurde. Die Ergebnisse unter Verwendung von Zitratkonzentrationen von 3,8 % (N=155) und 3,2 % (N=59) sind in Tabelle 1 dargestellt.

HINWEIS: *Die normalen Werte in Tabelle 1 wurden für das Thromboplastin-Reagens mit niedrigem Internationalen Empfindlichkeitsindex (ISI), das im Citrate PT-Test (ISI ungefähr 1.0) verwendet wird, ausgearbeitet. Um eine optimale Verwendung zu gewährleisten, sollte jede Einrichtung ihre eigene normale Bereichsnorm und Höchstbegrenzung einer therapeutischen Antikoagulation festlegen, und zwar angepasst an ihre Patienten.*

Tabelle 1		3,2 %	3,8 %
INR ERGEBNISSE	Durchschnitt	1,1	1,0
	SA	0,2	0,2
	n	59	155
	Bereich (±2 SA)	0,8–1,5	0,8–1,4
VOLL-BLUT-SEKUNDEN	Durchschnitt	23	22
	SA	1,5	1,6
	n	59	155
	SEKUNDEN (±2 SA)	20–26	18,8–25,4

Vollblut PT-Werte von weniger als 15 Sekunden oder INR 0,5 zeigen eine überhöhte Koagulationsaktivität des Blutes an, möglicherweise aufgrund von Probeentnahmen oder -verarbeitung; der Vorgang sollte deshalb wiederholt werden. Der INR zeigt am Ende der Untersuchung an, inwieweit die Gerinnungsfaktoren durch die orale Antikoagulantientherapie vermindert sind. Das Thromboplastin (aus Kaninchenhirn) der HEMOCHRON Jr. Citrate PT hat einen ISI von durchschnittlich 1.0. Dadurch wird optimale Empfindlichkeit für Vitamin K-abhängige Gerinnungsfaktoren erzielt. Die Plasma PT-Ergebnisse auf den Modellen HEMOCHRON Jr. II und HEMOCHRON Jr. Signature basieren auf einem Wert, der einem Laborreagens-ISI von 1,0 entspricht. Andere Plasma PT-Reagens-Systeme zeigen andere normale Begrenzungen und Koagulantienfaktor-Empfindlichkeit. Die Plasma PT-Werte in Tabelle 2 reflektieren diese äquivalenten, zu erwartenden Werte, die mit einem Labor-Reagens von 1,0 ISI ermittelt werden.

Empfindlichkeit des HEMOCHRON Jr. Citrate PT Tests auf Faktorschwächen

Das HEMOCHRON Jr. Citrate PT (Einzel-Testcharge) wurde mit einem Standard Vollblut-Präparat mit bekannten Vitamin K-abhängigen Gerinnungsfaktoren (Faktoren II, VII, IX, und X) und Faktor V getestet. Sobald die Gesamt-Faktormenge unter 35 % sinkt, steigt der PT-Wert über die normale Höchstgrenze (25,8-Vollblut-Sek.). Das HEMOCHRON Jr. Citrate PT wurde mit einem Labor-Plasma-PT verglichen, indem ein Standard Thromboplastin Reagens (Dade, Baxter Healthcare Corporation, Dade Division, Miami, FL) und Electra 900 (IL, Lexington, MA) wie in Fig. 1 verwendet wurde.

Linearität der Reaktion von HEMOCHRON Jr. Citrate PT zum Koagulantiengehalt

Anhand einer Verdünnungsstudie sollte die Linearität des Citrate PT Ergebnisses zum Koagulantiengehalt dargestellt werden. Fig. 2 zeigt eine lineare Reaktion von 1,0 INR zu mehr als 10 INR. In der Graphik ist die INR 1,56 bei 50 % Koagulantienaktivität, 1,84 bei 40 % und 2,48 bei 30 % Koagulantienaktivität.

Zusammenfassung von Empfindlichkeit und Linearität

Das HEMOCHRON Jr. Gerät und die Citrate PT Vollblut-Testküvette wurden gegenüber einer Standard-Plasmaprobe im Labor getestet, um die Empfindlichkeit des Vollblutests gegenüber dieser Standard-Plasmaprobe zu untersuchen. Die im Plasmatest verwendeten Substrate waren Proben mit verminderter Konzentration des Vitamin-K-Gerinnungsfaktors. Die Ergebnisse der Plasma- und Vollblutests wurden statistischen Analysen unterzogen. Die Ergebnisse zeigten eine ähnliche Koagulationsfaktor-Empfindlichkeit für das HEMOCHRON Jr. Citrate PT und das Labor PT. Die Linearität des Citrate PT bis zu einer INR von 10 wurde mit einer standardisierten verdünnten Probe erreicht.

Kalibrierung von HEMOCHRON Jr. Citrate PT zur-INR

Das Citrate PT wurde untersucht, indem Proben von einer Klinik untersucht wurden, um die Umrechnung des Vollblut-PT-Ergebnisses zur INR herzustellen. In dieser Analyse, wurden Blutproben (N=74) von Pat

HEMOCHRON® Jr.

Whole Blood Microcoagulation Systems

Citrate Prothrombin Time
Tempo di Protrombina con Citrato (PT)

Foglietto illustrativo

Italiano

Per uso diagnostico *in vitro*.

USO PREVISTO

HEMOCHRON® Jr. Citrate PT è un test di microcoagulazione unificato, inteso per l'esecuzione di del tempo di protrombina con metodo quantitativo in unico passaggio. Il test Citrate PT viene eseguito con gli strumenti di microcoagulazione HEMOCHRON-Jr. Signature e HEMOCHRON Jr. II, utilizzando un campione di sangue venoso intero citrato. La strumentazione è portatile e l'impiego di campioni citrati consente di effettuare il test nel luogo di cura o in un laboratorio satellite o centrale. La strumentazione non è adatta all'uso domestico.

NOTA: *HEMOCHRON Jr. Citrate PT non è indicato per l'uso con versioni precedenti di HEMOCHRON Jr.*

SOMMARIO E SPIEGAZIONE

Il test HEMOCHRON Jr. Citrate PT, un'analisi della via estrinseca della coagulazione, viene effettuato utilizzando un campione di sangue venoso intero citrato. L'impiego di campioni citrati consente di effettuare il test nel luogo di cura o in un laboratorio satellite o centrale. I sistemi di test su sangue intero eliminano molte delle variabili note per influenzare l'affidabilità dell'analisi del tempo di protrombina del plasma (PT), compreso trattamento e processo dei campioni. Essendo richiesto un processo minimo dei campioni, i risultati PT si ottengono in meno di cinque minuti. Inoltre, il test viene effettuato utilizzando un campione di sangue intero citrato, pertanto il test può essere eseguito fino a due ore dopo il prelievo del campione, senza che ciò influisca sui risultati del test.

L'analisi presso il letto del paziente è particolarmente utile in procedure ed interventi terapeutici che richiedono il monitoraggio degli anticoagulanti e la valutazione dell'emostasi.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Gli strumenti HEMOCHRON Jr. utilizzano un meccanismo di coagulazione endpoint meccanico in cui la formazione del coagulo avviene all'interno della cuvetta monouso Citrate PT. Successivamente all'introduzione del campione di sangue intero, lo strumento misura con precisione 15 microlitri di sangue e li invia automaticamente nel canale di test della cuvetta Citrate PT. La rimanenza del campione di sangue, non necessario per il test, viene automaticamente inviata al canale di scarto della cuvetta. Anche la miscelazione del campione/reagente e l'avvio del test avvengono in modo automatico, senza necessità di intervento da parte dell'operatore. Dopo la miscelazione con il reagente, il campione viene mosso avanti e indietro all'interno del canale di test, sorvegliando la formazione del coagulo.

Il meccanismo di rilevazione del coagulo consiste in una serie di rilevatori ottici LED allineati con il canale di test della cuvetta. La velocità con cui il campione di sangue si muove fra i rilevatori viene misurata. Quando ha inizio la formazione del coagulo, il flusso del sangue viene ostacolato ed il movimento rallentato. Lo strumento rileva che è stato raggiunto un endpoint della coagulazione nel momento in cui il movimento del sangue scende al di sotto del limite prestabilito. Gli strumenti ripartono i numeri del sangue intero matematicamente convertiti in Rapporto Internazionale Normalizzato (INR) e in valori plasmatici equivalenti. Il tempo di coagulazione Citrate PT del sangue intero può essere visualizzato premendo e mantenendo premuto il tasto **START** dello strumento.

REAGENTI

Ogni confezione di test in cuvetta Citrate PT contiene:

- 45 confezioni, ognuna delle quali contiene un test in cuvetta HEMOCHRON Jr. Citrate PT e un essiccante

Il test in cuvetta Citrate PT è una camera di test completa, monouso, precaricata con un preparato secco di tromboplastina, sali di calcio, stabilizzanti e tamponi. Ogni cuvetta è confezionata individualmente in un involucro. Sugli involucri delle cuvette è stampata la data di scadenza specifica del lotto.

ATTENZIONE: tutte le cuvette utilizzate devono essere considerate potenzialmente infettive, pertanto vanno maneggiate con cura ed eliminate in conformità alle normative per l'eliminazione dei rifiuti medici.

CONSERVAZIONE E STABILITÀ

Se conservate in frigorifero (2–8 °C) le cuvette Citrate PT confezionate rimangono stabili fino alla data di scadenza indicata. Le cuvette confezionate, integre, possono essere conservate a temperatura ambiente (15–30 °C). Non esporre le cuvette Citrate PT a temperature superiori a 37 °C.

NOTA: *le cuvette possono essere conservate a temperatura ambiente per max. 12 settimane, ma non devono essere utilizzate dopo la data di scadenza riportata. Occorre indicare la data di inizio della conservazione a temperatura ambiente, completando la sezione sulle informazioni relative alla conservazione della tabella "Performance Verified" (Performance Controllata) apposta sul lato di ogni scatola di cuvette. Per una durata ottimale, si raccomanda di aprire l'involucro della cuvetta immediatamente prima dell'uso.*

ISTRUZIONI PER L'USO

Prima di effettuare qualsiasi analisi, l'utente dovrà fare riferimento al manuale utente di HEMOCHRON Jr. II o HEMOCHRON Jr. Signature per le istruzioni dettagliate sull'utilizzo.

Lo strumento si avvia inserendo una cuvetta in esso, lasciandolo riscaldare, introducendo un campione di sangue intero e premendo il tasto **START**. La misurazione del campione, la miscelazione campione/reagente, l'avvio del test e il rilevamento del coagulo avverranno automaticamente.

Materiale fornito

– Test in cuvette precaricate HEMOCHRON Jr. Citrate PT

Materiale necessario ma non fornito

– Esclusivamente HEMOCHRON Jr. II o HEMOCHRON Jr. Signature
– Provetta sotto vuoto contenente sodio citrato (3,8 % o 3,2 %) e ago per il prelievo del sangue
– Siringa in plastica da 1 mL o 3 mL con ago misura 21 o 23 (per il campionamento)

RACCOLTA E TRATTAMENTO DEL CAMPIONE

Per il prelievo del campione di sangue, seguire le direttive della struttura clinica e quelle NCCLS (H21-A, H47-A e H03-A) suila raccolta di campioni per il test di coagulazione.

NOTA: *i campioni di sangue da sottoporre al test devono essere raccolti almeno 5 minuti prima dell'esecuzione del test, per consentire al citrato di sodio di miscelarsi adeguatamente al campione. Risultati ottimali si ottengono effettuando il test entro un' ora dal prelievo dei campioni, mantenendoli a temperatura ambiente fino all'esecuzione del test.*

Non prelevare sangue attraverso la via di accesso eparinizzata, il tappo o il sistema impiantato.

Se il prelievo avviene attraverso aghi cannula impiantati, lavare accuratamente l'accesso seguendo le procedure utilizzate nella struttura clinica.

1. Raccogliere un campione di 5 mL di sangue, utilizzando una siringa o una provetta sotto vuoto.
2. Se si utilizza un sistema di prelievo, inserire un ago sulla siringa. Forare con cautela il tappo della provetta sotto vuoto contenente il citrato di sodio (3,8 % o 3,2-%) e lasciar fluire il sangue nella provetta fino a che il flusso si arresta. Miscelare con cautela. Smaltire la siringa e l'ago.
3. Prima di effettuare il test, capovolgere la provetta almeno quattro volte per garantire una miscelatura completa.
4. Inserire una goccia del sangue citrato nel pozzetto della cuvetta, iniziando il riempimento dal fondo del pozzetto. Ciò può essere effettuato con o senza ago. Occorre aggiungere una quantità sufficiente di sangue direttamente al pozzetto centrale per riempirlo. Se una grande goccia di sangue dovesse espandersi oltre il pozzetto centrale, spingerla nel pozzetto esterno.
5. Premere il tasto **START**.

CARATTERISTICHE DI PERFORMANCE

Ambito Normale

La valutazione dei sistemi di microcoagulazione HEMOCHRON Jr. è stata effettuata utilizzando sangue fresco, intero, citrato da donatore volontario normale. I risultati ottenuti utilizzando concentrazioni di citrato al 3,8 % (N=155) e al 3,2 % (N=59) sono rappresentati nella tabella 1.

NOTA: *i valori normali indicati nella tabella 1 sono stati stabiliti in relazione al reagente tromboplastinico utilizzato per il test Citrate PT (ISI approx. 1.0), in base al low International Sensitivity Index (ISI).*

Tabella 1		3,2 %	3,8 %
INR RISULTATI	media	1,1	1,0
	DS	0,2	0,2
	n	59	155
	ambito (± 2 DS)	0,8–1,5	0,8–1,4
INTERO SANGUE SECONDI	media	23	22
	DS	1,5	1,6
	n	59	155
	ambito (± 2 DS)	20–26	18,8–25,4

I valori PT di sangue intero inferiori a 15 secondi o INR 0,5 indicano eccessiva attività di coagulazione del sangue, eventualmente a causa della contaminazione del campione successiva al prelievo o al trattamento e devono essere ripetuti. L'INR visualizzato al termine dell'analisi è indicativo per il grado di riduzione dei fattori di coagulazione in presenza di terapia anticoagulante. La tromboplastina (da cervello di coniglio) di HEMOCHRON Jr. Citrate PT corrisponde ad un ISI di ca. 1,0 evidenziando una sensibilità ottimale in relazione ai fattori di coagulazione dipendenti dalla vitamina K. I risultati plasmatici PT visualizzati sui modelli HEMOCHRON Jr. II e HEMOCHRON Jr. Signature si basano su valori corrispondenti ad un ISI del reagente di laboratorio di 1,0. Diversi sistemi reagenti al PT plasmatico evidenziano ambiti e sensibilità del fattore di coagulazione differenti. I valori PT plasmatici indicati nella tabella 2 riflettono i valori equivalenti previsti con l'uso di un reagente di laboratorio con ISI 1,0.

Sensibilità del test HEMOCHRON Jr. Citrate PT alla deficienza del fattore

Il test HEMOCHRON Jr. Citrate PT (lotto di test individuali) è stato testato con un preparato di sangue intero standard, preparato con livelli noti dei fattori di coagulazione vitamina K dipendenti (fattore II, VII, IX e X) e del fattore V. Con la riduzione del livello dei fattori combinati al di sotto del 35 %, il valore PR è aumentato al di sopra del limite superiore dell'ambito normale (25,8 sec. sange intero). HEMOCHRON Jr. Citrate PT è stato confrontato con un PT plasmatico di laboratorio, utilizzando un reagente tromboplastinico standard (Dade, Baxter Healthcare Corporation, Dade Division, Miami, FL) e Electra 900 (IL, Lexington, MA), come mostrato in Fig. 1.

Linearità della risposta di HEMOCHRON Jr. Citrate PT in relazione al livello coagulante

Uno studio diluizionale è stato utilizzato per dimostrare la linearità dei risultati Citrate PT rispetto al livello coagulante. La Fig. 2 dimostra una linearità della risposta variante da 1,0 INR a superiore a 10 INR. Nel grafico l'INR è pari a 1,56 con 50 % di attività coagulante, 1,84 con 40 % di attività coagulante e 2,48 al 30 % di attività coagulante.

Sommario della sensibilità e della linearità

Lo strumento HEMOCHRON Jr. e il test in cuvetta Citrate PT sono stati testati contro un'analisi di laboratorio del plasma standard, per valutare la sensibilità del test effettuato con sangue intero in relazione all'analisi del plasma standard. Nel test del plasma sono stati utilizzati substrati formati da campioni con concentrazione ridotta del fattore di coagulazione vitamina K dipendente. I-risultati dei test su sangue intero e su plasma sono stati sottoposti ad analisi statistica. I risultati hanno evidenziato sensibilità al fattore di coagulazione simili per HEMOCHRON Jr. Citrate PT e il PT del laboratorio. La-linearità del Citrate PT fino a INR pari a 10 è stata stabilita utilizzando un'analisi di diluizione standard.

Calibratura di HEMOCHRON Jr. Citrate PT a INR

Il Citrate PT è stato valutato utilizzando campioni di una struttura clinica per stabilire la conversione del risultato PT di sangue intero in INR. In questa analisi i campioni di sangue (N=74) sono stati raccolti da pazienti sottoposti a terapia anticoagulante orale. Un campione di sangue intero citrato è stato analizzato utilizzando il test HEMOCHRON Jr., un secondo campione è stato centrifugato e il plasma ottenuto è stato analizzato utilizzando un analizzatore Electra 900 (IL, Lexington, MA) e un reagente Dade Innovin (Dade, Miami, FL). Il risultato di questa analisi è stata la conversione diretta del valore del sangue intero in INR come mostrato nel grafico di conversione della tabella 2.

Comparazione clinica fra HEMOCHRON Jr. Citrate PT ed il PT del laboratorio

Il test HEMOCHRON Jr. Citrate PT è stato sottoposto a-validazione clinica presso tre strutture cliniche. I-campioni di sangue citrato (3,2 %) (N=74) sono stati raccolti da 233 pazienti sottoposti a terapia anticoagulante orale. I campioni sono stati analizzati utilizzando HEMOCHRON Jr. ed una seconda aliquota è stata analizzata in laboratorio mediante analisi del plasma, utilizzando Dade Innovin (Dade, Miami, FL) su-analizzatore Electra 900 (IL, Lexington, MA). I-risultati sono indicati in Fig. 3.

Dati riepilogativi dell'analisi di correlazione

La correlazione fra Citrate PT e PT del laboratorio è stata studiata con una configurazione di campioni frazionati. Ogni campione di sangue venoso è stato trattato con citrato di sodio (3,2 %) ed analizzato su HEMOCHRON Jr. mentre un altro campione citrato dello stesso prelievo venoso è stato inviato al laboratorio per essere processato e per la misurazione del PT plasmatico. Uno studio di calibrazione iniziale è stato effettuato per ottenere la conversione dei risultati del PT di sangue intero in INR. Una successiva validazione clinica ha dimostrato l'alto grado di correlazione fra HEMOCHRON-Jr. Citrate PT ed il PT del laboratorio.

Grafico rappresentazione della conversione

Sulla base dell'analisi di regressione lineare di test accoppiati, utilizzando l'HEMOCHRON Jr. PT di sangue citrato e l'analisi del PT plasmatico con un agente tromboplastinico con ISI di 1,0, è stata generata una conversione diretta del PT (sec.) nell'INR del laboratorio. Il grafico di conversione indicato è stato programmato nello strumento HEMOCHRON Jr. Questa conversione si basa su dati comparativi ottenuti da una struttura clinica e confermati da altre tre strutture cliniche.

NOTA: *i risultati plasmatici sono specifici per reagente e strumento di analisi. La conversione del PT plasmatico si basa su dati comparativi ed è dipendente dai limiti dell'analisi del plasma. L'INR calcolato direttamente attraverso il valore PT del sangue intero si basa su un'analisi di regressione. Il PT equivalente plasmatico viene calcolato dall'INR basato su un ISI di 1,0. Le strutture potranno definire ulteriormente le proprie conversioni individualizzate, in base ai reagenti ed agli strumenti specifici, attraverso l'esecuzione di uno studio comparativo fra PT di sangue intero e PT plasmatico.*

Tabella 2

Sangue intero (sec)	INR	Plasma (sec)	Sangue intero (sec)	INR	Plasma (sec)	Sangue intero (sec)	INR	Plasma (sec)
22	0,8	8	41	3,1	31	60	5,4	54
23	1,0	10	42	3,2	32	61	5,5	55
24	1,1	11	43	3,4	34	62	5,6	56
25	1,2	12	44	3,5	35	63	5,8	58
26	1,3	13	45	3,6	36	64	5,9	59
27	1,4	14	46	3,7	37	65	6,0	60
28	1,6	16	47	3,8	38	66	6,1	61
29	1,7	17	48	4,0	40	67	6,2	62
30	1,8	18	49	4,1	41	68	6,4	64
31	1,9	19	50	4,2	42	69	6,5	65
32	2,0	20	51	4,3	43	70	6,6	66
33	2,2	22	52	4,4	44	71	6,7	67
34	2,3	23	53	4,6	46	72	6,8	68
35	2,4	24	54	4,7	47	73	7,0	70
36	2,5	25	55	4,8	48			
37	2,6	26	56	4,9	49			
38	2,8	28	57	5,0	50			
39	2,9	29	58	5,2	52			
40	3,0	30	59	5,3	53			

Note della tabella 2

1. Quando si effettua un test, l'INR viene calcolato direttamente attraverso il valore PT del sangue intero in base ad un'analisi di regressione.
2. Il grafico di conversione mostrato è specifico per il PT plasmatico ottenuto utilizzando un reagente PT con ISI presunto di 1,0. A causa della variabilità dei reagenti e degli strumenti di controllo, diversi sistemi di analisi (un sistema consiste in una combinazione di reagente e strumento) producono diverse conversioni. Al fine di ottenere risultati ottimali, le strutture cliniche dovranno stabilire i propri ambiti di performance e i propri grafici di conversione per il reagente specifico utilizzato nel laboratorio clinico. Una simile conversione può poi essere utilizzata in sostituzione della conversione plasmatica visualizzata dagli strumenti. Le strutture che intendono effettuare conversioni personalizzate devono considerare che la conversione da sangue intero in plasma è rilevante unicamente se si utilizzasse combinazione standard di reagente tromboplastinico e strumento. Modifiche dei componenti necessitano di una rivalutazione della correlazione.
3. Il tempo di coagulazione del sangue intero HEMOCHRON Jr. viene misurato internamente al decimo di secondo più vicino ed arrotondato al numero intero più vicino per essere poi visualizzato. Questa procedura di arrotondamento può risultare in leggere differenze fra il valore visualizzato dallo strumento ed il valore indicato nella tabella di conversione. 4. L'ambito riportabile, chiamato utile, è un valore INR max. di 7,0, sulla base dei dati clinici presentati nella tabella 2.

PRECISIONE

Studi in-house sulla precisione

La precisione del sistema di microcoagulazione HEMOCHRON Jr. è stata valutata effettuando diverse analisi HEMOCHRON Jr. Microcoagulation Citrate PT utilizzando controlli di sangue intero liofilizzato normali e anomali. Le analisi sono state effettuate in due giorni diversi, utilizzando fino a sei strumenti con i seguenti risultati. I valori di precisione di HEMOCHRON Jr. sono espressi come tempo di coagulazione del sangue intero in secondi.

	(N)	Media (sec)	DS (sec)	CV (%)
Normale	55	26	1,9	7,4
Anomala	55	55	2,7	5,0

Precisione giorno per giorno:

	Normale				Anomala			
	(N)	Media (sec)	DS (sec)	CV (%)	Media (sec)	DS (sec)	CV (%)
Giorno 1	3	27	1,6	6,0	56	2,2	4,0
Giorno 2	3	27	0,6	2,0	55	4,4	8,0
Giorno 3	3	27	2,4	9,0	57	1,7	3,0
Giorno 4	3	26	2,1	8,0	57	0,6	1,0
Totale	12	27	1,7	6,3	56	2,2	2,2

Precisione operatore:

	Normale				Anomala			
	(N)	Media (sec)	DS (sec)	CV (%)	Media (sec)	DS (sec)	CV (%)
Op. 1	15	26	1,6	6,2	55	2,4	4,3
Op. 2	15	26	1,2	4,7	56	1,5	2,6
Op. 3	15	27	1,1	4,2	54	2,7	4,7
Totale	45	26	1,3	5,0	55	2,2	3,9

Precisione lotto per lotto:

	Normale				Anomala			
	(N)	Media (sec)	DS (sec)	CV (%)	Media (sec)	DS (sec)	CV (%)
lotto 1	5	27	1,0	3,7	53	3,0	5,7
lotto 2	5	24	1,5	6,2	53	1,9	3,5
lotto 3	5	25	1,6	6,3	55	1,8	3,3
Totale	15	25	1,7	6,8	54	2,3	4,2

Il confronto della variabilità lotto per lotto attraverso tre (3) lotti ha prodotto una percentuale CV rispettivamente di 6,8 e 4,2 per i valori normali e anomali di controllo del sangue intero. Una comparazione fra tre (3) operatori ha prodotto una percentuale CV inferiore a 10 per entrambi i livelli.

NOTA: *i valori del coefficiente di variazione (CV) soprastanti comprendono tutti i componenti del sistema e le susseguenti variabili, nominalmente materiale di controllo, test in cuvette e strumenti.*

Sommario della precisione

Fino a sei strumenti HEMOCHRON Jr. sono stati sottoposti a test sulla precisione con due livelli di controlli di sangue intero, normali e anomali. Gli strumenti sono stati controllati ripetutamente in un unico giorno, al fine di stabilire le variabili previste degli strumenti. Gli strumenti sono inoltre stati testati con un controllo di sangue intero per quattro giorni consecutivi al fine di stabilire le variabili previste giorno per giorno. Sono inoltre state analizzate le variabili conseguenti al lotto delle cuvette ed all'operatore. È stata evidenziata una variabilità relativa agli strumenti compresa nel 10 % per entrambi i livelli di controllo di sangue intero.

International Normalized Ratio (Rapporto Internazionale Normalizzato)

L'ambito terapeutico della terapia anticoagulante orale tradizionalmente viene espresso come rapporto del PT del paziente in relazione al PT normale medio. Al fine di valutare la natura procoagulante variabile di tromboplastine diverse, il Consiglio Internazionale per la Standardizzazione in Ematologia e la Commissione Internazionale per le Trombosi e l'Emostasi hanno proposto che ciascun produttore di tromboplastine identifichi l'efficacia del proprio preparato confrontandola con il valore di riferimento (ISI=1,0) stabilito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Tali comparazioni si applicano all'assegnazione di un valore ISI per il reagente. L'ISI può essere utilizzato per convertire i rapporti dei pazienti in INR.

L'INR riportato deve essere indipendente al riferimento plasmatico utilizzato ed è stato correlato al sistema utilizzando un ISI di 0,1. Relazioni recenti hanno evidenziato la persistenza di incoerenze fra i sistemi di test INR.2 Le istituzioni cliniche possono stabilire il proprio ambito target di anticoagulazione terapeutica sulla base della loro popolazione di pazienti e dei sistemi di analisi di laboratorio.

Lo strumento per microcoagulazione HEMOCHRON Jr. converte automaticamente il risultato del PT di sangue intero nel corrispondente INR in base ai dati di regressione. Le equazioni INR e le conversioni in equivalenti plasmatici programmate negli strumenti HEMOCHRON Jr. (HEMOCHRON Jr. II ed HEMOCHRON Jr. Signature) si basano su dati clinici che utilizzano un reagente con ISI di 0,1 (RecombiPlasTin®, IL, Lexington, MA) ed uno strumento di coagulazione automatizzato del plasma (Electra 900, IL, Lexington, MA).

LIMITI

Per lo strumento per microcoagulazione

HEMOCHRON Jr. II o HEMOCHRON Jr. Signature, i valori INR 0,5 e 0,8 e fra 10 e 12, vengono visualizzati rispettivamente come "INR<0,8" e "INR>10". Valori INR inferiori a 0,5 e superiori a 12 vengono visualizzati come "Out of Range-Lo (Fuori limite – Lo)" e "Out of Range-Hi (Fuori limite – Hi)". Campioni con ematocrito inferiore al 20% o superiore al 55% non sono consigliati a causa della densità ottica esterna al livello di rilevamento dello strumento per microcoagulazione HEMOCHRON Jr. Può essere osservato un leggero scivolamento verso l'alto in campioni con ematocrito compreso fra 10 e 60%. Questa variazione non è clinicamente significativa ed è presente solo agli estremi dell'ematocrito.

Il test HEMOCHRON Jr. Citrate PT è suscettibile a tecniche poco precise, compreso prelievo del sangue e trasferimento nel pozzetto del campione. La qualità del campione di sangue può essere influenzata da:

– Formazione di schiuma o emolisi del campione
– Sangue coagulato o parzialmente coagulato
– Anticoagulazione non sospettata

Gli studi indicano che potrebbero verificarsi delle interferenze nei pazienti con anticorpi antifosfolipidici o affetti da sindrome antifosfolipidica.[7,8,9]

L'impiego dello strumento per microcoagulazione HEMOCHRON Jr. richiede un'adeguata tecnica di raccolta del campione. La raccolta ed il trattamento dei campioni destinati ai testi di coagulazione deve applicare attentamente le direttive qui pubblicate oltre alle direttive CDC ed agli standard NCCLS H21-A, H47-A e H03-A. La preparazione e la conservazione dei campioni per l'analisi della coagulazione effettuati presso la struttura di cura, utilizzando sangue intero è più rigorosa di quella delle rispettive analisi plasmatiche.

Come per tutti i test diagnostici, i risultati ottenuti con il test HEMOCHRON Jr. dovranno essere esaminati alla luce delle condizioni specifiche del paziente e della terapia anticoagulante utilizzata. Qualsiasi analisi che riveli incompatibilità con lo stato clinico del paziente dovrà essere ripetuta o integrata con i risultati di analisi aggiuntive.

PRECAUZIONI NELL'ESECUZIONE

NON utilizzare cuvette dopo la data di scadenza indicata sulla confezione o che sono state conservate inadeguatamente.

NON introdurre a forza una cuvetta nello strumento. Se durante l'inserimento si incontra resistenza, rimuovere delicatamente la cuvetta ed esaminare lo scomparto. Rimuovere ogni ostruzione prima di tentare di riutilizzare lo strumento (vedi funzionamento e manutenzione nel manuale utente HEMOCHRON Jr.).

SOSTANZE INTERFERENTI

Analisi basate sulla tromboplastina sono suscettibili ad interferenze a causa di altri anticoagulanti, come eparina o anticoagulante lupico. Inoltre, anche diversi farmaci somministrati contemporaneamente possono influenzare i risultati PT. Ad esclusione dei dell'ematocrito estremi (vedi limitazioni), non sono state identificate sostanze che interferiscano con le analisi effettuate con sangue intero ma non con quelle effettuate con plasma.

CONTROLLO QUALITÀ (CQ)

Test e rilevamenti routinari di controllo della qualità devono essere inseriti nel programma completo di garanzia della qualità. I prodotti per il controllo qualità HEMOCHRON Jr. sono disponibili per effettuare un controllo della qualità conveniente e accessibile.

CQ giornaliero dello strumento

Per HEMOCHRON Jr. deve essere effettuato un controllo di qualità a due livelli ogni 8 ore di funzionamento. Electronic Quality Control è a disposizione per assistere nell'esecuzione del Controllo di Qualità quotidiano e può fornire un controllo dello strumento a due livelli. Per istruzioni dettagliate consultare il Manuale per l'operatore per lo specifico strumento HEMOCHRON in uso.

CQ del test in cuvetta HEMOCHRON Jr.

Per ogni ***lotto*** di cuvette HEMOCHRON Jr. Citrate PT le prestazioni delle cuvette devono essere convalidate a due livelli di controllo di qualità del liquido:

- Quando si riceve una nuova fornitura, E
- in seguito, una volta ogni 30 giorni di calendario

Una volta convalidate con successo come descritto precedentemente, le cuvette non avranno bisogno di nessun altro controllo di qualità del liquido a meno che non si sospetti una variazione dei risultati clinici.

La convalida delle prestazioni può essere effettuata usando gli appropriati prodotti per il controllo di qualità della microcoagulazione di sangue intero HEMOCHRON Jr. Le relative informazioni sulle gamme di prestazioni accettabili e su come applicarle alle cuvette da test Citrate PT sono incluse in ogni kit del prodotto di controllo qualità.

HEMOCHRON® Jr.

Whole Blood Microcoagulation Systems

Citrate Prothrombin Time
Tempo de Protrombina Citratada (PT)

Folheto Informativo

Português

Para Utilização em Diagnóstico *in vitro*

FIM A QUE SE DESTINA

O HEMOCHRON® Jr. Citrate PT é um teste de microcoagulação unitário cuja utilização se destina para a realização de um tempo de protrombina quantitativo, de uma só fase. O teste Citrate PT é realizado utilizando uma amostra de sangue venoso citratado apenas nos instrumentos de microcoagulação HEMOCHRON Jr. Signature e HEMOCHRON Jr. II. Os instrumentos são portáteis e a utilização de amostras citratadas permite que os testes sejam realizados no local-de cuidados de saúde ou num laboratório satélite-ou central. Os instrumentos não se destinam a-utilização doméstica.

NOTA: *Este HEMOCHRON Jr. Citrate PT não pode-ser utilizado com versões anteriores do HEMOCHRON-Jr.*

RESUMO E EXPLICAÇÃO

O HEMOCHRON Jr. Citrate PT, um teste da cascata da coagulação extrínseca, é realizado utilizando sangue total venoso citratado. A utilização de amostras citratadas permite que os testes sejam realizados no local de cuidados de saúde ou num laboratório satélite ou central. Os sistemas de teste de sangue total eliminam muitas das variáveis que se sabem afectar a confiança dos testes do tempo de protrombina (PT) do plasma, incluindo o manuseamento e o processamento das amostras. Uma-vez que é necessário o processamento de apenas uma pequena amostra, os resultados do PT são obtidos em menos de cinco minutos. Além disso, uma vez que o teste é realizado utilizando uma amostra de sangue total venoso, os testes podem ser realizados no máximo duas horas após a colheita da amostra sem afectar os resultados do teste.

Os testes realizados à cabeceira são especialmente valiosos durante os procedimentos e intervenções terapêuticas que exigem uma monitorização dos anticoagulantes orais bem como são valiosos para a avaliação da hemostase.

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

Os instrumentos HEMOCHRON Jr. utilizam um mecanismo mecânico de coagulação de ponto final, no qual ocorre a formação do coágulo, dentro da cuvete Citrate PT descartável. A seguir à introdução da amostra de sangue total, o instrumento mede precisamente 15 microlitros de sangue e transfere-os automaticamente para o canal de teste, dentro da cuvete de Citrate PT. A amostra de sangue restante, que não é necessária para a realização do teste, é automaticamente introduzida no canal de resíduos da cuvete. A homogeneização da amostra/reagente e o início do teste são também realizados automaticamente e não necessitam da intervenção do operador. Após a homogeneização com o reagente, a amostra é agitada para a frente e para trás dentro do canal de teste e é monitorizada quanto à formação de coágulos.

O mecanismo de detecção de coágulos consiste numa série de detectores ópticos do tipo LED alinhados com o canal de teste da cuvete. É medida a velocidade a que a amostra de sangue se move entre os detectores. Quando começa a formação de coágulos, o fluxo sanguíneo é dificultado e o-movimento abranda. O instrumento reconhece que o ponto final da coagulação foi atingido quando o movimento diminui a um nível inferior de uma taxa predeterminada. Os instrumentos apresentam o resultado numérico do sangue total convertido matematicamente na Relação Normalizada Internacional (INR) e num valor equivalente de plasma. O tempo de Citrate PT do sangue total pode ser apresentado premindo e mantendo premida a tecla **START**.

REAGENTES

Cada caixa de cuvetes de teste de Citrate PT contém:

- 45 bolsas, cada uma contendo uma cuvete de teste HEMOCHRON Jr. Citrate PT e um dessecante

A cuvete do teste de Citrate PT é constituída por uma câmara de teste descartável autónoma, pré-cheia com uma preparação liofilizada de tromboplastina, sais de cálcio, estabilizadores e tampões. Cada cuvete é embalada individualmente numa bolsa. As bolsas com as cuvetes têm gravada a data de validade específica do lote.

PRECAUÇÃO: *Todas as cuvetes de teste usadas devem ser consideradas como potencialmente infecciosas e devem ser manuseadas com cuidado ser eliminadas de acordo com a política de eliminação de resíduos hospitalares.*

ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE

Quando guardadas no frigorífico (2–8°C), as cuvetes de Citrate PT embaladas permanecem estáveis até à data de validade indicada. O armazenamento à temperatura ambiente (15–30°C) é opcional para as cuvetes embaladas e seladas. As cuvetes de HEMOCHRON Jr. Citrate PT não devem ser expostas a temperaturas superiores a 37°C.

NOTA: *Pode atribuir-se uma nova data de validade às cuvetes quando armazenadas à temperatura ambiente, um máximo de 12 semanas, não podendo ultrapassar a data de validade indicada. Esta nova data é necessária caso as armazene à temperatura ambiente, e deve ser indicada preenchendo a secção das informações de armazenamento da tabela "Performance Verified" (Desempenho Verificado), no face lateral de cada caixa de cuvetes. Para um tempo de armazenamento perfeito, é recomendado que a bolsa da cuvete seja aberta imediatamente antes de a utilização.*

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Antes de realizar um ensaio, o utilizador deve consultar o Manual do Operador do HEMOCHRON Jr. II ou HEMOCHRON Jr. Signature para obter instruções de funcionamento detalhadas.

O instrumento é operado inserindo-se uma cuvete no instrumento, permitindo que aqueça, introduzindo uma amostra de sangue total e premindo a tecla **START**. A medição da amostra, a homogeneização da amostra/reagente, o início do teste e a detecção de coágulos irá então dar-se automaticamente.

Material Fornecido

– Cuvetes de teste HEMOCHRON Jr. Citrate PT pré-carregadas

Materiais Necessários mas Não Fornecidos

– Apenas HEMOCHRON Jr. II ou HEMOCHRON Jr. Signature
– Tubo evacuado contendo citrato de sódio (3,8 % ou 3,2 %) e agulha de colheita de sangue
– seringas plásticas de 1 mL ou 3 mL com agulhas de calibre 23 ou 21 (para amostragem de seringa)

COLHEITA DE AMOSTRA E MANUSEAMENTO

Para obter uma amostra de sangue, siga as guidelines NCCLS (H21-A, H47-A e H03-A) e as institucionais, referentes à-obtenção de amostras para a realização de testes de-coagulação.

NOTA: *As amostras de sangue para o teste devem ser colhidas pelo menos 5 minutos antes do teste para permitir a homogeneização adequada do citrato de sódio com a amostra. São obtidos resultados óptimos quando as amostras são testadas no máximo uma hora depois da colheita e quando as amostras são mantidas à temperatura ambiente até serem testadas.*

Não obtenha sangue a partir de uma tubagem heparinizada nem a partir de um bloqueio interior de-heparina.

Quando obtiver amostras através de linhas de sangue interiores, lave muito bem a via de acesso seguindo os procedimentos institucionais.

1. Recolha uma amostra de 5 mL de sangue utilizando uma seringa ou um tubo evacuado.
2. Se for utilizado um sistema de colheita por seringa, coloque uma agulha de transferência na seringa. Perfure cuidadosamente a tampa de um tubo evacuado que contenha citrato de sódio (3,8 % ou 3,2 %) e deixe que o sangue seja introduzido dentro do tubo até o fluxo parar. Homogeneize com suavidade. Elimine a seringa com a agulha de transferência.
3. Antes de testar, inverta o tubo de ensaio pelo menos quatro vezes para assegurar uma homogeneização total da amostra.
4. Aplique uma gota de sangue citratado na cavidade da amostra da cuvete de teste; enchendo desde o fundo da cavidade para cima. Isto pode ser realizado com ou sem uma agulha de transferência. Deve ser acrescentada uma quantidade de sangue suficiente directamente na cavidade da amostra central para a encher completamente até ao topo. Caso uma gota grande de sangue atinja o topo da cavidade da amostra central, empurre o sangue em excesso para dentro da cavidade da amostra exterior.
5. Prima a tecla **START**.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO

Intervalo Normal

Os Sistemas de Microcoagulação HEMOCHRON Jr. foram avaliados utilizando sangue total citratado, fresco, de dadores voluntários normais. Os resultados obtidos utilizando concentrações citratadas de 3,8 % (N=155) e 3,2 % (N=59) estão apresentados na Tabela 1.

NOTA: *Os valores normais apresentados na tabela 1 foram estabelecidos em conformidade com o Índice Internacional de Sensibilidade (International Sensitivity Index - ISI) para o reagente de tromboplastina utilizado no teste de Citrate PT (ISI de aproximadamente 1.0). Para uma utilização clínica considerada óptima, cada instituição deve estabelecer o seu próprio intervalo normal e o intervalo alvo da anticoagulação terapêutica com base na sua população de doentes.*

Tabela 1		3,2 %	3,8 %
INR RESULTADOS	média	1,1	1,0