REF JACT-LR

CE

# Hemochron® Jr.

Whole Blood Microcoagulation Systems

## Low Range Activated Clotting Time (ACT-LR)

**Package Insert**
**English**

## INTENDED USE

The Hemochron® Jr. ACT–LR is a quantitative assay for monitoring heparin anticoagulation during various medical procedures. The ACT–LR demonstrates linear correlation to the anticoagulation effects of heparin up to 2.5 units/ml of blood. It is intended for use in monitoring low to moderate heparin doses frequently associated with procedures such as cardiac catheterization, Extracorporeal Membrane Oxygenation (ECMO), hemodialysis, and Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty. (The Hemochron Jr. ACT+ [JACT+] test is available for monitoring moderate to high levels [1-6 units/ml] of heparin.)

The ACT–LR test is performed on any Hemochron Jr. model using a fresh whole blood sample. Each instrument is portable and is intended for bedside use. The instrument is not intended for home use.

**For *in vitro* Diagnostic Use, For Professional Use, Rx Only**

## SUMMARY AND EXPLANATION

Close monitoring and control of anticoagulation is desirable to ensure clot free blood flow while minimizing bleeding complications following the procedure.[2,3,4]

The Activated Clotting Time (ACT) test first described by Hattersley in 1966,[1] is the method of choice for monitoring heparin therapy during interventional procedures such as PTCA. While heparin therapy is essential in maintaining hemostasis during the procedure, its administration can pose significant risk to the patient. Patients can vary as much as twelve fold in heparin sensitivity.[1] Overdosing heparin can result in dangerous bleeding, whereas underdosing heparin can lead to thrombosis. Therefore, monitoring heparin therapy is vital in guarding against these undesirable side effects.

The ACT-LR test result is automatically converted to a reference Celite® ACT value. Upon test completion, the instrument's digital timer will display only the Celite equivalent ACT value in seconds. Display of this Celite equivalent ACT value improves the ease of test result interpretation.

## PRINCIPLE OF OPERATION

The Hemochron Jr. instruments utilize a mechanical endpoint clotting mechanism in which clot formation occurs within the disposable ACT–LR cuvette. Following whole blood sample introduction, the instrument precisely measures 15 microliters of blood and automatically moves it into the test channel within the ACT–LR cuvette. The remainder of the blood sample, not needed for testing, is automatically drawn into the waste channel of the cuvette. Sample/reagent mixing and test initiation are performed automatically, requiring no operator interaction. After mixing with the reagent, the sample is then moved back and forth within the test channel and monitored for clot formation.

The clot detection mechanism consists of a series of LED optical detectors aligned with the test channel of the cuvette. The speed at which the blood sample moves between the detectors is measured. As clot formation begins, blood flow is impeded and the movement slows. The instrument recognizes that the clot endpoint has been achieved when the movement decreases below a predetermined rate. The instruments report the Celite equivalent ACT value in seconds.

## REAGENTS

Each box of ACT–LR test cuvettes contains:

- 45 pouches, each containing one Hemochron Jr. ACT–LR test cuvette and one desiccant

The ACT–LR test cuvette is a self-contained disposable test chamber preloaded with a dried preparation of Celite, potato dextrin, stabilizers and buffers. Each cuvette is individually packaged in a pouch. Cuvette pouches are stamped with a lot-specific expiration date.

***CAUTION:*** *All used test cuvettes should be considered as potentially infectious, handled with care and disposed of using standard medical waste disposal policy.*

## WARNINGS AND PRECAUTIONS

**Do NOT** use cuvettes that are past their marked expiration date, or which have been improperly stored.

**Do NOT** force a cuvette into the instrument. If resistance to insertion is encountered, gently remove the cuvette and examine the cuvette slot. Remove any obstruction before attempting further use of the instrument (see Service and Maintenance in the appropriate Hemochron Jr. Operator's Manual).

## STORAGE AND STABILITY

When refrigerated (2–8°C), the foil pouched ACT–LR cuvettes are stable until the marked expiration date. Room temperature storage (15–30°C) is optional for unopened, pouched cuvettes. ACT–LR cuvettes should not be exposed to temperatures in excess of 37°C.

***NOTE:*** *Room temperature re-dating is to a maximum of 12 weeks, but must never exceed the marked expiration date. Re-dating is necessary if stored at room temperature, and should be indicated by completing the storage information section of the "Performance Verified" table on the side panel of each cuvette box. The opened pouch, properly folded at the open end, and refrigerated, is stable for seven days. For optimal shelf life, it is recommended to open the cuvette pouch immediately before use.*

## OPERATING INSTRUCTIONS

Before performing any assay, the user should refer to the appropriate Hemochron Jr. Operator's Manual for detailed operating instructions.

The instrument is operated by inserting a cuvette into the instrument, allowing it to warm, introducing a whole blood sample and depressing the **START** key. Sample measurement, sample/reagent mixing, test initiation and clot detection will then proceed automatically.

***Material Provided***

- Preloaded Hemochron Jr. ACT–LR test cuvettes

***Material Required, but Not Provided***

- Hemochron Jr., Hemochron Jr. II or Hemochron Jr. Signature
- 1 mL or 3 mL plastic syringes with 23 or 21 gauge needle (optional)

## SAMPLE COLLECTION AND HANDLING

To obtain blood specimen, follow institutional and NCCLS(H21-A3) guidelines for obtaining samples for coagulation testing.

Do not collect fresh whole blood samples using glass blood collection tubes.

Do not obtain blood from heparinized access line, lock or indwelling heparin lock.

When sampling through indwelling blood lines, flush access port thoroughly following institutional procedures.

1. Obtain 0.2 mL of blood with the syringe.
2. Immediately dispense one drop of blood into the sample well of the test cuvette; filling from the bottom of the well up. This may be done either with or without a transfer needle. A sufficient quantity of blood must be added directly to the center sample well to fill it flush to the top. Should a large drop of blood extend above the center sample well, push it over into the outer sample well.
3. Depress the **START** key.

## QUALITY CONTROL (QC)

Routine quality control testing and tracking should be part of a comprehensive quality assurance program. Hemochron Jr. quality control products are available to make routine QC convenient and affordable.

***Daily QC of the Instrument***

The Hemochron Jr. should be quality controlled at two levels of control once every 8 hours of operation. To assist in accomplishing daily QC, Electronic Quality Control is available and can provide a two-level check of the instrument. Refer to the Operator's Manual for the specific Hemochron Instrument in use for detailed instructions.

***QC of the Hemochron Jr. Test Cuvettes***

Each ***lot*** of Hemochron Jr. ACT–LR cuvettes should be validated for performance at two liquid quality control levels:

- When a new shipment is received, AND
- Once per 30 calendar days thereafter

Following successful performance validation as above, the cuvettes will not require any further liquid quality control unless a shift in clinical results is suspected.

Performance validation can be accomplished using the appropriate Hemochron Jr. Microcoagulation Whole Blood Quality Control products. Acceptable performance ranges and how to apply them for the ACT–LR test cuvettes are

included with each quality control product kit.

## LIMITATIONS

Celite equivalent ACT values over 400 seconds are not reported on the instrument. Instead, an "Out of range – Hi" message will be displayed.

***NOTE:*** *Celite equivalent ACT values that exceed 400 seconds due to extremely high sensitivity to heparin in the patients, do not represent an error in the test.*

The Hemochron Jr. ACT–LR test uses Celite as the activator which is known to be artificially prolonged by aprotinin, a protease inhibitor.[6] The ACT–LR is not intended for use with these patients.

Values displayed at the conclusion of the assay are Celite equivalent Hemochron ACT (CA510) values. The equivalent value is generated based on the correlation established with clinical patients and shown in Fig. 3. Even in the presence of a high degree of correlation (r=0.95), actual values of the two assays are statistically similar, not identical. The clinician must interpret the clotting time result in light of the patient's clinical situation.

Samples with a hematocrit less than 20% or greater than 55% are not recommended due to an optical density outside the level of detection of the instrument.

The Hemochron Jr. ACT–LR is affected by poor technique including blood collection and the transfer of blood to the sample well. The quality of the blood specimen may be affected by:

– Foaming or hemolysis of the sample

– Clotted or partially clotted blood

– Unsuspected anticoagulation

– Lupus anticoagulant

As with all diagnostic tests, Hemochron Jr. test results should be scrutinized in light of a specific patient's condition and anticoagulant therapy. Any results exhibiting inconsistency with the patient's clinical status should be repeated or supplemented with additional test data.

## PERFORMANCE CHARACTERISTICS

***NOTE:*** *The following data were collected using the Hemochron Jr. with ACT-LR cuvettes.*

***Normal Range***

The Hemochron Jr. was evaluated using fresh whole blood from normal volunteer donors (N=21) and cardiac and ECMO adult patients not receiving heparin treatment (N=20). The results are shown in Celite equivalent Hemochron ACT values.

| | N | Mean (secs) | SD (secs) | Range (mean ±2SD) |
|---|---|---|---|---|
| Normal Donors | 21 | 131 | 9 | 113 – 149 |
| Non–heparin Patients | 20 | 129 | 20 | 89 – 169 |

***NOTE:*** *Each institution should establish its own normal range and target range of therapeutic anticoagulation based on their patient population.*

***Ranges for Indwelling Vascular Sheath Removal***

The Hemochron Jr. was evaluated on 20 patients at the completion of Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty or 5 to 24 hours following the heparin bolus in the CCU when the indwelling vascular sheath was to be removed. The reference Celite ACT (Hemochron) was compared using a split blood sample.

Clotting Time at Sheath Removal

ACT–LR

| N | Mean (secs) | SD (secs) | Range (mean ±2SD) |
|---|---|---|---|
| 20 | 145 | 31 | 83 – 207 |

Hemochron Celite ACT

| N | Mean (secs) | SD (secs) | Range (mean ±2SD) |
|---|---|---|---|
| 20 | 142 | 37 | 68 – 216 |

***NOTE:*** *Each institution should establish its own target range for sheath removal based on their patient population.*

***Heparin sensitivity (Fig. 1)***

An *in vitro* heparin sensitivity curve was generated by adding increasing amounts of heparin (0 to 2.5 units/ML) to aliquots of blood samples from 9 normal donors. The Hemochron Jr. ACT–LR and Hemochron Celite–activated ACT were performed using split blood samples. Both tests were performed in duplicate. Clotting times from samples of 9 donors at each heparin level were averaged.

***NOTE:*** *This graph serves as an example only. Each patient demonstrates a unique heparin dose response curve.*

***Correlation between the Hemochron Jr. ACT–LR and the reference Hemochron ACT***

The Hemochron Jr. ACT–LR test is optimized for sensitivity of response over a range of heparinization from 0 to 2.5 units/ml. Currently, the most common method for heparin monitoring in this heparinization range is the Hemochron Celite–activated ACT test and the Hemochron glass–particle–activated ACT (P214). The correlation of the Hemochron Jr. ACT–LR and these reference ACT tests was determined.

I. Correlation between the Hemochron Jr. ACT–LR and the Hemochron Celite–activated ACT

A. Laboratory (*in vitro*) Studies (Fig. 2)

Fresh blood was obtained from 9 normal donors. Aliquots of each blood sample were heparinized *in vitro* to 6 levels of heparin concentration, up to 2.5 units/ml. Each sample was tested using the Hemochron Jr. ACT–LR test and the reference Celite ACT. A total of 40 paired data points was collected and analyzed (r=0.96).

The Hemochron Jr. ACT–LR was converted to the Celite equivalent Hemochron ACT value based on the regression equation established from clinical studies as shown in Fig. 3.

B. Clinical (*in vivo*) Studies (Fig. 3)

Blood samples were collected from 17 cardiovascular patients before heparinization and following heparinization during cardiac catheterization and angioplasty. The total number of samples collected was 71. Samples were simultaneously evaluated using the Hemochron Jr. ACT–LR and the reference Celite ACT. A linear regression equation was generated from this correlation (r=0.95) and the Celite equivalent ACT value corresponding to the ACT–LR clotting time was determined. This conversion was subsequently programmed into all models of the Hemochron Jr. such that at the completion of the ACT–LR assay the Celite equivalent ACT value is displayed.

II. Correlation between the Hemochron Jr. ACT–LR and the Hemochron glass-particle-activated ACT

The Hemochron glass–particle–activated ACT (P214) is a preferred method of ACT clotting time determination in ECMO and dialysis. Other methods include the kaolin or Celite activated ACT.

A. Laboratory (*in vitro*) Studies (Fig. 4)

The correlation of the Hemochron Jr. ACT–LR and the glass–particle–activated ACT was demonstrated in an *in vitro* laboratory study. Fresh blood was obtained from 5 normal donors. Aliquots of each blood sample were heparinized *in vitro* to heparin concentrations up to 2.5 units/ml. Each sample was tested using the Hemochron Jr. ACT–LR and the glass–particle ACT (P214). A total of 27 paired data points was collected and analyzed (r=0.95).

B. Clinical (*in vivo*) Study in ECMO patients (Fig. 5)

Heparin anticoagulation was monitored hourly for 2 to 48 hours in 13 ECMO patients using a glass-particle-activated ACT (P214). The patient population included 5 pediatrics (2 months – 15 years old) and 8 adults (22 – 63 years old). Split samples were simultaneously evaluated with the Hemochron Jr. ACT–LR. A total of 99 paired data points was obtained and the correlation between the two tests was analyzed (r=0.81 in adults, r=0.61 in pediatrics, r=0.72 combined).

C. Clinical (*in vivo*) Study in Dialysis patients (Fig. 6)

Heparin anticoagulation was monitored every 30 minutes for 1 to 2 hours in 21 adult dialysis patients (30 to 85 years old) using a commercially available kaolin-activated ACT. Split samples were simultaneously evaluated with the Hemochron Jr. ACT-LR. A total of 51 paired data points was obtained and the correlation between the two tests analyzed (r=0.92).

## PRECISION

***A. Within–Day and Day–to–Day Precision***

The precision of the Hemochron Jr. was evaluated by performing multiple Hemochron Jr. ACT–LR tests using non–heparinized (Normal) and heparinized (Abnormal) whole blood control materials. Assays were performed on three separate days using three analyzers with the following results:

| | N | Mean (sec) | SD (sec) | CV (%) |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 27 | 208 | 14 | 6.7 |
| Abnormal | 27 | 299 | 11 | 3.8 |

Repeated testing was performed on a single Hemochron Jr. on three consecutive days yielding precision results on each day as follows:

| | N | Normal Mean (sec) | SD (sec) | CV (%) | Abnormal Mean (sec) | SD (sec) | CV (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 3 | 202 | 7.9 | 3.9 | 292 | 17.6 | 6.0 |
| Day 2 | 3 | 217 | 18.7 | 8.6 | 300 | 1.5 | 0.5 |
| Day 3 | 3 | 214 | 11.7 | 5.5 | 303 | 7.2 | 2.4 |
| Total | 9 | 211 | 13.4 | 6.4 | 298 | 10.8 | 3.6 |

***B. Correlation of Duplicate Testing***

Hemochron Jr. ACT–LR was performed in duplicate in both *in vitro* and *in vivo* studies.

1. *In vitro* duplicate testing was performed using blood samples from 15 normal donors. Heparin was added to aliquots of the samples to achieve concentrations ranging from 0 to 2.5 units/ml blood. A total of 93 paired data points were collected. A correlation of r=0.97 with a slope of 0.99 was obtained between duplicate tests. (Fig. 7)
2. *In vivo* duplicate testing was performed in 25 cardiovascular patients with ACT results ranging from 87 to 400 seconds. A total of 76 paired data points were collected. A correlation of r=0.93 with a slope of 0.81 was obtained between duplicate tests. (Fig. 8)

## BIBLIOGRAPHY


1. Hattersley PG: Activated coagulation time of whole blood. JAMA 196:436, 1966.
2. Wang J–S, Lin C–Y, Hung W–T, Thisted RA, Karp RB: In Vitro effects of aprotinin on activated clotting time measured with different activators. J Thorac Cardiovasc Surg 104, 4: 1135–1140, 1992.
3. National Committee for Clinical Laboratory Standards. Collection, Transport, and Preparation of Blood Specimens for Coagulation Testing and Performance of Coagulation Assays; Approved Guideline. CLSI document H21-A.


## Low Range Activated Clotting Time
## Aktiveret Koagulationstid i Lavområde (ACT-LR)

**Indlægsseddel**
**Dansk / Danish**

## TILSIGTET BRUG

**Hemochron® Jr. ACT–LR er en kvantitativ analyse til overvågning af heparin antikoagulation under forskellige medicinske procedurer. ACT–LR demonstrerer lineær korrelation med heparins antikoagulerende virkninger op til 2,5 enheder/ml blod. Den er beregnet til brug ved overvågning af lave til moderate heparin doser, som ofte er forbundet med visse procedurer, f.eks. hjertekateterisation, ekstrakorporal membranoxygenering (ECMO), hæmodialyse og perkutan transluminal koronar angioplastik (PTCA). (Hemochron Jr. ACT+ [JACT+] testen er tilgængelig til overvågning af moderate til høje heparinniveauer [1-6 enheder/ml].)**

**ACT–LR testen kan udføres på enhver Hemochron Jr. model vha. en frisk fuldblodsprøve. Instrumenterne er bærbare og beregnet til brug ved sengelejе. Instrumenterne er ikke beregnet til hjemmebrug.**

## Til *in vitro* diagnostisk brug

## OVERSIGT OG FORKLARING

**Nøje overvågning og kontrol med antikoagulation er hensigtsmæssigt for at sikre koagelfri blodstrømning samtidig med, at blødningskomplikationer mindskes efter proceduren.[2,3,4]**

**Testen for aktiveret koagulationstid (ACT), som først blev beskrevet af Hattersley i 1966,[1] er den foretrukne metode til at overvåge heparinbehandling under interventionelle procedurer som f.eks. PTCA. Skønt heparinbehandling er afgørende for at vedligeholde hemostase under proceduren, kan indgivningen udgøre en væsentlig risiko for patienten. Patienters sensitivitet over for heparin kan variere kraftigt (op til tolv gange).[1] For store doser heparin kan medføre farlig blødning, mens for små doser heparin kan medføre trombose. Derfor er det livsvigtigt at overvåge heparinbehandling til sikring mod disse uønskede bivirkninger.**

**ACT-LR testresultatet omregnes automatisk til en Celite® ACT referenceværdi. Når testen er færdig, viser instrumentets digitale timer kun denne Celite-ækvivalente ACT-værdi, som opgives i sekunder. Visning af den Celite-ækvivalente ACT-værdi gør det lettere at fortolke testresultatet.**

## FUNKTIONSPRINCIP

**Hemochron Jr. instrumenter benytter en mekanisk slutpunkts koagulationsmekanisme, hvor der opstår en koageldannelse inden i ACT–LR-kuvetten til engangsbrug. Efter indførsel af fuldblodsprøven, afmåler instrumentet nøjagtigt 15 mikroliter blod, og fører det automatisk ind i testrillen inden i ACT-LR-kuvetten. Resten af blodprøven, som ikke er nødvendig til testning, bliver automatisk suget ind i kuvettens affaldskanal. Blanding af prøve/reagens samt påbegyndelse af testen udføres automatisk, og kræver ingen handling fra brugerens side. Efter prøven er blandet med reagenset, flyttes den frem og tilbage inden i testrillen, hvor den overvåges for koageldannelse.**

**Koageldetektionsmekanismen består af række optiske LED-detektorer, som flugter med kuvettens testrille. Hastigheden, som blodprøven bevæger sig med mellem detektorerne, måles. Efterhånden som koageldannelsen begynder, hæmmes blodstrømmen og bevægelsen bliver langsommere. Instrumentet registrerer, at koagelslutpunkt er opnået , når bevægelsen falder til under en fastlagt hastighed. Instrumentet registrerer den Celite-ækvivalente ACT-værdi i sekunder.**

## REAGENSER

**Hver enkelt kasse med ACT–LR-test-kuvetter indeholder:**

- **45 poser, som hver indeholder en Hemochron Jr. ACT-LR-testkuvette og et tørremiddel.**

**ACT–LR-test-kuvetten er et lukket testkammer til engangsbrug, hvor der på forhånd er tilsat et tørret præparat af kaolin, fosfolipid, calciumsalte, stabiliseringsmidler og puffere. Hver kuvette er individuelt indpakket i en pose. Kuvetteposerne er påtrykt en partispecifik udløbsdato.**

**Instrumentet betjenes ved at indsætte en kuvette i instrumentet, lade kuvetten varme op, tilsætte en fuldblodsprøve og trykke på START-tasten. Afmåling af prøve, blanding af prøve og reagens, påbegyndelse af testen samt koageldetektion foregår herefter automatisk.**

***Vedlagt Materiale***

- **Hemochron Jr. ACT-LR-testkuvetter med tilsat præparat**

***Nødvendigt materiale, som ikke er vedlagt***

- **Hemochron Jr., Hemochron Jr. II eller Hemochron Jr. Signature**
- **1 ml eller 3 ml plastiksprøjte, 23 eller 21 gauge kanyle (valgfri)**

## PRØVEINDSAMLING OG HÅNDTERING

**Institutions- og CLSI- (H21-A) retningslinier for indsamling af blod til koagulationstestning skal følges.**

**Fuldblod må ikke indsamles i blodopsamlingsrør af glas.**

**Blod må ikke indsamles fra en hepariniseret adgangsslange, lås eller indlagt heparinlås.**

**Når der indsamles blod gennem indlagte katetre, skal adgangsporten skylles omhyggeligt i henhold til institutionsprocedurer.**

1. **Indsaml 0,2 ml blod med sprøjten.**
2. **Tilsæt en dråbe blod i testkuvettens prøvebrønd; idet den fyldes fra bunden af brønden og op. Dette kan gøres enten med eller uden en overførselskanyle. Der skal tilsættes tilstrækkeligt med blod direkte i midterprøvebrønden til at fylde den helt op til randen. Hvis en stor dråbe blod breder sig over midterprøvebrønden, skubbes den over i den udvendige prøvebrønd.**
3. **Tryk på START-tasten.**

## KVALITETSKONTROL (QC)

**Rutinemæssig kvalitetskontrol og sporing bør være en del af et omfattende kvalitetssikringsprogram. Der findes produkter til kvalitetskontrol af Hemochron Jr., som letter rutinemæssig kvalitetskontrol (QC) og er prismæssigt overkommelig.**

***Daglig kvalitetskontrol af instrumentet***

**Hemochron Jr. bør gennemgå kvalitetskontrol på to kontrolniveauer, hver gang det har været i drift i 8 timer. Til hjælp i udførelsen af den daglige kvalitetskontrol findes der elektroniske kvalitetskontrolsystemer, som kan kontrollere instrumentet på to niveauer. Se brugermanualen for det bestemte Hemochron-instrument, der anvendes, for detaljerede anvisninger.**

***Kvalitetskontrol af Hemochron Jr. testkuvetterne***

**Hvert *parti* Hemochron Jr. ACT-LR kuvetter bør præstationsvalideres på to kvalitetskontrolniveauer for væsker:**

- **Når der modtages en ny forsendelse OG**
- **én gang hver 30 kalenderdage derefter**

**Hvis præstationsvalideringen viser tilfredsstillende resultater, er det ikke nødvendigt at foretage yderligere kvalitetskontrol af væsken, med mindre der opstår afvigelser i de kliniske resultater.**

**Præstationsvalidering kan foretages ved brug af de relevante Hemochron Jr. produkter til mikrokoagulationskvalitetskontrol fuldblod. Acceptable referenceområder og hvordan de anvendes på ACT-LR testkuvetterne er vedlagt hvert produktkit til kvalitetskontrol.**

## BEGRÆNSNINGER

**Celite-ækvivalente ACT værdier over 400 sekunder rapporteres ikke på instrumentet. I stedet vises meddelelsen "Out of range – Hi" (Udenfor området – Høj).**

***BEMÆRK:*** *Celite-ækvivalente ACT-værdier, som overstiger 400 sekunder pga. særdeles høj sensitivitet overfor heparin hos patienterne, betyder ikke, at der er fejl i testen.*

**Hemochron Jr. ACT–LR-testen bruger Celite som aktivator, som det er blevet påvist at protease inhibitoren, aprotinin, kunstigt forlænger.[6] ACT–LR er ikke beregnet til brug hos disse patienter.**

**Alvorens een assay uit te voeren dient de gebruiker de Bedieningshandleiding van de betreffende Hemochron Jr. te raadplegen voor gedetailleerde bedieningsaanwijzingen.**

**De bediening van het instrument gaat als volgt in zijn werk: breng een cuvet in het instrument aan, geef deze de tijd om op te warmen, breng een volbloedmonster aan en druk op de START-toets. De meting van het monster, het mengen van het monster met het reagens, de aanvang van de test en het waarnemen van de stolling vinden vervolgens automatisch plaats.**

***Bijgeleverd materiaal***

- **Gevulde Hemochron Jr. ACT–LR-testcuvettes**

***Benodigd (maar niet bijgeleverd) materiaal***

- **Hemochron Jr., Hemochron Jr. II of Hemochron Jr. Signature**
- **plastic injectienazalden van 1 ml of 3 ml met naald nr. 23 of 21 (facultatief)**

## AFNAME EN HANTERING VAN MONSTERS

**Bij het nemen van bloedmonsters dienen de richtlijnen van de instelling en het CLSI (H21-A) voor het nemen van monsters voor stollingstesten opgevolgd te worden.**

**Bij het nemen van verse volbloedmonsters dienen geen glazen bloedbuizen gebruikt te worden.**

**Neem geen bloed af via een gehepariniseerde toegangslijn, lock of permanente heparinelock.**

**Wanneer het monster via permanente bloedlijnen wordt genomen, dient de toegangspoort grondig doorgespoeld te worden overeenkomstig de procedures van de instelling.**

1. **Neem 0,2 ml bloed af met de injectienaald.**
2. **Plaats onmiddellijk één druppel bloed in de monsteropening van de testcuvet; begin hierbij onder aan de opening. Dit kan met of zonder verloopnaald gedaan worden. Breng voldoende bloed direct in de middelste monsteropening aan om deze tot gelijk met de bovenkant te vullen. Mocht een grote druppel bloed boven de middelste monsteropening uitsteken, dan dient u deze naar de buitenste monsteropening te schuiven.**
3. **Druk op de START-toets.**

## KWALITEITSCONTROLE (QC)

**In het kader van een uitgebreid kwaliteitsborgingsprogramma moeten routineuze kwaliteitscontroletesten worden uitgevoerd en moeten individuele producten worden bijgehouden. Er zijn Hemochron Jr.-kwaliteitscontroleproducten verkrijgbaar, waarmee routineuze kwaliteitscontrole gemakkelijk en betaalbaar is.**

***Dagelijkse kwaliteitscontrole van het instrument***

**De Hemochron Jr. moet eens per acht bedrijfsuren op twee controleniveaus een kwaliteitscontrole ondergaan. Om te helpen bij de dagelijkse kwaliteitscontrole is er de zgn. Electronic Quality Control verkrijgbaar, waarmee het instrument op twee niveaus gecontroleerd kan worden. Raadpleeg de bedieningshandleiding voor het specifieke gebruikte Hemochron Instrument voor gedetailleerde instructies.**

***Kwaliteitscontrole van de Hemochron Jr.-testcuvettes***

**Elke *partij* Hemochron Jr. ACT–LR cuvettes dient gevalideerd te worden voor prestatie op twee vloeistofkwaliteitscontroleniveaus:**

- **Na ontvangst van een nieuwe zending, EN**
- **Eén keer per 30 kalenderdagen daarna**

**Na een succesvolle prestatievalidatie als boven, hebben de cuvettes verder geen vloeistofkwaliteitscontrole nodig tenzij een achteruitgang in klinische resultaten wordt vermoed.**

**Prestatievalidatie kan worden bereikt met behulp van de juiste Hemochron Jr. Microcoagulation Whole Blood Quality Control-producten. Elke set kwaliteitscontroleproducten bevat aanvaardbare prestatiebereiken en hoe deze toe te passen voor de ACT–LR testcuvettes.**

## BEPERKINGEN

**Celite-equivalente ACT-waarden van meer dan 400 seconden worden niet weergegeven op het instrument. In plaats daarvan wordt er een bericht "Out of range – Hi" (Buiten bereik - hoog) weergegeven.**

***NB:*** *Celite-equivalente ACT-waarden van meer dan 400 seconden vanwege uiterst hoge gevoeligheid voor heparine bij bepaalde patiënten duiden niet op een fout in de test.*

**Bij de Hemochron Jr. ACT–LR-test wordt Celite als activator gebruikt; deze wordt zoals bekend kunstmatig verlengd door aprotinine, een antiprotease[6]. De ACT–LR dient niet gebruikt te worden bij deze patiënten.**

**De waarden die aan het einde van de assay worden weergegeven zijn Celite-equivalente Hemochron ACT (CA510)-waarden. De equivalente waarde wordt gegenereerd op basis van de correlatie die bij klinische patiënten is vastgesteld; zie Fig. 3. Zelfs bij een sterke correlatie (r=0,95) zijn de werkelijke waarden van de twee assays statistisch gelijkssoortig, maar niet identiek. De clinicus moet de resulterende stolltijd interpreteren in de context van de klinische situatie van de patiënt.**

**Monsters met een hematocriet van minder dan 20% of meer dan 55% worden niet aanbevolen, omdat hun optische dichtheid het detectieniveau van het instrument te buiten gaat.**

**De Hemochron Jr. ACT–LR wordt beïnvloed door foutieve technieken (bijv. tijdens de bloedafname en het overbrengen van het bloed naar de monsteropening). De kwaliteit van het bloedmonster kan beïnvloed worden door het volgende:**

- **Schuimen of hemolyse van het monster**
- **Gestold of gedeeltelijk gestold bloed**
- **Anticoagulantia waarvan het medisch personeel zich niet bewust is**
- **Lupus anticoagulans**

**Zoals bij alle diagnostische testen het geval is, moeten de met de Hemochron Jr. behaalde testresultaten in de context van de aandoening en de anticoagulantiatherapie van de individuele patiënt worden gezien. Alle testen die** resultaten opleveren die inconsistent zijn met de klinische status van de patiënt moeten worden herhaald of worden aangevuld met verdere testgegevens.

**laboratorieundersøgelse. Der blev indsamlet frisk blod fra 5 raske donorer. Afmålinger af hver *titrepunkt* blev hepariniseret in vitro til heparinkoncentrationer på op til 2,5 enheder/ml. Hver prøve blev testet vha. Hemochron Jr. ACT-LR og glaspartikel ACT (P214). Der blev indsamlet og analyseret i alt 27 parvise datapunkter (r=0,95).**

**B. Klinisk (in vivo) undersøgelse hos ECMO patienter (fig. 5)**

**Heparin-antikoagulation blev overvåget hver time i 2 til 48 timer hos 13 ECMO patienter vha. en glaspartikel aktiveret ACT (P214). Patientgruppen omfattede 5 pædiatriske (2 måneder – 15 år gamle) og 8 voksne (22 – 63 år gamle) patienter. Delte prøver blev evalueret samtidigt med Hemochron Jr. ACT–LR. Der blev indsamlet i alt 99 parvise datapunkter, og korrelationen mellem de to tests blev analyseret (r=0,81 hos voksne, r=0,61 hos børn, r=0,72 kombineret).**

**C. Klinisk (in vivo) undersøgelse hos dialysepatienter (fig.6)**

**Heparin-antikoagulation blev overvåget hver halve time i 1 til 2 timer hos 21 voksne dialysepatienter (30 til 85 år gamle) vha. en kommercielt tilgængelig kaolinaktiveret ACT. Delte prøver blev evalueret samtidigt med Hemochron Jr. ACT-LR. Der blev indsamlet i alt 51 parvise datapunkter, og korrelationen mellem de to tests blev analyseret (r=0,92).**

## PRÆCISION

***A. Præcision indenfor-én-dag og fra dag-til-dag***

**Præcisionen af Hemochron Jr. blev evalueret ved at udføre flere Hemochron Jr. ACT-LR tests vha. ikke-hepariniserede (normale) og hepariniserede (anormale) fuldblods kontrolmaterialer. Der blev udført analyser på tre forskellige dage vha. tre analysatorer med de følgende resultater:**

| | N | Middelværdi (sek.) | SD (sek.) | CV (%) |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 27 | 208 | 14 | 6,7 |
| Anormal | 27 | 299 | 11 | 3,8 |

**Gentagen testning blev udført på en enkelt Hemochron Jr. i tre på hinanden følgende dage, hvilket gav følgende præcisionsresultater for hver dag:**

| | N | Normal Middelværdi (sek.) | Normal SD (sek.) | Normal CV (%) | Anormal Middelværdi (sek.) | Anormal SD (sek.) | Anormal CV (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag 1 | 3 | 202 | 7,9 | 3,9 | 292 | 17,6 | 6,0 |
| Dag 2 | 3 | 217 | 18,7 | 8,6 | 300 | 1,5 | 0,5 |
| Dag 3 | 3 | 214 | 11,7 | 5,5 | 303 | 7,2 | 2,4 |
| Totaal | 9 | 211 | 13,4 | 6,4 | 298 | 10,8 | 3,6 |

***B. Korrelation af dobbelttestning***

**Hemochron Jr. ACT–LR blev udført dobbelt i både i in vitro og i in vivo undersøgelser.**

1. **In vitro dobbelttestning blev udført med bloddprøver fra 15 raske donorer. Der blev tilsat heparin til afmålinger af prøverne for at opnå koncentrationer fra 0 til 2,5 enheder/ml blod. Der blev indsamlet i alt 93 parvise datapunkter. Der blev påvist en korrelation på r=0,97 med en hældning på 0,99 mellem dobbelt testene. (Fig. 7)**
2. **In vivo dobbelttestning blev udført hos 25 kardiovaskulære patienter med ACT resultater fra 87 til 400 sekunder. Der blev indsamlet i alt 76 parvise datapunkter. Der blev påvist en korrelation på r=0,93 med en hældning på 0,81 mellem dobbelttestene. (Fig. 8)**

## Low Range Activated Clotting Time
## Low Range aktivoitu hyytymisaika

**Pakkauslehtinen**
**Suomi / Finnish**

## KÄYTTÖTARKOITUS

**Hemochron® Jr. ACT–LR on kvantitatiivinen määritysmenetelmä, jolla seurataan hepariiniantikoagulaatiota erilaisten hoitotoimenpiteiden aikana. ACT–LR-määritys korreloi lineaarisesti hepariinin antikoagulaatiovaikutuksen kanssa aina pitoisuuteen 2,5 yks/ml verta. Se on tarkoitettu käytettäväksi pienten ja kohtalaisten hepariiniannosten antikoagulaatiovaikutuksen seurantaan sydänkatetrisaation, kehonulkoisen hapetuksen (ECMO), hemodialyysin ja PCTA:n yhteydessä. (Hemochron Jr. ACT+ [JACT+] -määritys on saatavana kohtalaisten tai suurten hepariinipitoisuuksien [1–6 yks/ml] seurantaan.)**

**ACT–LR -määritys voidaan suorittaa millä tahansa Hemochron Jr. -mittarilla tuoreesta kokoverinäytteestä. Laitteet ovat siirrettäviä ja niitä voidaan käyttää vuodeosastoilla. Näitä laitteita ei ole tarkoitettu kotikäyttöön.**

**Diagnostiseen *in vitro* -käyttöön.**

## YHTEENVETO JA MENETELMÄN KUVAUS

**Antikoagulaation tarkka seuranta on tärkeää kun halutaan varmistaa, että veri virtaa vapaasti ilman hyytymiä ja samalla vähentää vuotoriskiä toimenpiteen jälkeen.[2,3,4]**

**Hattersley (1966),[1] kuvasi ensimmäisenä hyytymisajan määritysmenetelmän Activated Clotting Time (ACT) -aktivoitu hyytymisaika, joka on paras menetelmä hepariinihoidon seuraamiseksi interventiotoimenpiteiden, kuten PTCA:n aikana. Vaikka hepariinihoito on välttämätön hemostaasin ylläpitämisessä toimenpiteen aikana, sen antoon voi liittyä merkittäviä riskejä potilaalle. Potilaiden hepariiniherkkyys voi vaihdella jopa 12-kertaisesti.[1] Hepariinin yliannostelu voi johtaa vaaralliseen verenvuotoon, kun taas sen aliannostus voi johtaa tromboosien muodostumiseen. Sen vuoksi hepariinin vaikutuksen seuranta on elintärkeää näiden haittavaikutusten välttämiseksi.**

**ACT-LR -määritykseen tulos muunnetaan automaattisesti Celite® ACT -viitearvoksi. Kun määritys on suoritettu, mittarin digitaalinen ajastin näyttää vain vastaavan Celite ACT -arvon sekunteina. Tämän vastaavan Celite ACT -arvon näytö helpottaa tulosten tulkintaa.**

## TUTKIMUKSEN PERIAATE

**Hemochron Jr. -mittareissa määritykseen käytetään mekaanista hyytymisen päätepistettä, jossa hyytyminen tapahtuu kertakäyttöisessä ACT–LR-kyvetissä. Kokoverinäytteen laittamisen jälkeen laite mittaa tarkasti 15 mikrolitraa verta ja siirtää sen automaattisesti ACT–LR-kyvetissä olevaan testikanavaan. Jäljelle jäänyt verinäyte, jota ei tarvita määrityksessa, vedetään automaattisesti kyvetin jätekanavaan. Näyte ja reagenssi sekoittuvat, ja määritys käynnistyy automaattisesti ilman käyttäjältä vaadittavia toimenpiteitä. Kun reagenssi on sekoitettu näytteeseen, näytettä liikutetaan edestakaisin testikanavassa samalla kun tarkkaillaan hyytymän muodostumista.**

**Hyytymän havaitsemismekanismi koostuu sarjasta optisia valodiodi-ilmaisimia, jotka sijaitsevat pitkin kyvetin testikanavaa. Mittari määrittää verinäytteen liikkumisnopeuden ilmaisimien välillä. Kehittyvä hyytymä haittaa verenvirtausta, ja liike hidastuu. Mittari havaitsee, että hyytymän loppupiste on saavutettu, kun liike hidastuu alle ennalta määriteltyn nopeuden. Mittari näyttää vastaavan Celite ACT -arvon sekunteina.**

## REAGENSSIT

**ACT–LR-kyvettilaatikon sisältö on seuraava:**

- **45 kpl yhden Hemochron Jr. ACT–LR -kyvetin ja yhden ku

# Low Range Activated Clotting Time
# Aktivert koagulasjonstid for nedre verdiområde (ACT-LR)

## Pakningsvedlegg
**Norsk / Norwegian**

## TILTENKT BRUK

Hemochron® Jr. ACT-LR er en kvantitativ analyse for overvåkning av koagulasjonshemming med heparin under ulike medisinske prosedyrer. ACT-LR har en lineær korrelasjon til effekten av koagulasjonshemming med heparin i opptil 2,5 enheter/ml blod. Den er ment til bruk for overvåkning av lave til moderate heparindoser som ofte forbindes med operasjoner som hjertekateterisering, ekstrakorporal membranoksygenering (ECMO), hemodialyse og perkutan transluminal hjerteangioplastikk. (Hemochron Jr. ACT+-testen [JACT+] kan overvåke moderate til høye nivåer [1–6 enheter/ml] heparin.)

ACT–LR testen utføres på en hvilken som helst Hemochron Jr.-modell, ved hjelp av en fersk fullblodprøve. Hvert instrument er bærbart og er beregnet for bruk på sengeliggende pasienter. Instrumentet er ikke beregnet for hjemmebruk.

**For diagnostisk *in vitro*-bruk, for profesjonelt bruk, kun Rx**

## OPPSUMMERING OG FORKLARING

Nøye overvåkning og kontroll av koagulasjonshemmingen er fordelaktig, da det sikrer koagulasjonsfri flyt, samtidig som blodningskomplikasjoner etter operasjonen minimeres.[1,2,3,4]

Testen for aktivert koagulasjonstid (ACT), som først ble beskrevet av Hattersley i 1966[1], er den foretrukne fremgangsmåten for overvåkning av heparinterapi ved intervensjonelle operasjoner, som PTCA. Selv om heparinbehandling er viktig for at hemostasen skal overholdes under denne operasjonen, kan administrering av den medføre en betydelig fare for pasienten. Pasienter kan variere så mye som tolv ganger i heparinsensitiviteten.[4] Overdosering av heparin kan føre til farlig blødning, mens underdosering av heparin kan føre til trombose. Derfor er overvåking av heparinbehandling livsviktig for forebygging av disse uønskede bivirkningene.

ACT-LR-testen konverteres automatisk til en Celite® ACT-referanseverdi. Ved fullføring av testen vil instrumentets digitale tidtaker kun vise kiselgurekvivalent ACT-verdi i sekunder. Når denne kiselgurekvivalente ACT-verdien vises, er det lettere å tolke testresultatene.

## BRUKSPRINSIPP

Hemochron Jr.-instrumenter bruker en mekanisk endepunkt-koagulerende mekanisme, der koagulasjonen skjer innenfor en ACT–LR-kyvette for engangsbruk. Etter innføring av en fullblodprøve, gir instrumentet en presis måling av 15 mikroliter blod, som flyttes automatisk inn i testkanalen i ACT–LR-kyvetten. Resten av blodprøven, som ikke brukes til testing, trekkes automatisk inn i avfallskanalen i kyvetten. Blanding og testing av prøven/reagensen utføres automatisk, uten behov for inngripen fra brukeren. Etter blanding med reagensen, flyttes prøven frem og tilbake innenfor testkanalen mens prøven overvåkes for koagulasjon.

Koagulasjonspåvisningsmekanismen består av en serie LED-optiske detektorer som er innstilt mot kyvettens testkanal. Det utføres en måling av hastigheten blodprøvene beveger seg gjennom detektorene. Når koagulasjonen starter, hindres blodstrømningen slik at bevegelseshastigheten reduseres. Instrumentet gjenkjenner at koagulasjonspunktet er oppnådd når bevegelseshastigheten går lavere enn en forhåndsdefinert strømningshastighet. Instrumentene rapporterer kiselgurekvivalent ACT-verdi i sekunder.

## REAGENSER

Hver boks med kyvetter for ACT–LR-testing inneholder:

- 45 poser som inneholder en Hemochron Jr.-kyvette for ACT–LR-testing og ett tørkemiddel

Kyvetten for ACT–LR-testing er et uavhengig testkammer forhåndslastet med et tørket preparat bestående av Celite, potet-dekstrin, stabilisatorer og buffermidler. Hver kyvette er pakket inn i en egen pose. Kyvetteposene er stemplet med en lotspesifikk utløpsdato.

***FORSIKTIG:*** *Alle brukte testkyvetter bør betraktes som potensielt smittsomme. De må behandles med forsiktighet og kasseres i henhold til forskrifter for kassering av medisinsk avfall.*

## ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER

**IKKE** bruk kyvetter etter utløpsdatoen merket på posen, eller kyvetter som ikke har blitt lagret på riktig måte.

**IKKE** tving kyvetten inn i instrumentet. Hvis motstand oppstår når kyvetten skal settes inn, ta den forsiktig ut og undersøk kyvettesporet. Fjern enhver hindring før du bruker instrumentet videre (se Service og vedlikehold i brukerhåndboken for det aktuelle Hemochron Jr.-instrumentet).

## OPPBEVARING OG STABILITET

Folieinnpakkede ACT–LR-kyvetter er stabile frem til den merkede utløpsdatoen når de oppbevares nedkjølt (2–8 °C). Ikke åpnede, innpakkede kyvetter kan oppbevares i romtemperatur (15–30°C). ACT–LR-kyvetter skal ikke utsettes for romtemperaturer over 37 °C.

***MERK:****Omdatering ved romtemperaturer er maksimalt 12 uker, men den nye datoen må aldri overgå den merkede utløpsdatoen. Omdatering er nødvendig hvis kyvettene oppbevares i romtemperaturer, og bør indikeres ved å fylle ut oppbevaringsinformasjon i tabellen Ytelse bekreftet på sidepanelet på hver kyvettepakke. En åpnet pakke er stabil i syv dager, forutsatt at den er brettet sammen i den åpne enden. For å oppnå optimal brukstid, anbefales det å åpne kyvetteposen umiddelbart før bruk.*

## BRUKSANVISNING

Før prøven analyseres, må brukeren lese de detaljerte bruksanvisningene for Hemochron Jr.

Instrumentet brukes ved å sette inn en kyvette i instrumentet, la det varme seg opp, sette inn en fullblodsprøve og trykke på **START**-tasten. Måling av prøver, blanding av prøver/reagens, teststarting og påvisning av koagulasjon vil deretter fortsette automatisk.

***Medfølgende materialer***
- forhåndslastede Hemochron Jr.-kyvetter for ACT–LR-testing

***Materialer som kreves, men ikke medfølger***
- Hemochron Jr., Hemochron Jr. II eller Hemochron Jr. Signature
- 1 ml eller 3 ml plastikksprøyter med 23 G eller 21 G kanyle (valgfri)

## PRØVETAKING OG -HÅNDTERING

Når du skal ta en blodprøve, må du følge retningslinjene til institusjonen og NCCLS (H21-A5) for prøvetaking og koagulasjonstesting.

Du må ikke ta ferske fullblodprøver med blodprøverør av glass.

Du må ikke ta blod fra en heparinisert tilgangsslange, lås eller fast heparinlås.

Når prøver tas gjennom faste blodlinjer, må tilgangsporten syles grundig i henhold til institusjonens prosedyrer.

1. Ta 0,2 ml blod med sprøyten.
2. Drypp én dråpe med blod umiddelbart i testkyvettens prøvebrønn. Fyll prøveglasset helt. Dette kan gjøres enten med eller uten en overføringskanyle. Det må dryppes tilstrekkelig med blod rett i midten av prøveglasset for å fylle det helt opp med blod. Hvis en stor dråpe med blod går utenfor prøvebrønnen i midten, må du dytte den over til den ytre prøvebrønnen.
3. Trykk på **START**-tasten.

## KVALITETSKONTROLL

Rutinemessig kvalitetskontroll og -sporing må være en del av et omfattende kvalitetssikringsprogram. Hemochron Jr. fører kvalitetskontrollprodukter som gjør rutinemessig kvalitetskontroll både praktisk og rimelig.

***Daglig QC av instrumentet***
Hemochron Jr. bør kvalitetskontrolleres på to nivåer for hver 8. time instrumentet brukes. Som hjelp til den daglige kvalitetskontrollen finnes det elektronisk kvalitetskontroll som kan kvalitetskontrollere instrumentet på to nivåer. Se bruksanvisningen for det aktuelle Hemochron-instrumentet for detaljerte instruksjoner.

***Kvalitetskontroll av Hemochron Jr. testkyvetter***
Det må kvalitetskontrolleres at hver ***lot*** med Hemochron Jr. ACT–LR-kyvetter fungerer på to nivåer for væskekvalitet:

- når en ny forsendelse mottas OG
- deretter hver 30. kalenderdag

Etter at valideringen ovenfor er utført, er det ikke nødvendig å kvalitetskontrollere væsken ytterligere med mindre det er mistanke om avvik i de kliniske resultatene.

Valideringen kan utføres ved å bruke egnede Hemochron Jr.-produkter for kvalitetskontroll av mikrokoagulasjon i fullblod. Hvert produktsett for kvalitetskontroll inneholder informasjon om akseptable intervaller og hvordan man skal bruke dem for kyvetter for ACT–LR-testing.

## BEGRENSNINGER

Kiselgurekvivalente ACT-verdier som er over 400 sekunder rapporteres ikke på instrumentet. Istedenfor vises meldingen "Out of range – Hi".

***MERK:****Kiselgurekvivalente ACT-verdier som overstiger 400 sekunder grunnet ekstremt høy sensitivitet overfor heparin i pasienten, utgjør ikke en feil i testen.*

Hemochron Jr. ACT–LR-testen bruker Celite som aktivator, og denne er kjent for å forlenges kunstig av aprotinin, en proteasehemmer.[4] ACT–LR er ikke ment for bruk på slike pasienter.

Verdiene som vises ved analysens konklusjon er Celie-ekvivalent Hemochron-ACT-verdier (HRFCA510). Den ekvivalente verdien genereres basert på korrelasjonen som er fastslått blant kliniske pasienter og som vises i fig. 3. Selv når det er en stor grad av korrelasjon (=0,95) er de faktiske verdiene til de to analysene statistisk liknende, men ikke identiske. Klinikeren må tolke resultatet for koagulasjonstid, med tanke på pasientens kliniske situasjon.

Prøver med en hematokritt som er mindre enn 20 % eller større enn 55 % anbefales ikke, da dette gir en optisk tetthet utenfor instrumentets deteksjonsnivå.

Hemochron Jr. ACT–LR påvirkes av svak teknikk, inkludert blodprøvetaking og overføring av blod til prøveglasset. Kvaliteten på blodprøven kan bli påvirket av:

– skumming eller hemolyse i prøven

– klumpet eller delvis klumpet blod

– Uventet koagulasjonshemming

– lupusantikoagulant

Som med alle diagnostiske tester må testresultatene fra Hemochron Jr. undersøkes nærmere i forhold til en bestemt pasients tilstand og behandling med koagulasjonshemmende midler. Alle resultater som ikke stemmer overens med pasientens kliniske tilstand bør repeteres eller suppleres med data fra ytterligere tester.

## YTELSESKARAKTERISTIKKER

***MERK:****Følgende data ble innhentet med Hemochron Jr. med ACT-LR-kyvetter.*

***Normalområde***
Hemochron Jr. ble evaluert med ferskt fullblod fra normale, frivillige donorer (N=21) og voksne hjerte- og ECMO-pasienter som ikke fikk heparinbehandling (N=20). Resultatene vises i kiselgurekvivalente Hemochron ACT-verdier.

| | N | Snitt (sek) | SD (sek) | Område (snitt ± 2 SD) |
|---|---|---|---|---|
| Normale donorer | 21 | 131 | 9 | 113 – 149 |
| Pasienter uten heparin | 20 | 129 | 20 | 89 – 169 |

***MERK:****Hver institusjon bør etablere sitt eget normalområde og målområde for terapeutisk koagulasjonshemming basert på institusjonens egen pasientpopulasjon.*

***Variasjonsbredde for fjerning av permanent vaskulær hylse***
Hemochron Jr. ble evaluert på 20 pasienter ved fullføring av perkutan transluminal hjerteangioplastikk, eller 5 til 24 timer etter heparinbolus i CCU, når den permanente kardiovaskulære hylsen ble fjernet. Referanse-Celite ACT (Hemochron) ble sammenlignet med en delt blodprøve.

Koagulasjonstid ved fjerning av hylse

ACT–LR

| N | Snitt (sek) | SD (sek) | Område (snitt ± 2 SD) |
|---|---|---|---|
| 20 | 145 | 31 | 83 – 207 |

Hemochron Celite ACT

| N | Snitt (sek) | SD (sek) | Område (snitt ± 2 SD) |
|---|---|---|---|
| 20 | 142 | 37 | 68 – 216 |

***MERK:****Hver institusjon bør etablere sitt eget normalområde for fjerning av hylse, basert på pasientpopulasjonen.*

***Heparinsensitivitet (fig. 1)***
En kurve for *in vitro* heparinsensitivitet ble generert ved å tilsette økende mengder heparin (0 til 2,5 units/ml) til alikvoter fra blodprøver fra 9 normale donorer. Hemochron Jr. ACT–LR og Hemochron Celite–aktivert ACT ble utført med delte blodprøver. Begge testene ble utført to ganger. Koagulasjonstider for prøvene med 9 donorer for hvert heparinnivå ble omgjort til en gjennomsnittsverdi.

***MERK:****Denne grafen er kun ment som et eksempel. Hver pasient demonstrerer en unik kurve for heparindoserespons.*

***Korrelasjon mellom Hemochron Jr. ACT–LR og referanse-Hemochron ACT***
Hemochron Jr. ACT–LR-testen er optimert for responssensitivitet for flere heparinkonsentrasjoner, fra 0 til 2,5 enheter pr. ml. For tiden er den vanligste metoden for heparinovervåkning på dette hepariniseringsnivået Hemochron kiselguraktivert ACT-test og Hemochron-glasspartikkelaktivert ACT (P214). Korrelasjonen mellom Hemochron Jr. ACT-LR og disse referanse-ACT-testene ble fastslått.

I. Korrelasjon mellom Hemochron Jr. ACT-LR og Hemochron kiselguraktivert ACT

A. Laboratoriestudier (*in vitro*) (fig. 2)

Ferskt blod ble hentet fra 9 normale donorer. Alikvoter for hver blodprøve ble heparinisert *in vitro* til heparinkonsentrasjon på 0 nivåer, opptil 2,5 enheter pr. ml. Hver prøve ble testet med Hemochron Jr. ACT-LR-testen og referanse-Celite ACT. Totalt 40 parvise datapunkter ble innhentet og analysert (r=0,96).

Hemochron Jr. ACT–LR ble konvertert til den Celite-ekvivalente Hemochron ACT-verdien, basert på regresjonslikningen som ble bestemt av de kliniske studiene som vises i fig. 3.

B. Kliniske studier (*in vivo*) (fig. 3)

Blodprøver ble innhentet fra 17 hjertepasienter før heparinisering og etter heparinisering, under hjertekateterisering og hjerteangioplastikk. Totalt antall prøver som ble innhentet var 71. Prøvene ble samtidig evaluert med Hemochron Jr. ACT-LR og referanse-ACT. En lineær regresjonslikning ble generert fra denne korrelasjonen (r=0,95), og den kiselgurekvivalente ACT-verdien som samsvarer med koagulasjonstiden for ACT-LR ble fastslått. Denne konverteringen ble deretter programmert inn i alle Hemochron Jr.-modellene, slik at ved fullføring av ACT-LR-analysen vises den kiselgurekvivalente ACT-verdien.

II. Korrelasjon mellom Hemochron Jr. ACT–LR og Hemochron-glasspartikkelaktivert ACT.

Hemochron-glasspartikkelaktivert ACT (P214) er en foretrukket fremgangsmåte for å finne ACT-koagulasjonstid i ECMO og dialyse. Andre metoder inkluderer kaolin- eller kiselguraktivert ACT.

A. Laboratoriestudier (*in vitro*) (fig. 4)

Korrelasjonen mellom Hemochron Jr. ACT–LR og glasspartikkelaktivert ACT ble demonstrert i en *in vitro* laboratoriestudie. Ferskt blod ble hentet fra 5 normale donorer. Alikvoter for hver blodanrøve ble heparinisert *in vitro*, til heparinkonsentrasjoner på opptil 2,5 enheter/ml. Hver prøve ble testet med Hemochron Jr. ACT–LR og glasspartikkel-ACT (P214). Totalt 27 parvise datapunkter ble innhentet og analysert (r=0,995).

B. Kliniske studier (*in vivo*) på ECMO-pasienter (fig. 5)

Koagulasjonshemming med heparin ble overvåket hver time i 2 til 48 timer på 13 ECMO-pasienter ved bruk av en glasspartikkelaktivert ACT (P214). Pasientpopulasjonen omfatter 5 pediatriske pasienter (2 månader – 15 år) og 8 voksne (22–63 år). Delte prøver ble samtidig evaluert med Hemochron Jr. ACT–LR. Totalt 99 parvise datapunkter ble innhentet, og korrelasjonen mellom de to testene ble analysert (r=0,81 for voksne, r=0,61 for barn, r=0,72 kombinert).

C. Kliniske studier (*in vivo*) på dialysepasienter (fig. 6)

Koagulasjonshemming med heparin ble overvåket hvert 30. minutt i 1 til 2 timer på 21 voksne dialysepasienter (30 til 85 år gamle), med en kommersielt tilgjengelig kaolinaktivert ACT. Delte prøver ble samtidig evaluert med Hemochron Jr. ACT–LR. Totalt 51 parvise datapunkter ble innhentet, og korrelasjonen mellom de to testene ble analysert (r=0,92).

## PRESISJON

***A. Endags- og dag-til-dag-presisjon***
Presisjonen til Hemochron Jr. ble evaluert ved at man utførte flere Hemochron Jr. ACT-LR-tester med ikke-hepariniserte (normale) og hepariniserte (unormale) fullblodskontrollmaterialer. Analysene ble utført på tre ulike testdager, ved hjelp av tre analysatorer, med følgende resultater.

| | N | Snitt (sek) | SD (sek) | CV (%) |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 27 | 208 | 14 | 6,7 |
| Unormal | 27 | 299 | 11 | 3,8 |

Gjentatte tester ble utført på en enkelt Hemochron Jr, i tre påfølgende dager, og ga følgende resultater hver dag:

| | | Normal | | | Unormal | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | N | Snitt (sek) | SD (sek) | CV (%) | Snitt (sek) | SD (sek) | CV (%) |
| Dag 1 | 3 | 202 | 7,9 | 3,9 | 292 | 17,6 | 6,0 |
| Dag 2 | 3 | 217 | 18,7 | 8,6 | 300 | 1,5 | 0,5 |
| Dag 3 | 3 | 214 | 11,7 | 5,5 | 303 | 7,2 | 2,4 |
| Sum | 9 | 211 | 13,4 | 6,4 | 298 | 10,8 | 3,6 |

***B. Korrelasjon for dobbelttesting***
Hemochron Jr. ACT–LR ble utført dobbelt med både *in vitro*- og *in vivo*-studier.

1. *In vitro* duplikate tester ble utført med blodprøver fra 15 normale donorer. Heparin ble tilsatt alikvoter i prøvene, for å oppnå en konsentrasjon fra 0 til 2,5 enheter/ml blod. Totalt 93 parvise datapunkter ble innhentet. En korrelasjon på r=0,97, med en gradient på 0,99, ble funnet mellom de dupliserte testene. (Fig. 7)
2. *In vivo* dobbelttester ble utført på 25 hjertepasienter med ACT-resultater fra 87 til 400 sekunder. Totalt 76 parvise datapunkter ble innhentet. En korrelasjon på r=0,93, med en gradient på 0,81, ble funnet mellom de dupliserte testene. (Fig. 8)

# Low Range Activated Clotting Time (ACT-LR)
# LÅGGRUPP AKTIVERAD KOAGULERINGSFÖRMÅGA

## Förpackningsbilaga
**Svenska / Swedish**

## AVSEDD ANVÄNDNING

**Hemochron® Jr. ACT–LR är en kvantitativ analys för övervakning av heparinantikoagulantia vid olika medicinska ingrepp. ACT–LR demonstrerar linjär korrelation till antikoagulationseffekterna hos heparin upp till 2,5 enheter/ml blod. Det är avsett för användning vid övervakning av låga till måttliga heparindoser som ofta förknippas med sådana ingrepp som hjärtkateterisering, extracorporeal membranoxygenering (ECMO), hemodialys och PTCA (perkutan transluminal koronarangioplastik). (Hemochron Jr. ACT+ [JACT+]-testet tillhandahålls för övervakning av måttliga till höga heparinnivåer [1-6 enheter/ml].)**

**ACT-LR-testet utförs med valfri Hemochron Jr.-modell med användning av färskt helblod.** Instrumenten är bärbara och avsedda för användning intill patienten. Instrumenten är ej avsedda för användning i hemmet.

För *in vitro* **diagnostiskt bruk**

## SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING

**Sluten övervakning och kontroll av antikoagulationen är önskvärt för att tillförsäkra koagelfritt blodflöde och samtidigt minimera risken för blödningskomplikationer efter ingreppet.[1,3,4]**

**ACT-testet (Activated Clotting Time) som först beskrevs av Hattersley 1966,[1] är den vanligaste metoden för övervakning av heparinbehandling vid sådana ingrepp som PTCA. Heparinbehandling är visserligen avgörande för att bibehålla hemostas under ingreppet, men dess insättande kan dock medföra betydande risker för patienten. Patienters heparinkänslighet kan variera upp till 12 gånger.[1] Överdosering av heparin kan orsaka farlig blödning, och underdosering av heparin kan medföra trombos. Därför är övervakning av heparinbehandling avgörande för att skydda mot dessa oönskade biverkningar.**

**ACT-LR-testresultatet omvandlas automatiskt till ett referens-Celite® ACT-värde. När testet är klart kommer instrumentets digitala tidur att visa endast det Celite-motsvarande ACT-värdet i sekunder. Genom att visa detta Celite-motsvarande ACT-värde förbättras tolkningen av testresultatet.**

## DRIFTSPRINCIP

**Hemochron Jr.-instrumenten använder en mekanisk koagulationsmekanism vid slutpunkten varigenom blodkoagel uppstår i ACT-LR-kyvetten för engångsbruk. Efter introducering av helblodsprovet, mäter instrumentet upp exakt 15 mikroliter blod och förflyttar det automatiskt till analyskanalen inom ACT-LR-kyvetten. Återstoden av blodprovet, som inte behövs för analysen, dras automatiskt upp i kyvettens avfallskanyl. Prov-/reagensblandning och testinitiering utförs automatiskt, och kräver inga åtgärder av operatören. Efter blandning med reagensen, flyttas provet fram och tillbaka inom testkanalen och övervakas för bildande av blodkoagel.**

**Koageldetektionsmekanismen består av en serie optiska LED-detektorer som är inriktade med kyvettens testkanal. Den hastighet med vilken blodprovet rör sig mellan detektorerna uppmäts. När koagelbildning uppstår, hämmas blodflödet och hastigheten saktas ner. Instrumentet känner av att en koagelslutpunkt har erhållits, när rörelsen minskas bortom en förutbestämd hastighet. Instrumentet rapporterar det Celite-motsvarande ACT-värdet i sekunder.**

## REAGENSER

**Varje låda med ACT-LR-testkyvetter innehåller:**

- **45 påsar, var och en med en Hemochron Jr. ACT-LR-testkyvett och en desickant**

**ACT-LR-testkyvetten är en fristående testkammare för engångsbruk som laddats i förväg med en torkad preparation av Celite, potatisdextrin, stabiliseringsmedel och buffertar. Varje kyvett är separat förpackad i en påse. Kyvettpåsarna är stämplade med ett lot-specifikt utgångsdatum.**

***VAR FÖRSIKTIG!*** *Alla begagnade testkyvetter skall anses utgöra riskavfall, hanteras försiktigt och kasseras i enlighet med vedertagna metoder för avfallshantering.*

## FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID DRIFT

**Använd INTE kyvetter vars sista förbrukningsdag har utgått, eller som har förvarats felaktigt.**

**Tvinga INTE in en kyvett i instrumentet. Om motstånd upplevs vid införandet, ska du försiktigt avlägsna kyvetten och undersöka kyvettskåran. Avlägsna eventuella hinder innan du försöker använda instrumentet igen (se Service och underhåll i lämplig Hemochron Jr. användarhandbok).**

## SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING

**Sluten övervakning och kontroll av antikoagulationen är önskvärt för att tillförsäkra koagelfritt blodflöde och samtidigt minimera risken för blödningskomplikationer efter ingreppet.[1,3,4]**

**ACT-testet (Activated Clotting Time) som först beskrevs av Hattersley 1966,[1] är den vanligaste metoden för övervakning av heparinbehandling vid sådana ingrepp som PTCA. Heparinbehandling är visserligen avgörande för att bibehålla hemostas under ingreppet, men dess insättande kan dock medföra betydande risker för patienten. Patienters heparinkänslighet kan variera upp till 12 gånger.[1] Överdosering av heparin kan orsaka farlig blödning, och underdosering av heparin kan medföra trombos. Därför är övervakning av heparinbehandling avgörande för att skydda mot dessa oönskade biverkningar.**

**ACT-LR-testresultatet omvandlas automatiskt till ett referens-Celite® ACT-värde. När testet är klart kommer instrumentets digitala tidur att visa endast det Celite-motsvarande ACT-värdet i sekunder. Genom att visa detta Celite-motsvarande ACT-värde förbättras tolkningen av testresultatet.**

## DRIFTSPRINCIP

**Hemochron Jr.-instrumenten använder en mekanisk koagulationsmekanism vid slutpunkten varigenom blodkoagel uppstår i ACT-LR-kyvetten för engångsbruk. Efter introducering av helblodsprovet, mäter instrumentet upp exakt 15 mikroliter blod och förflyttar det automatiskt till analyskanalen inom ACT-LR-kyvetten. Återstoden av blodprovet, som inte behövs för analysen, dras automatiskt upp i kyvettens avfallskanyl. Prov-/reagensblandning och testinitiering utförs automatiskt, och kräver inga åtgärder av operatören. Efter blandning med reagensen, flyttas provet fram och tillbaka inom testkanalen och övervakas för bildande av blodkoagel.**

**Koageldetektionsmekanismen består av en serie optiska LED-detektorer som är inriktade med kyvettens testkanal. Den hastighet med vilken blodprovet rör sig mellan detektorerna uppmäts. När koagelbildning uppstår, hämmas blodflödet och hastigheten saktas ner. Instrumentet känner av att en koagelslutpunkt har erhållits, när rörelsen minskas bortom en förutbestämd hastighet. Instrumentet rapporterar det Celite-motsvarande ACT-värdet i sekunder.**

## REAGENSER

**Varje låda med ACT-LR-testkyvetter innehåller:**

- **45 påsar, var och en med en Hemochron Jr. ACT-LR-testkyvett och en desickant**

**ACT-LR-testkyvetten är en fristående testkammare för engångsbruk som laddats i förväg med en torkad preparation av Celite, potatisdextrin, stabiliseringsmedel och buffertar. Varje kyvett är separat förpackad i en påse. Kyvettpåsarna är stämplade med ett lot-specifikt utgångsdatum.**

***VAR FÖRSIKTIG!*** *Alla begagnade testkyvetter skall anses utgöra riskavfall, hanteras försiktigt och kasseras i enlighet med vedertagna metoder för avfallshantering.*

## FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID DRIFT

**Använd INTE kyvetter vars sista förbrukningsdag har utgått, eller som har förvarats felaktigt.**

**Tvinga INTE in en kyvett i instrumentet. Om motstånd upplevs vid införandet, ska du försiktigt avlägsna kyvetten och undersöka kyvettskåran. Avlägsna eventuella hinder innan du försöker använda instrumentet igen (se Service och underhåll i lämplig Hemochron Jr. användarhandbok).**

## LAGRING OCH STABILITET

**Vid förvaring i kyl (2 - 8° C), är ACT-LR-kyvetterna i foliepåsar stabila fram till angivet utgångsdatum. Oöppnade kyvetter i påsar kan även förvaras i rumstemperatur (15 - 30°C). ACT-LR-kyvetter får ej utsättas för temperaturer över 37°C.**

***OBS!*** *Vid förvaring i rumstemperatur kan kyvetterna lagras i upp till 12 veckor, dock aldrig längre än angivet utgångsdatum. Ny datummärkning är nödvändig vid förvaring i rumstemperatur och skall anges genom att man fyller i lagringsinformationsdelen i tabellen "Verifierad funktion" på varje kyvettlådas sidopanel. Den öppnade påsen, då den öppna änden vikts ihop korrekt och placerats i kylskåp, är stabil under sju dagar. För optimal lagringstid rekommenderar vi att kyvettpåsen öppnas omedelbart före användning.*

## FUNKTIONSEGENSKAPER

***OBS!*** *Följande data samlades in med användning av Hemochron Jr. med ACT-LR-kyvetter.*

***Normalt område***
**Hemochron Jr. utvärderades med användning av färskt helblod från normala frivilliga givare (N=21) samt vuxna hjärt- och ECMO-patienter som inte erhåller heparinbehandling (N=20) Resultaten visas i Celite-motsvarande Hemochron ACT-värden.**

| | N | Genomsnitt (sek) | SD (sek) | Område (genomsnitt ± 2SD) |
|---|---|---|---|---|
| Normala givare | 21 | 131 | 9 | 113 – 149 |
| Icke-heparinpatienter | 20 | 129 | 20 | 89 – 169 |

***OBS!*** *Varje institution skall fastställa sitt eget normala område och målområde för terapeutisk antikoagulantia, baserat på dess patientpopulation.*

***Områden för avlägsnande av inneliggande kärlskida***
**Hemochron Jr. utvärderades på 20 patienter vid fullbordandet av PTCA eller 5 till 24 timmar efter insättandet av heparinbolus på hjärtintensiven, då den inneliggande kärlskidan skulle avlägsnas. Referens-Celite ACT (Hemochron) jämfördes med användning av ett delat blodprov.**

**Koageltiden vid avlägsnande av skidan**

**ACT–LR**

| N | Genomsnitt (sek) | SD (sek) | Område (genomsnitt ± 2SD) |
|---|---|---|---|
| 20 | 145 | 31 | 83 – 207 |

**Hemochron Celite ACT**

| N | Genomsnitt (sek) | SD (sek) | Område (genomsnitt ± 2SD) |
|---|---|---|---|
| 20 | 142 | 37 | 68 – 216 |

***OBS!*** *Varje institution skall fastställa sitt eget målområde för avlägsnande av skidan, baserat på sin egen patientpopulation.*

***Heparinkänslighet (fig. 1)***
**En in vitro heparinkänslighetskurva genererades genom att lägga till ökande mängder heparin (0 till 2,5 enheter/ml) till alikvoter av normalt blod från 9 givare. Hemochron Jr. ACT–LR och Hemochron Celite–aktiverad ACT genomfördes med användning av delade blodprover. Båda testerna utfördes i dubletter. Den genomsnittliga koageltiden beräknades med hjälp av prover från 9 givare vid varje heparinnivå.**

***OBS!*** *Denna kurva utgör endast ett exempel. Varje patient uppvisar en unik kurva för heparindosrespons.*

***Korrelationen mellan Hemochron Jr. ACT–LR och referens-Hemochron ACT***
**Hemochron Jr. ACT–LR-testet är optimerat för en känslighet för respons över ett hepariniseringsområde från 0 till 2,5 enheter/ml. För närvarande är den vanligaste metoden för heparinövervakning i detta hepariniseringsområde Hemochron Celite–aktiverat ACT-test samt Hemochron glaspartikelaktiverat ACT (P214). Korrelationen mellan Hemochron Jr. ACT–LR och dessa referens-ACT-tester fastställdes.**

**I. Korrelationen mellan Hemochron Jr. ACT–LR och Hemochron Celite-aktiverat ACT**

**A. Laboratorieundersökningar (in vitro) (fig. 2)**

**Färskt blod upptogs från 9 normala givare. Alikvoter av varje blodprov hepariniserades in vitro till 6 nivåer av heparinkoncentration, upp till 2,5 enheter/ml. Varje prov testades med användning av Hemochron Jr. ACT–LR-testet och referens-Celite ACT Sammanlagt 40 datapunkter i par insamlades och analyserades (r=0,96).**

**Hemochron Jr. ACT–LR omvandlades till Celite-motsvarande Hemochron ACT-värde baserat på regressionsekvationen som fastställts från kliniska undersökningar enligt illustration i fig. 3.**

**B. Kliniska (in vivo) undersökningar (fig. 3)**

**Blodprover upptogs från 17 hjärt- och kärlpatienter före heparinisering och efter heparinisering under hjärtkateterisering och angioplastik. Det totala antalet prover som upptogs var 71. Proverna utvärderades samtidigt med användning av Hemochron Jr. ACT–LR och referens-Celite ACT. En linjär regressionsekvation genererades från denna korrelation (r=0,95) och Celite-motsvarande ACT-värde som motsvarade ACT-LR koagulationstiden fastställdes. Denna omvandlig programmerades därefter i alla modeller av Hemochron Jr. så att det Celite-motsvarande ACT-värdet visas när ACT-LR-analysen är klar.**

**II. Korrelationen mellan Hemochron Jr. ACT–LR och Hemochron glaspartikelaktiverat ACT**

**Hemochron glaspartikelaktiverat ACT (P214) är en föredragen metod för att fastställa ACT koagulationstid vid ECMO och dialys. Andra metoder inkluderar kaolin- eller Celite-aktiverat ACT.**

**A. Laboratorieundersökningar (in vitro) (fig. 4)**

**Korrelationen mellan Hemochron Jr. ACT–LR och glaspartikelaktiverad ACT demonstrerades i en laboratorieundersökning in vitro. Färskt blod upptogs från 5 normala givare. Alikvoter av varje blodprov hepariniserades in vitro till heparinkoncentrationer upp till 2,5 enheter/ml. Varje prov testades med användning av Hemochron Jr. ACT–LR-testet och glaspartikel ACT (P214). Sammanlagt 27 datapunkter i par insamlades och analyserades (r=0,95).**

**B. Klinisk (in vivo) undersökning av ECMO-patienter (fig. 5)**

**Heparinantikoagulation övervakades varje timma under 2 till 48 timmar hos 13 ECMO-patienter med användning av en glaspartikelaktiverad ACT (P214). Patientpopulationen inkluderade 5 barn (2 månader – 15 år gamla) samt 8 vuxna (22 – 63 år gamla). Delade prover utvärderades samtidigt med Hemochron Jr. ACT–LR. Sammanlagt 99 datapunkter i par erhölls och korrelationen mellan de två testerna analyserades (r=0,81 hos vuxna, r=0,61 hos barn, r=0,72 kombinerat).**

**C. Klinisk (in vivo) undersökning av dialyspatienter (fig. 6)**

**Heparinantikoagulation övervakades var 30:e minut under 1 till 2 timmar hos 21 vuxna dialyspatienter (30 till 85 år gamla) med användning av en kommersiellt tillgänglig kaolinaktiverad ACT. Delade prover utvärderades samtidigt med Hemochron Jr. ACT–LR. Sammanlagt 51 datapunkter i par insamlades och korrelationen mellan de två testerna analyserades (r=0,92).**

## PRECISION

***A. Inom-en-dag och dag-till-dag precision***
**Precisionen hos Hemochron Jr. utvärderades genom att flera Hemochron Jr. ACT-LR-tester genomfördes med användning av icke-hepariniserade (normala) och hepariniserade (abnorma) helbloduskontroller. Analyser utfördes under tre olika dagar med användning av tre analyserare med följande resultat:**

| | N | Genomsnitt (sek) | SD (sek) | CV (%) |
|---|---|---|---|---|
| Normalt | 27 | 208 | 14 | 6.7 |
| Abnormt | 27 | 299 | 11 | 3.8 |

**Upprepade tester utfördes på en enda Hemochron Jr. under tre efterföljande dagar med precisionsresultat varje dag enligt följande:**

| | | Normalt | | | Abnormt | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | N | Genomsnitt (sek) | SD (sek) | CV (%) | Genomsnitt (sek) | SD (sek) | CV (%) |
| Dag 1 | 3 | 202 | 7.9 | 3.9 | 292 | 17.6 | 6.0 |
| Dag 2 | 3 | 217 | 18.7 | 8.6 | 300 | 1.5 | 0.5 |
| Dag 3 | 3 | 214 | 11.7 | 5.5 | 303 | 7.2 | 2.4 |
| Totalt | 9 | 211 | 13.4 | 6.4 | 298 | 10.8 | 3.6 |

***B. Korrelation av dubbel testning***
**Hemochron Jr. ACT–LR utfördes i dubletter i såväl in vitro som in vivo undersökningar.**

1. **Dubbel in vitro testning genomfördes med användning av blodprover från 15 normala givare. Heparin tillsattes till alikvoter av proverna för att erhålla koncentrationer från 0 till 2,5 enheter/ml blod. Sammanlagt 93 datapunkter i par insamlades. En korrelation på r=0,97 med en kurva på 0,99 erhölls mellan kopierade tester. (Fig. 7)**
2. **Dubbel in vivo testning genomfördes i 25 hjärt- och kärlpatienter med ACT-resultat från 87 till 400 sekunder. Sammanlagt 76 datapunkter i par insamlades. En korrelation på r=0,93 med en kurva på 0,81 erhölls mellan kopierade tester. (Fig. 8)**

## ZASTOSOWANIE TESTU

Hemochron® Jr. ACT-LR jest ilościowym testem do monitorowania przeciwzakrzepowej aktywności heparyny, stosowanej podczas różnych zabiegów medycznych. Test ACT-LR wykazuje liniową korelację z przeciwzakrzepowymi własnościami heparyny o stężeniu do 2,5 j/ml krwi. Test przeznaczony jest do monitorowania od niskich do średnich dawek heparyny, często jest stosowany przy zabiegach cewnikowania serca, zabiegach pozaustrojowego, przezbłonowego utlenowania krwi (ECMO), hemodializie oraz w przezskórnej wewnątrznaczyniowej angioplastyce wieńcowej (PTCA). (Test ACT+ [JACT+] do wykonywania na aparacie Hemochron Jr. jest stosowany do monitorowania od średnich do wysokich dawek heparyny [1-6 j./ml].)

Test ACT-LR wykonywany jest na dowolnym aparacie Hemoch